

## Relácie ekvivalencie

- Overte, či relácia  $R$  je relácia ekvivalencie na množine  $M$ .
  - $M$  je ľubovoľná množina,  $R = M \times M$ ;
  - $M$  je ľubovoľná množina,  $R = \{(x, x); x \in M\}$
  - $M = \mathbb{R}$ ,  $R = \{(x, y) \in M \times M; x - y \in \mathbb{Z}\}$ ;
  - $M = \mathbb{Z}^2$ ,  $R = \{(a, b), (c, d) \in M \times M; a + d = b + c\}$ ;
  - $M = \mathbb{N}^2$ ,  $R = \{(a, b), (c, d) \in M \times M; a + d = b + c\}$ ;
  - $M = \mathbb{R}$ ,  $R = \{(a, b) \in M \times M; |a - b| \leq 1\}$ ;
  - $M = \mathbb{R}$ ,  $R = \{(x, y) \in M \times M; x^2 = y^2\}$ ;
  - $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ , t.j.  $M$  je množina všetkých podmnožín množiny  $\mathbb{N}$  a  $R = \{(A, B) \in M \times M; A \Delta B \text{ je konečná}\}$  (t.j. množiny  $A$  a  $B$  sú v relácii  $R$ , ak ich symetrický rozdiel  $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$  je konečná množina);
  - $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ,  $R = \{(A, B) \in M \times M; \text{existuje bijekcia z } A \text{ do } B\}$ ;
  - $M = \mathbb{Z}$ ;  $R = \{(x, y) \in M \times M; 3 \mid x + 2y\}$ ;
  - $M = \mathbb{R}$ ,  $R = \{(x, y) \in M \times M; x - y \in \mathbb{Q}\}$ ;
  - $M = \mathbb{R}^2$ ;  $R = \{(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in M \times M; x_1 = y_1\}$ ;
  - $M = \mathbb{R}^2$ ;  $R = \{(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in M \times M; x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2\}$ ;
  - $M = \mathbb{R}^2$ ;  $R = \{(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in M \times M; x_1 = y_2 \wedge x_2 = y_1\}$ ;
  - $M = \{f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}\}$ , t.j.  $M$  je množina všetkých zobrazení zo  $\mathbb{Z}$  do  $\mathbb{Z}$ ;  $R = \{(f, g) \in M \times M; f(1) = g(1)\}$ ;
  - $M = \{f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}\}$ , t.j.  $M$  je množina všetkých zobrazení zo  $\mathbb{Z}$  do  $\mathbb{Z}$ ;  $R = \{(f, g) \in M \times M; f(1) = g(0)\}$ ;
  - $M = G$ , kde  $(G, \circ)$  je grupa,  $H$  je podgrupa grupy  $G$  a  $R = \{(x, y) \in M \times M; xy^{-1} \in H\}$ . Sú niektoré relácie uvedené v ostatných častiach špeciálne prípady tejto relácie?
  - $M$  je ľubovoľná množina,  $f: M \rightarrow S$  je ľubovoľné zobrazenie a  $R = \{(x, y) \in M \times M; f(x) = f(y)\}$ . (=LAG1, 1.6.12(1)) Sú niektoré relácie uvedené v ostatných častiach špeciálne prípady tejto relácie?
- Kolko existuje relácií ekvivalencie na trojprvkovej množine  $\{0, 1, 2\}$ ?
- Dokážte: Ak  $R_1$  a  $R_2$  sú relácie ekvivalencie na tej istej množine  $M$ , tak aj  $R = R_1 \cap R_2$  je relácia ekvivalencie na  $M$ . (Všimnite si, že  $(a, b) \in R \Leftrightarrow (a, b) \in R_1 \wedge (a, b) \in R_2$ .)

## Faktorové grupy

- Ukážte, že faktorová grupa  $G/H$  je izomorfná s grupou  $K$ . (Aspoň jednu úlohu skúste vyriešiť priamo pomocou definície faktorovej grupy a aspoň jednu úlohu pomocou vety o faktorovom izomorfizme.)
  - $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$ ,  $H = \{(x, y); x + 2y = 0\}$ ,  $K = (\mathbb{R}, +)$ ;
  - $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$ ,  $H = \{(x, 3x); x \in \mathbb{R}\}$ ,  $K = (\mathbb{R}, +)$ ;
  - $G = (\mathbb{C}, +)$ ,  $H = \mathbb{R}$ ,  $K = (\mathbb{R}, +)$ ;
  - $G = (\mathbb{Z}_8, +)$ ,  $H = 2\mathbb{Z}_4 = \{0, 2, 4, 6\}$ ,  $K = (\mathbb{Z}_2, +)$ ;
  - $G = (\mathbb{Z}_8, +)$ ,  $H = 4\mathbb{Z}_2 = \{0, 4\}$ ,  $K = (\mathbb{Z}_4, +)$ ;
  - $G = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ ,  $H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $K = \{c \in \mathbb{C}; |c| = 1\}$ ;
  - $G = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ ,  $H = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R}; x > 0\}$ ,  $K = \{c \in \mathbb{C}; |c| = 1\}$ ;
  - $G = (\mathbb{Z}, +)$ ,  $H = 4\mathbb{Z} = \{4z; z \in \mathbb{Z}\}$ ,  $K = \mathbb{Z}_4$ ;
  - $G = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ ,  $H = \mathbb{R}^+$ ,  $K = (\mathbb{Z}_2, +)$ ;
  - $G = (\mathbb{R}^*, \cdot)$ ,  $H = \{\pm 1\}$ ,  $K = (\mathbb{R}^+, \cdot)$
- Zistite, či dané grupy sú izomorfné. V celom cvičení budeme ako  $S$  označovať grupu  $(\{c \in \mathbb{C}; |c| = 1\}, \cdot)$  (prípadne množinu prvkov tejto grupy) a  $C_n = (\{c \in \mathbb{C}; c^n = 1\}, \cdot)$ 
  - $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot) / \{c \in \mathbb{C}; c^n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$ ,  $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot) / \mathbb{R}^+$  (pod  $\mathbb{R}^+$  tu myslíme kladné reálne čísla, čiže  $0 \notin \mathbb{R}^+$ ),  $S$

- b)  $(\mathbb{R}, +)/\mathbb{Z}, S/C_n, S$
- c)  $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)/C_n$
- d)  $(\{c \in \mathbb{C}; c^n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}, \cdot)/\mathbb{R}^+, C_n$
- e)  $(\{c \in \mathbb{C}; c^n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}, \cdot)/C_n, \mathbb{R}^+$
- f)  $C_{12}/C_4, \mathbb{Z}_3$
- g)  $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, +)/(\mathbb{Z}_2 \times \{0\}), \mathbb{Z}_3$