

1-INF-156 Algebra 2 (stará akreditácia)

Martin Sleziak

14. februára 2024

Obsah

1 Úvod	4
1.1 Predhovor	4
1.2 Sylaby a literatúra	4
2 Grupy a podgrupy	5
2.1 Základné vlastnosti grúp	5
2.2 Podgrupy	7
2.3 Homomorfizmy grúp	12
2.4 Cyklické grupy	18
2.5 Permutácie	25
2.5.1 Rozklad na súčin disjunktných cyklov	26
2.5.2 Parita permutácie	29
2.6 Cayleyho veta*	32
3 Faktorizácia	35
3.1 Relácie ekvivalencie a rozklady	35
3.2 Rozklad grupy podľa podgrupy	37
3.3 Normálne podgrupy	43
3.4 Faktorové grupy	46
3.5 Vety o izomorfizme	47
3.5.1 Druhá a tretia veta o izomorfizme*	49
3.6 Grupové kongruencie	53
3.6.1 Pojem kongruencie pre celé čísla	53
3.6.2 Relácia kongruencie	54
3.6.3 Faktorová grupa pre danú reláciu	55
3.6.4 Faktorizácia v ďalších štruktúrach	59
3.7 Komutátor a komutant*	60
3.8 Faktorové vektorové priestory*	61
4 Okruhy a polia	63
4.1 Okruhy (a súvisiace pojmy)	63
4.2 Homomorfizmy, ideály a faktorové okruhy	67
4.3 Okruhy polynómov – definícia a delenie so zvyškom	76
4.3.1 Definícia okruhu polynómov	76
4.3.2 Delenie so zvyškom	79
4.3.3 Polynómy a polynomicke funkcie	81
4.3.4 Iné možnosti, ako definovať okruh polynómov	82
4.4 Deliteľnosť v okruhoch	84

4.4.1	Euklidovské okruhy	86
4.4.2	Okruhy hlavných ideálov	87
4.4.3	Gaussove okruhy	92
4.5	Okruhy polynómov II	95
4.5.1	Korene polynómov	95
4.5.2	Racionálne korene polynómu s celočíselnými koeficientami	98
4.5.3	Algebraicky uzavreté polia	103
4.5.4	Ireducibilné polynómy	104
4.5.5	Ireducibilné polynómy nad \mathbb{Q} a \mathbb{R}	105
4.5.6	Derivácia a Taylorov rozvoj polynómov	106
5	Polia	112
5.1	Podielové pole	112
5.2	Charakteristika poľa	116
5.3	Rozšírenia polí	118
5.4	Algebraické rozšírenia	123
5.5	Rozkladové polia	128
	Register	132
	Zoznam symbolov	134

Kapitola 1

Úvod

Verzia: 14. februára 2024

1.1 Predhovor

V rámci tohoto textu sa budeme občas odkazovať aj na veci z minulého semestra. Takéto odkazy budú označené napríklad ako veta I-3.2.6. Časti označené hviezdíčkou sú nepovinné – doplnil som ich preto, že by Vás niektoré z nich mohli zaujímať. V cvičeniach hviezdíčka označuje náročnejšie cvičenia a + označuje nepovinné cvičenia (napríklad tie, ktoré sa týkajú nepovinných častí).

Za opravy preklepov a chýb, by som chcel poďakovať viacerým študentom: Eduard Batmendijn, Filip Hanes, Jakub Jursa, Lukáš Jusko, Michal Klempa, Tomáš Kovačovský, Ivan Labáth, Marek Manduch, Michal Sabo, Jakub Vaňo a veľa ďalších.

1.2 Sylaby a literatúra

Sylaby predmetu: Základy teórie grúp - podgrupy, cyklické grupy, grupy permutácií, rozklad grupy podľa podgrupy, faktorizácia, základné vety o izomorfizmoch a homomorfizmoch.

Okruhy, ideály, maximálne ideály a prvoideály, vzťah k poliam a oborom integrity pri faktorizácii. Euklidovské okruhy, okruhy hlavných ideálov, gausovské okruhy. Teória deliteľnosti a veta o rozklade na ireducibilné prvky. Okruhy polynómov, rozklad polynómov na ireducibilné polynómy, (viacnásobné) korene polynómov, derivácia a Taylorov rozvoj polynómov.

Rozšírenia polí. Riešenie antických problémov (duplicita kocky, trisekcia uhla, kvadratura kruhu). Konečné polia, klasifikácia konečných polí, šifrovanie RSA.

Literatúra: Základnou literatúrou pre tento kurz je [KGGS].

Kapitola 2

Grupy a podgrupy

2.1 Základné vlastnosti grúp

Definíciu a základné vlastnosti grúp sme sa naučili už v minulom semestri, pre zopakovanie však uvedme aspoň stručný prehľad.

Definícia 2.1.1. Dvojicu $(G, *)$, kde G je množina a $*$ je binárna operácia na G nazývame *grupa*, ak

(i) operácia $*$ je asociatívna

$$(\forall g, h, k \in G) g * (h * k) = (g * h) * k,$$

(ii) operácia $*$ má neutrálny prvok

$$(\exists e \in G)(\forall g \in G) e * g = g * e = g,$$

(iii) pre každý prvok $g \in G$ existuje inverzný prvok vzhľadom na operáciu $*$

$$(\forall g \in G)(\exists g^{-1} \in G) g * g^{-1} = g^{-1} * g = e.$$

Ak je binárna operácia $*$ komutatívna

$$(\forall g, h \in G) g * h = h * g,$$

hovoríme o *komutatívnej grupe*.

Ak platí len prvá z podmienok definície grupy, t.j. ak $*$ je asociatívna binárna operácia na množine G , tak dvojicu $(G, *)$ nazývame *pologrupa*. Ak navyše existuje neutrálny prvok pre operáciu $*$, tak $(G, *)$ voláme *pologrupa s jednotkou* alebo tiež *monoid*.

Často označenie pre grupovú operáciu vynechávame a píšeme ab namiesto $a * b$.

Asociatívnosť vlastne znamená, že môžeme vynechávať zátvorky – pri ľubovoľnom uzátvorkovaní dostaneme ten istý prvok. (V tvrdení I-3.1.14 sme dokázali zovšeobecnený asociatívny zákon, ktorý hovorí, že zátvorky môžeme vynechávať aj pri väčšom počte prvkov.)

V grupe platia zákony o krátení

$$\begin{aligned} g * h_1 = g * h_2 &\quad \Rightarrow h_1 = h_2 \\ h_1 * g = h_2 * g &\quad \Rightarrow h_1 = h_2 \end{aligned}$$

Zo zákonov o krátení sa dá odvodiť jednoznačnosť neutrálneho prvku aj inverzného prvku. Pre inverzný prvok v grupe platí

$$\begin{aligned}(g^{-1})^{-1} &= g \\ (g * h)^{-1} &= h^{-1} * g^{-1}\end{aligned}$$

Veľa príkladov grúp poznáme z minulého semestra.

Príklad 2.1.2. Príklady grúp:

$(V, +)$ kde V je ľubovoľný vektorový priestor,

$(F, +)$ a $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ pre ľubovoľné pole $(F, +, \cdot)$,

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$,

(\mathbb{Z}_n, \oplus) pre $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$,

$(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \odot)$ kde p je prvočíslo.

Príkladom nekomutatívnej grupy je grupa S_n všetkých permutácií n -prvkovej množiny s operáciou skladania zobrazení pre $n \geq 3$ (úloha I-3.2.2, permutáciám sa budeme venovať aj tento semester v časti 2.5).

Príklad 2.1.3. Množina $\mathbb{C}_n = \{x \in \mathbb{C}; x^n = 1\}$ s operáciou násobenia komplexných čísel tvorí grupu. Asociatívnosť je zrejmá (zdedí sa z komplexných čísel), $1 \in \mathbb{C}_n$ je neutrálny prvok. Takisto ak $x^n = 1$ tak aj $(\frac{1}{x})^n = \frac{1}{x^n} = \frac{1}{1} = 1$, čiže $\frac{1}{x}$ patrí do \mathbb{C}_n . Číslo $\frac{1}{x}$ je inverzný prvok k prvku x .

Príklad 2.1.4. Ak $(G, *_G)$ a $(H, *_H)$ sú grupy, tak aj $G \times H$ s operáciou $(a, b) * (a', b') = (a *_G a', b *_H b')$ je grupa (úloha 2.1.2).

Definícia 2.1.5. Grupu $G \times H$ z predchádzajúceho príkladu nazývame *priamy súčin grúp* G a H (alebo tiež *direktný súčin* grúp.)

Cvičenia

Úloha 2.1.1. Nech $(G, *)$ je grupa a e je jej neutrálny prvok. Dokážte:

a) $x * y = y * x \Leftrightarrow x * y * x^{-1} * y^{-1} = e$.

b) Ak $x * x = e$ pre všetky $x \in G$, tak G je komutatívna.

Úloha 2.1.2. Overte, že $G \times H$ spolu s operáciou $*$ definovanou v príklade 2.1.4 tvorí grupu pre ľubovoľné grupy $(G, *_G)$ a $(H, *_H)$.

Úloha 2.1.3. Nech G je grupa, e je jej neutrálny prvok a $a, b \in G$. Ukážte, že ak $(ab)^2 = e$, tak aj $(ba)^2 = e$.

Úloha 2.1.4. Nech G je grupa s vlastnosťou, že pre ľubovoľné $a, b, c, d, x \in G$ platí implikácia $axb = cxd \Rightarrow ab = cd$. (Táto vlastnosť by sa dala nazvať „krátenie v strede“.) Dokážte, že potom grupa G je komutatívna.

Platí aj obrátené tvrdenie? T.j. ak G je komutatívna grupa, platí pre ľubovoľné jej prvky uvedená implikácia?

Úloha 2.1.5*. Nech $*$ je asociatívna binárna operácia na množine $G \neq \emptyset$. Nech pre každé $a, b \in G$ majú rovnice $a * x = b$, $y * a = b$ riešenia v G . (Inými slovami, pre každé $a, b \in G$ existujú $x \in G$ a $y \in G$ také, že $a * x = b$, $y * a = b$.) Dokážte, že $(G, *)$ je grupa. (Hint: Skúste začať dôkazom existencie ľavého a pravého neutrálneho prvku.)

Úloha 2.1.6. Nech (G, \cdot) je grupa a $P(G)$ je systém všetkých podmnožín G . Dokážte, že operácia \cdot na množine $P(G)$ daná predpisom

$$A \cdot B = \{a \cdot b; a, b \in G\}$$

je asociatívna. Tvorí $P(G) \setminus \{\emptyset\}$ s touto operáciou grupu?

Úloha 2.1.7*. Každá konečná grupa s párnym počtom prvkov obsahuje prvok x taký, že $x = x^{-1}$.

Úloha 2.1.8. Nech $G = (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \setminus \{(0, 0)\})$. Definujme na tejto množine binárnu operáciu $*$ predpisom $(a, b) * (c, d) = (ac + 2bd, ad + bc)$. Je to skutočne binárna operácia? Je $(G, *)$ grupa? Je to komutatívna grupa?

Úloha 2.1.9. Uvažujme funkcie $f_i: \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ definované ako $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 1/x$, $f_3(x) = 1 - x$, $f_4(x) = 1/(1 - x)$, $f_5(x) = (x - 1)/x$, $f_6(x) = x/(x - 1)$. Dokážte, že $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ s operáciou skladania zobrazení tvorí grupu.

Úloha 2.1.10*. Nech G je grupa a $a, b \in G$. Nech pre tieto prvky platia rovnosti $aba = ba^2b$, $a^3 = e$ a pre nejaké $n \in \mathbb{N}$ platí $b^{2n-1} = e$. Dokážte, že $b = e$. (Hint vedeli by ste ukázať $ab^2 = b^2a$? Dá sa to ďalej použiť na dôkaz, že pre tieto prvky platí $ab = ba$?)

Úloha 2.1.11*. Nech $*$ je asociatívna operácia na *konečnej* neprázdnej množine M . Ukážte, že existuje prvok $x \in M$ taký, že $x * x = x$.

2.2 Podgrupy

Pojem podgrupy, ktorý teraz zdefinujeme, predstavuje podmnožinu nejakej grupy, ktorá s tou istou operáciou opäť tvorí grupu. Je to do istej miery analógia pojmu podpriestoru vektorového priestoru, s ktorým sme sa zoznámili v minulom semestri.

Definícia 2.2.1. Nech $(G, *)$ je grupa a $H \subseteq G$ je ľubovoľná podmnožina G . Hovoríme, že H je *podgrupa* grupy G , ak H s binárnou operáciou $*$ zúženou na podmnožinu H tvorí grupu.

Budeme používať označenie $H \leq G$, prípadne $(H, *) \leq (G, *)$.

Pod zúžením operácie na podmnožinu rozumieme operáciu danú predpisom

$$h_1 *_H h_2 = h_1 *_G h_2$$

pre ľubovoľné $h_1, h_2 \in H$. (Kvôli zrozumiteľnosti sme tu použili rozličné označenie pre operáciu na grupe G a jej podgrupe H , ďalej však budeme používať rovnaké označenie pre obe operácie.)

Poznámka 2.2.2. Dôležité je všimnúť si, že definícia podgrupy zahŕňa aj požiadavku, aby zúženie operácie $*$ na podmnožinu H bola binárna operácia na H . To znamená, že množina H je uzavretá vzhľadom na operáciu $*$, čiže

$$h_1, h_2 \in H \Rightarrow h_1 * h_2 \in H.$$

Pretože každá grupa musí obsahovať neutrálny prvok, priamo z definície vyplýva, že $H \neq \emptyset$.

Z toho, že podgrupa má rovnako definovanú grupovú operáciu vyplýva, že aj inverzné prvky a neutrálny prvok sú v podgrupe rovnaké ako v celej grupe.

Lema 2.2.3. *Nech $(G, *)$ je grupa a H je jej podgrupa.*

- (i) *Ak e_H je neutrálny prvok grupy H a e_G je neutrálny prvok grupy G , tak $e_H = e_G$. (Z toho špeciálne vyplýva $e_G \in H$, teda každá podgrupa musí obsahovať neutrálny prvok.)*
- (ii) *Ak $a \in H$, b je inverzný prvok k a v G a c je inverzný prvok k a v H , tak $b = c$.*

Dôkaz. (i) Z toho, že e_G je neutrálny prvok grupy G dostaneme

$$e_G * e_H = e_H.$$

Súčasne platí

$$e_H * e_H = e_H$$

lebo e_H je neutrálny prvok grupy H . Dostávame teda rovnosť

$$e_G * e_H = e_H * e_H$$

a zo zákona o krátení (v grupe G) potom vyplýva $e_G = e_H$.

(ii) Opäť využijeme zákon o krátení. Z prvej časti vieme, že $e_G = e_H$, označme teda neutrálny prvok oboch grúp ako $e := e_G = e_H$. Ak b je inverzný prvok k a v grupe G , tak $a * b = e$. Podobne, z toho, že c je inverzný prvok k a v H máme $a * c = e$. Z rovnosti

$$a * b = a * c$$

vyplýva $b = c$. □

Príklad 2.2.4. $(\mathbb{Q}, +)$ je podgrupa grupy $(\mathbb{R}, +)$, lebo operácia $+$ na \mathbb{Q} funguje rovnako ako sčítovanie reálnych čísel. Podobne $(\mathbb{Z}, +)$ je podgrupa $(\mathbb{Q}, +)$ a $(\mathbb{R}, +)$ je podgrupa grupy $(\mathbb{C}, +)$.

Podobne ako pri vektorových priestoroch, aj pri podgrupách máme pomerne jednoduché kritérium na zistenie, či nejaká podmnožina tvorí podgrupu danej grupy.

Veta 2.2.5 (Kritérium podgrupy). *Nech $(G, *)$ je grupa a $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$. Nasledujúce podmienky sú ekvivalentné*

- (i) *H je podgrupa grupy G ;*
- (ii) *množina H je uzavretá vzhľadom na operáciu $*$ a na tvorenie inverzných prvkov v G , čiže platí (pre ľubovoľné $a, b \in H$)*

$$a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$$

$$a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$$

- (iii) *pre ľubovoľné $a, b \in H$ platí aj $a^{-1} * b \in H$*

Dôkaz. (i) \Rightarrow (ii): Uzavretosť množiny H vzhľadom na operáciu $*$ vyplýva z toho, že zúženie operácie $*$ na H je binárna operácia na podmnožine H (poznámka 2.2.2). Ďalej z lemy 2.2.3 vieme, že inverzné prvky v H sú rovnaké ako v G . Preto inverzný prvok k ľubovoľnému $a \in H$ (v grupe G) musí patriť do H (je to inverzný prvok k a v grupe H).

(ii) \Rightarrow (iii): Ak $a, b \in H$ tak aj $a^{-1} \in H$ (na základe druhej z dvoch podmienok uvedených v (ii)), na základe prvej podmienky (použitej pre a^{-1} a b) potom dostaneme $a^{-1} * b \in H$.

(iii) \Rightarrow (ii): Pretože H je neprázdna množina, existuje aspoň jeden prvok $x \in H$. Použitím (iii) pre $b = a = x$ dostaneme $x^{-1} * x = e \in H$. Majme teraz ľubovoľné $a, b \in H$. Z (iii) pre

prvky a a e dostaneme $a^{-1} * e = a^{-1} \in H$. Ak teraz použijeme tú istú podmienku pre a^{-1} a b , dostaneme $(a^{-1})^{-1} * b = a * b \in H$. Obe implikácie z (ii) sú teda splnené.

(ii) \Rightarrow (i): Máme dokázať, že H so zúženou operáciou $*$ spĺňa podmienky z definície grupy. Uzavretosť na operáciu $*$ znamená, že zúženie operácie $*$ je binárna operácia na H (poznámka 2.2.2). Asociatívnosť sa automaticky zdedí z grupy G (pozri poznámku I-4.2.6). Ďalej by sme mali ukázať, že $e \in H$. Použijeme podobný postup, ako v predchádzajúcej časti dôkazu. Keďže $H \neq \emptyset$, existuje nejaký prvok $a \in H$ a z (ii) máme $a^{-1} * a = e \in H$. Zostáva nám dokázať, že každý prvok má v H inverzný prvok. Z predchádzajúcej lemy však vieme, že inverzné prvky v G a v H sú rovnaké a druhá časť podmienky (ii) hovorí, že podmnožina H je uzavretá vzhľadom na inverzné prvky. \square

Pri použití kritéria podgrupy potrebujeme overiť aj to, že podmnožina H je neprázdna. Pretože každá podgrupa musí obsahovať neutrálny prvok, je často najjednoduchšie začať overením, či ho daná podmnožina H naozaj obsahuje. (Ak zistíme, že $e \in H$, tak $H \neq \emptyset$ a môžeme použiť kritérium podgrupy. V opačnom prípade H nemôže byť podgrupa, takže ďalšie podmienky už nemusíme overovať.)

Poznámka 2.2.6. V skutočnosti ak je množina H konečná, je možné uvedené kritérium ešte o čosi zjednodušiť – stačí overovať podmienku $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$. Tento fakt dokážeme o niečo neskôr v dôsledku 2.4.5.

Poznámka 2.2.7. Kritérium podgrupy nám dáva inú možnosť ako dokázať, že nejaká množina so zadanou binárnou operáciou tvorí grupu. Pre konzistentnosť s uvedeným tvrdením, označme našu množinu H a binárnu operáciu $*$. Chceme overiť, že $(H, *)$ je grupa.

Kritérium podgrupy môžeme využiť v situácii, keď ide o zúženie nejakej binárnej operácie na väčšej množine G , o ktorej sme už ukázali, že tvorí grupu. Namiesto toho, aby sme overovali pre H podmienky z definície grupy, stačí nám overiť, že H spĺňa kritérium podgrupy.

Príklad 2.2.8. Ak $(G, *)$ je grupa, tak G je podgrupa grupy G . Ak e je neutrálny prvok grupy G , tak $\{e\}$ je podgrupa grupy G . Čiže každá grupa obsahuje dve podgrupy – celú grupu G a jednoprvkovú podgrupu $\{e\}$ obsahujúcu len neutrálny prvok.

Uvedieme teraz dva príklady podgrúp grupy $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Príklad 2.2.9. Označme $S = \{x \in \mathbb{C}; |x| = 1\}$. Množina S tvorí podgrupu grupy $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$. Skutočne:

Platí $1 \in S$, teda S je neprázdna.

Ak $x, y \in S$, znamená to $|x| = |y| = 1$. Potom $|xy| = |x| \cdot |y| = 1$, teda aj $xy \in S$.

Ak $x \in S$, čiže $|x| = 1$, tak $|\frac{1}{x}| = \frac{1}{|x|} = 1$, čiže $\frac{1}{x} \in S$.

Príklad 2.2.10. Podmnožiny $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ sú podgrupy grupy $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$. Stačí si uvedomiť, že podiel dvoch nenulových reálnych (racionálnych) čísel je opäť reálne (racionálne) číslo.

Príklad 2.2.11. Podmnožina \mathbb{R}^+ je podgrupa grupy $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$. Vyplýva to z toho, že podiel dvoch kladných čísel je opäť kladné číslo.

Kritérium podgrupy môžeme využiť na dôkaz nasledujúcej jednoduchšej lemy ako aj dôležitého tvrdenia 2.2.13 o prieniku podgrúp.

Lema 2.2.12. *Nech $(G, *)$ je grupa. Potom*

- (i) *Ak $K \subset H \subset G$ a K, H sú podgrupy G , tak K je podgrupa H .*

(ii) Ak H je podgrupa G a K je podgrupa H , tak K je aj podgrupa G .

Dôkaz. Cvičenie. □

Tvrdenie 2.2.13. Nech $(G, *)$ je grupa a H_i je podgrupa grupy G pre každé $i \in I$. Potom prienik týchto podgrúp

$$H := \bigcap_{i \in I} H_i$$

je opäť podgrupa grupy G .

Dôkaz. Potrebujeme ukázať, že $H \neq \emptyset$ a H spĺňa podmienku (iii) z vety 2.2.5.

Pretože $e \in H_i$ pre všetky podgrupy H_i , neutrálny prvok e leží aj v ich prieniku, a teda $H \neq \emptyset$.

Nech teraz $a, b \in H$. To znamená, že $a, b \in H_i$ pre každé $i \in I$. Z kritéria podgrupy potom dostaneme $a^{-1} * b \in H_i$. Pretože tento prvok patrí do každej z množín H_i pre $i \in I$, patrí aj do ich prieniku, čiže $a^{-1} * b \in H = \bigcap_{i \in I} H_i$. □

Príklad 2.2.14. Už sme videli, že $S = \{x \in \mathbb{C}; |x| = 1\}$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ aj \mathbb{R}^+ sú podgrupy grupy $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$. Môžeme si všimnúť, že $S \cap (\mathbb{R} \setminus \{0\}) = \{\pm 1\}$ aj $S \cap \mathbb{R}^+ = \{1\}$ sú podgrupy $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Priamo z tvrdenia 2.2.13 dostaneme nasledujúci dôležitý dôsledok.

Dôsledok 2.2.15. Ak $(G, *)$ je grupa a $A \subset G$ je ľubovoľná podmnožina G , tak prienik všetkých podgrúp obsahujúcich množinu A je tiež podgrupa G . Túto podgrupu nazývame podgrupa generovaná podmnožinou A a označujeme $[A]$. Ak $[A] = G$, hovoríme, že grupa G je generovaná podmnožinou A (alebo tiež, že A generuje G). V prípade, že $A = \{a\}$ je jednoprvková množina, tak namiesto $[\{a\}]$ budeme používať označenie $[a]$ a hovoríme o podgrupe generovanej prvkom a .

Definíciu podgrupy generovanej množinou A môžeme stručne zapísať ako

$$[A] = \bigcap \{H \subseteq G; H \supseteq A \wedge H \text{ je podgrupa } G\}. \quad (2.1)$$

Poznámka 2.2.16. Podgrupa generovaná množinou A je najmenšia (vzhľadom na inklúziu) podgrupa grupy G , ktorá obsahuje A . Pod pojmom „najmenšia vzhľadom na inklúziu“ rozumíme to, že pre ľubovoľnú podgrupu H , ktorá obsahuje A platí $[A] \subseteq H$. Inak povedané, je to najmenší prvok množiny tých podgrúp, ktoré obsahujú A , vzhľadom na čiastočné usporiadanie \subseteq na tejto množine.¹

Z toho, čo sme doteraz uviedli o podgrupe generovanej nejakou množinou je zrejmá analógia s pojmom vektorového podpriestoru generovaného nejakou množinou vektorov.

S týmto pojmom sa ešte stretneme, podrobnejšie sa budeme venovať najmä podgrupám generovaným jediným prvkom. Zatiaľ uveďme aspoň jeden jednoduchý príklad.

Príklad 2.2.17. Uvažujme grupu $(\mathbb{R}, +)$. Potom podgrupa generovaná prvkom 1 je \mathbb{Z} , čiže $\mathbb{Z} = [1]$.

Aby sme videli, že $\mathbb{Z} \subseteq [1]$, stačí si všimnúť, že keď nejaká podgrupa $(\mathbb{R}, +)$ obsahuje 1, musí obsahovať aj $2 = 1 + 1$, $3 = 2 + 1$ atď. Indukciou môžeme dokázať, že obsahuje všetky prirodzené čísla. Samozrejme, ako každá podgrupa, obsahuje aj neutrálny prvok 0

¹S pojmom čiastočné usporiadanie a najmenší prvok ste sa pravdepodobne už stretli alebo ešte stretnete na iných prednáškach, pozri [OŠ].

a z uzavretosti na inverzné prvky vyplýva, že musí obsahovať aj všetky záporné celé čísla. Takže podgrupa $[1]$ určite obsahuje všetky prvky množiny \mathbb{Z} .

Na druhej strane, \mathbb{Z} je podgrupa $(\mathbb{R}, +)$, ktorá obsahuje číslo 1. Takže je jednou z podgrúp vystupujúcich v prieniku (2.1), z čoho vyplýva $[1] \subseteq \mathbb{Z}$.

Takmer rovnakým spôsobom by sa dalo ukázať, že aj $[-1] = \mathbb{Z}$.

Pomerne ľahko sa môžete presvedčiť aj o tom, že $[\{2, 3\}] = \mathbb{Z}$ (úloha 2.2.12).

Príklad 2.2.18. Pozrime sa teraz na 6-prvkovú grupu $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$. (Usporiadané dvojice, kde na prvej súradnici sčítujeme modulo 2 a na druhej súradnici súradnici modulo 3 - pozri definíciu 2.1.5).

V tomto prípade (ako čitateľ ľahko overí) platí napríklad:

$$[(1, 0)] = \mathbb{Z}_2 \times \{0\};$$

$$[(0, 1)] = \{0\} \times \mathbb{Z}_3;$$

$[(1, 1)] = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$, keďže pomocou prvku $(1, 1)$ postupne dostaneme prvky $(0, 2)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ a $(0, 0)$, čiže všetky prvky grupy.

Príklad 2.2.19. Iným príkladom by bola podgrupa $H = \{1, \sqrt{2}\}$ grupy $(\mathbb{R}, +)$. T.j. H je najmenšia podmnožina množiny \mathbb{R} , ktorá obsahuje čísla 1 a $\sqrt{2}$ a je uzavretá na súčet aj na opačné prvky. Pomerne ľahko sa dá overiť, že

$$H = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

O trochu náročnejšie je ukázať, že táto grupa nie je cyklická; t.j. nedá sa v nej nájsť generátor (úloha 2.2.18*).

Cvičenia

Úloha 2.2.1. Dokážte lemu 2.2.12.

Úloha 2.2.2. Nájdite všetky podgrupy (\mathbb{Z}_6, \oplus) .

Úloha 2.2.3. Dokážte, že matice typu $n \times n$, ktorých determinant je rovný 1, s operáciou násobenia matíc tvoria grupu.

Úloha 2.2.4. Dokážte: Ak H je podgrupa grupy (G, \cdot) tak $H^2 = H \cdot H = H$.

Úloha 2.2.5. Ak A, B, C sú podgrupy G a $C \subseteq A \cup B$, tak $C \subseteq A$ alebo $C \subseteq B$.

Úloha 2.2.6. Tvoria pri sčítovaní/násobení matíc grupu štvorcové matice $n \times n$, ktoré sú: symetrické, antisymetrické, diagonálne, regulárne, horné trojuholníkové. . .

Úloha 2.2.7. Nájdite príklad nekonečnej grupy, ktorá obsahuje netriviálnu konečnú podgrupu. (Pod netriviálnou podgrupou tu rozumieme podgrupu, ktorá má viac ako jeden prvok.)

Úloha 2.2.8. Matice typu $n \times n$, ktoré v každom riadku a každom stĺpci majú práve jednu jednotku a ostatné prvky sú nulové, s operáciou násobenia matíc tvoria grupu. (Hint: Súvisia tieto matice nejako s permutáciami? Akým lineárnym zobrazeniam zodpovedajú?)

Úloha 2.2.9. Ukážte, že $H = \{\frac{m}{n}; m, n \text{ sú nepárne}\}$ je podgrupa grupy $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Úloha 2.2.10. Nájdite všetky podgrupy grupy $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ a všetky podgrupy grupy \mathbb{Z}_4 (v oboch prípadoch operácia \oplus). Majú tieto grupy rovnaký počet dvojprvkových podgrúp? (Z toho, čo sa naučíme v ďalšej podkapitole sa na základe tejto úvahy bude dať zdôvodniť, že tieto dve grupy nie sú izomorfné.)

Úloha 2.2.11. Je množina $H = \{\ln a; a \in \mathbb{Q}, a > 0\}$ podgrupou grupy $(\mathbb{R}, +)$?

Úloha 2.2.12. Budeme pracovať v grupe $(\mathbb{R}, +)$.

a) Dokážte, že $\{2, 3\} = \mathbb{Z}$;

b) Dokážte, že $\{1, \sqrt{2}\} = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Z}\}$.

c*) Je možné podgrupu $\{1, \sqrt{2}\}$ generovať jediným prvkom? (V terminológii, ktorú zaviedieme v časti 2.4 sa dá táto otázka sformulovať takto: Je podgrupa $\{1, \sqrt{2}\}$ cyklická?)

Úloha 2.2.13. Dokážte, alebo vyvráťte: Ak H_1 je podgrupa G_1 a H_2 je podgrupa G_2 , tak $H_1 \times H_2$ je podgrupa $G_1 \times G_2$.

Úloha 2.2.14. Nech H je podgrupa grupy G . Nech $g \in G$. Ukážte, že $gHg^{-1} = \{ghg^{-1}; h \in H\}$ je podgrupa grupy G .

Úloha 2.2.15. Nech V je vektorový priestor nad poľom \mathbb{R} . Je aj každá podgrupa grupy $(V, +)$ podprieorom priestoru V ? Ako je to s vektorovými priestormi nad poľom \mathbb{Z}_p ?

Úloha 2.2.16. Nech H je vlastná podgrupa grupy G (t.j. $H \neq G$). Dokážte, že $[G - H] = G$.

Úloha 2.2.17. Nech A, B sú podgrupy grupy G . Dokážte, že AB je podgrupa G práve vtedy, keď $AB = BA$.

Úloha 2.2.18*. Ukážte, že podgrupa H grupy $(\mathbb{R}, +)$ vygenerovaná prvkami 1 a $\sqrt{2}$ je presne $H = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Z}\}$. Ukážte, že táto grupa nie je cyklická, t.j. neexistuje prvok $h \in H$, pre ktorý by platilo $H = [h] = \{kh; k \in \mathbb{Z}\}$.

2.3 Homomorfizmy grúp

Pri vektorových priestoroch boli dôležité lineárne zobrazenia – zobrazenia zachovávajúce operácie určujúce vektorový priestor. Podobne aj pri štúdiu grúp sú užitočné zobrazenia medzi grupami, ktoré zachovávajú grupové operácie. Takéto zobrazenia voláme homomorfizmy.²

Definícia 2.3.1. Nech $(G, \circ), (H, *)$ sú grupy. Potom zobrazenie $f: G \rightarrow H$ je *homomorfizmus*, ak

$$f(g_1 \circ g_2) = f(g_1) * f(g_2)$$

platí pre ľubovoľné $g_1, g_2 \in G$.

Na označenie homomorfizmu budeme niekedy používať stručnejší zápis $f: (G, \circ) \rightarrow (H, *)$ (t.j. týmto zápisom súčasne popíšeme ako označujeme homomorfizmus a aj ako označujeme grupové operácie.)

Skôr než si tento pojem ilustrujeme na príkladoch, dokážeme si dve jednoduché vlastnosti, ktoré musí každý homomorfizmus spĺňať.

Veta 2.3.2. Nech $(G, \circ), (H, *)$ sú grupy a $f: G \rightarrow H$ je homomorfizmus. Označme ďalej e_G neutrálny prvok grupy G a e_H neutrálny prvok grupy H . (Inverzné prvky budeme v oboch prípadoch označovať pomocou horného indexu -1 ako obvykle.) Potom platí:

(i) $f(e_G) = e_H$ (teda homomorfizmus musí zobrazit neutrálny prvok na neutrálny prvok);

(ii) $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$ (teda homomorfizmy zachovávajú aj inverzné prvky).

²Keďže pojem homomorfizmu sa definuje aj pre iné štruktúry než sú grupy, niekedy sa používa aj termín *grupový homomorfizmus*.

Dôkaz. (i) Pretože

$$f(e_G) = f(e_G \circ e_G) = f(e_G) * f(e_G),$$

dostávame rovnosť $f(e_G) * e_H = f(e_G) = f(e_G) * f(e_G)$. Zo zákona o krátení (použitého pre grupu H) potom dostaneme $f(e_G) = e_H$.

(ii) Z definície homomorfizmu tentokrát máme

$$f(a^{-1}) * f(a) = f(a^{-1} \circ a) = f(e_G) \stackrel{(i)}{=} e_H,$$

teda $f(a^{-1}) * f(a) = (f(a))^{-1} * f(a)$ a opäť stačí použiť zákon o krátení, aby sme dostali $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$. \square

Príklad 2.3.3. Ak $(G, *)$ a (H, \circ) sú ľubovoľné grupy, tak $f: G \rightarrow H$ určené predpisom $f(g) = e_H$ pre všetky $g \in G$ je homomorfizmus.

Zobrazenie $id_G: G \rightarrow G$ je homomorfizmus pre každú grupu $(G, *)$.

Príklad 2.3.4. Uvažujme zobrazenie

$$f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot), \quad f: x \mapsto e^x.$$

Priamo z vlastností exponenciálnej funkcie vyplýva, že f je homomorfizmus

$$f(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y)$$

Príklad 2.3.5. Definujme

$$g: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (S, \cdot), \quad g: \varphi \mapsto e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

kde $S = \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}$ je grupa z príkladu 2.2.9. (Zápis $e^{i\varphi}$ budeme chápať jednoducho ako skratku zápisu $\cos \varphi + i \sin \varphi$. Ide o tzv. goniometrický a exponenciálny tvar komplexného čísla, pozri podkapitolu I-B.4.)

Fakt, že ide o homomorfizmus vyplýva z Moivreovej vety I-B.2.3, ktorá hovorí, že pri násobení komplexných čísel sa uhly sčítajú (a absolútne hodnoty sa násobia).

$$g(\varphi_1 + \varphi_2) = (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) = (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = g(\varphi_1) \cdot g(\varphi_2)$$

Príklad 2.3.6. Homomorfizmus z predchádzajúceho príkladu teraz trochu zmodifikujeme.

Budeme pracovať s grupou $(\langle 0, 2\pi \rangle, +)$, v ktorej je sčítovanie definované modulo 2π . Formálne môžeme operáciu $+$ definovať ako

$$\alpha + \beta = 2\pi \left\{ \frac{\alpha + \beta}{2\pi} \right\},$$

kde $\{x\}$ označuje desatinnú časť čísla x . (Význam znamienka $+$ na pravej strane predstavuje sčítovanie reálnych čísel, zatiaľčo na ľavej strane je operácia, ktorú definujeme. Na to ste si však už pravdepodobne zvykli, že niekedy označujeme rôzne veci rovnakým symbolom.)

Potom dostávame homomorfizmus

$$h: (\langle 0, 2\pi \rangle, +) \rightarrow (S, \cdot), \quad h: \varphi \mapsto e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

(Je to naozaj homomorfizmus, lebo zmena uhla φ o nejaký násobok 2π neovplyvní hodnotu čísla $\cos \varphi + i \sin \varphi$. Výsledok je teda rovnaký ako pri použití homomorfizmu z predchádzajúceho príkladu. Tento homomorfizmus je navyše bijektívny.)

Príklad 2.3.7. Nech $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Zobrazenie $f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, \oplus)$ dané predpisom

$$f(k) = k \bmod n$$

je homomorfizmus. (Rovnosť $f(k+l) = f(k) \oplus f(l)$ vyplýva z toho, že dostaneme rovnaký výsledok keď dve čísla sčítame a potom urobíme zvyšok po delení n a keď to urobíme v obrátenom poradí.)

Pripomeňme, čo rozumieme pod obrazom a vzorom množiny v danom zobrazení.

Definícia 2.3.8. Nech $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$.

Potom *obraz množiny* A v zobrazení f je

$$f[A] = \{f(a); a \in A\}$$

a *vzor množiny* B v zobrazení f je

$$f^{-1}(B) = \{a \in A; f(a) \in B\}.$$

V prípade, že $B = \{b\}$, t.j. že množina B je jednoprvková, používame niekedy stručnejšie označenie $f^{-1}(b)$ namiesto $f^{-1}(\{b\})$. (Hoci niekedy by sa mohlo toto označenie pliesť s označením pre obraz prvku b v inverznej funkcii, z kontextu snáď vždy bude jasné, čo máme na mysli.)

Všimnime si, že $f[A]$ je podmnožina množiny Y a pre $y \in Y$ platí

$$y \in f[A] \Leftrightarrow (\exists a \in A)y = f(a).$$

Množina $f^{-1}(B)$ je zasa podmnožinou množiny X a pre $x \in X$ máme

$$x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B.$$

Tvrdenie 2.3.9. Nech (G, \circ) , $(H, *)$ sú grupy a $f: G \rightarrow H$ je homomorfizmus.

- (i) Ak G' je podgrupa grupy G , tak aj jej obraz $f[G']$ je podgrupa grupy H .
- (ii) Ak H' je podgrupa grupy H , tak aj jej vzor $f^{-1}(H')$ je podgrupa grupy G .

Dôkaz. V oboch prípadoch použijeme kritérium podgrupy.

(i) Pretože $e_G \in G'$, z vety 2.3.2 máme $f(e_G) = e_H \in f[G']$, a teda $f[G'] \neq \emptyset$.

Nech $a, b \in f[G']$. To znamená, že existujú $a_1, b_1 \in G'$ také, že $f(a_1) = a$ a $f(b_1) = b$. Potom dostávame

$$f(a_1^{-1}b_1) = f(a_1)^{-1}f(b_1) = a^{-1}b.$$

Pretože G' je podgrupa, máme $a_1^{-1}b_1 \in G'$, a teda $a^{-1}b = f(a_1^{-1}b_1) \in f[G']$.

(ii) Opäť sa ľahko ukáže, že $e_G \in f^{-1}(H')$, teda táto podmnožina je neprázdna.

Ak $a, b \in f^{-1}(H')$, znamená to, že $f(a), f(b) \in H'$. Potom

$$f(a^{-1}b) = f(a)^{-1}f(b) = f(a)^{-1}f(b) \in H',$$

lebo H' je podgrupa. Zistili sme, že $a^{-1}b \in f^{-1}(H')$, teda $f^{-1}(H')$ vyhovuje podmienke z kritéria podgrupy. \square

Dôsledok 2.3.10. *Nech (G, \circ) , $(H, *)$ sú grupy a $f: G \rightarrow H$ je homomorfizmus. Potom jadro*

$$\text{Ker } f = \{g \in G; f(g) = e_H\}$$

je podgrupa grupy G a

$$\text{Im } f = \{f(g); g \in G\}$$

je podgrupa grupy H .

Dôkaz. Vyplýva z toho, že $\{e_H\}$ je podgrupa grupy H a G je podgrupa grupy G . \square

Definícia 2.3.11. *Nech (G, \circ) , $(H, *)$ sú grupy. Ak $f: G \rightarrow H$ je bijektívny homomorfizmus, hovoríme, že f je izomorfizmus alebo tiež, že grupy G a H sú izomorfné (označujeme $G \cong H$).*

Opäť, podobne ako v prípade vektorových priestorov, existencia izomorfizmu znamená, že grupy G a H sú v podstate rovnaké, len ich prvky sú inak pomenované. Bijektívne zobrazenie f je „slovníkom“, ktorý prekladá medzi týmito dvoma pomenovaniami.

Lema 2.3.12. *Nech $(G, *)$, (H, \circ) , (K, \odot) sú grupy.*

- (i) *Ak $f: G \rightarrow H$ je izomorfizmus, tak aj $f^{-1}: H \rightarrow G$ je izomorfizmus.*
- (ii) *Ak $f: G \rightarrow H$ a $g: H \rightarrow K$ sú homomorfizmy, tak aj $g \circ f: G \rightarrow K$ je homomorfizmus.*
- (iii) *Ak $f: G \rightarrow H$ a $g: H \rightarrow K$ sú izomorfizmy, tak aj $g \circ f: G \rightarrow K$ je izomorfizmus.*

Dôkaz. (i): Nech $a, b \in H$. Pretože f je surjekcia, existujú $a_1, b_1 \in G$ také, že $f(a_1) = a$, $f(b_1) = b$. Z definície homomorfizmu potom máme

$$a \circ b = f(a_1) \circ f(b_1) = f(a_1 * b_1).$$

Potom priamo z definície inverzného zobrazenia vyplýva

$$f^{-1}(a \circ b) = a_1 * b_1 = f^{-1}(a) * f^{-1}(b).$$

(ii): Ak $a, b \in G$, dvojnásobným použitím definície homomorfizmu dostaneme

$$g(f(a * b)) = g(f(a) \circ f(b)) = g(f(a)) \odot g(f(b))$$

(iii): Podľa (ii) je zloženie homomorfizmov opäť homomorfizmus. Súčasne vieme (tvrdenie I-2.2.13), že zloženie bijekcií je bijekcia. \square

Z predchádzajúcej lemy vidíme, že:

- a) ak grupa G je izomorfná s grupou H , tak aj H je izomorfná s G ,
 - b) ak G je izomorfná s H a H je izomorfná s K , tak aj grupy G a K sú izomorfné.
- Ak si navyše uvedomíme, že každá grupa je izomorfná sama so sebou (identické zobrazenie $id_G: G \rightarrow G$ je izomorfizmus), tak vidíme, že vzťah „byť izomorfný“ má podobné vlastnosti ako relácia ekvivalencie.

Príklad 2.3.13. Zobrazenie $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot)$, $f(x) = e^x$, z príkladu 2.3.4 je izomorfizmus. Aby sme videli, že f je bijekcia, stačí si všimnúť, že zobrazenie $f^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ dané predpisom $f^{-1}(x) = \ln x$ je inverzné k zobrazeniu f . (Podľa predchádzajúcej lemy je teda aj toto zobrazenie homomorfizmom.)

Príklad 2.3.14. Homomorfizmus $h(\varphi) = e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$, $h: ((0, 2\pi), +) \rightarrow (S, \cdot)$, z príkladu 2.3.6 je tiež izomorfizmom.

Aby sme videli, že h je bijekcia, stačí si uvedomiť, že prvky grupy S predstavujú body jednotkovej kružnice a každý bod na jednotkovej kružnici je jednoznačne určený uhlom z intervalu $(0, 2\pi)$, ktorý sa naň zobrazí zobrazením g .

Aj surjektívne a injektívne homomorfizmy majú niektoré zaujímavé vlastnosti, preto sa nám v budúcnosti bude hodiť nasledovná terminológia.

Definícia 2.3.15. Nech $f: (G, *) \rightarrow (H, \circ)$ je homomorfizmus. Ak f je injektívne zobrazenie, tak hovoríme, že f je *monomorfizmus*. Ak f je surjektívne zobrazenie, tak hovoríme, že f je *epimorfizmus*.

Hovoríme, že grupa (H, \circ) je *homomorfný obraz* grupy $(G, *)$, ak existuje epimorfizmus $f: (G, *) \rightarrow (H, \circ)$.

Videli sme napríklad, že pre každé $n \in \mathbb{N}$ je (\mathbb{Z}_n, \oplus) homomorfný obraz grupy $(\mathbb{Z}, +)$ (príklad 2.3.7), grupa (S, \cdot) je homomorfný obraz grupy $(\mathbb{R}, +)$ (príklad 2.3.4).

Cvičenia

Úloha 2.3.1. Zistite, či sú grupy G a H izomorfné:

- $G = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot) \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$, $H = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$
- $G = (\mathbb{Z}_6, \oplus)$, $H = (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, \oplus)$
- $G = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$, $H = (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$
- $G = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2, +)$, $H = (\mathbb{Z}, +)$ (Sčítovanie v $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ chápeme tak, že na prvej súradnici používame obvyklé sčítovanie a na druhej sčítujeme modulo 2, t.j. tak ako sme definovali priamy súčin grúp.)

Úloha 2.3.2. Zistite, či sú grupy G a H izomorfné a či je grupa H homomorfným obrazom grupy G . Svoju odpoveď zdôvodnite!

- $G = (\mathbb{R}, +) \times (\mathbb{R}, +)$, $H = (\mathbb{C}, +)$
- $G = (\mathbb{Q}, +)$, $H = (\mathbb{R}, +)$
- $G = (\mathbb{Q}, +)$, $H = (\mathbb{Q}^+, \cdot)$
- $G = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$, $H = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$
- $G = (\mathbb{Q}, +)$, $H = (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$

Úloha 2.3.3. Zistite, či sú grupy G a H izomorfné a či je niektorá z nich homomorfným obrazom druhej. Svoju odpoveď zdôvodnite!

- $G = (\mathbb{R}, +)$, $H = (\mathbb{R}^+, \cdot)$
- $G = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$, $H = (\mathbb{R}^+, \cdot)$
- $G = (\mathbb{Z}_4, \oplus)$, $H = (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \oplus)$
- $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = (\mathbb{Z}, +) \times (\mathbb{Z}, +)$

Úloha 2.3.4. Nech (G, \circ) je grupa. Je zobrazenie $g \mapsto g^{-1}$ izomorfizmus z G na G ? Ak nie, vedeli by ste definovať binárnu operáciu $*$ na G , tak, aby toto zobrazenie bol izomorfizmus grúp (G, \circ) a $(G, *)$? Je uvedené zobrazenie izomorfizmom, ak G je komutatívna?

Úloha 2.3.5. Nech $(G, *)$ je ľubovoľná grupa. Dokážte, že zobrazenie $g \mapsto g * g$ je homomorfizmus z G do G práve vtedy, keď G je komutatívna.

Úloha 2.3.6. a) Dokážte, že $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}$ s operáciou $*$ definovanou ako $(a, b) * (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ tvorí grupu.

b) Dokážte, že všetky nenulové matice tvaru $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ tvoria s násobením matíc grupu. (Hint k obom častiam úlohy: Možno vám pomôže nájsť jednoduchšie riešenie to, že táto úloha je v časti o homomorfizmoch.)

Úloha 2.3.7. Nech $f: G \rightarrow H$ je homomorfizmus grúp. Dokážte:

- a) Zobrazenie f je surjektívne práve vtedy, keď $\text{Im } f = H$.
 b) Zobrazenie f je injektívne práve vtedy, keď $\text{Ker } f = \{e\}$.

Úloha 2.3.8. Majme dané grupy G_1, G_2 a definujme zobrazenia $p_1: G_1 \times G_2 \rightarrow G_1$ a $p_2: G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$ ako

$$\begin{aligned} p_1(x, y) &= x, \\ p_2(x, y) &= y. \end{aligned}$$

Dokážte, že p_1 aj p_2 sú surjektívne homomorfizmy.

Úloha 2.3.9. Nech $f_1: G \rightarrow H_1$ a $f_2: G \rightarrow H_2$ sú homomorfizmy grúp. Potom aj zobrazenie $f: G \rightarrow H_1 \times H_2$ dané predpisom $f(x, y) = (g(x), h(y))$ je homomorfizmus.

Úloha 2.3.10. Nech $g: G \rightarrow G'$ a $h: H \rightarrow H'$ sú homomorfizmy grúp. Potom aj zobrazenie $f: G \times H \rightarrow G' \times H'$ dané predpisom $f(x, y) = (g(x), h(y))$ je homomorfizmus. Ak g a h sú izomorfizmy (surjektívne homomorfizmy/injektívne homomorfizmy), tak f je izomorfizmus (surjektívny homomorfizmus/injektívny homomorfizmus).

Úloha 2.3.11. Nech G je grupa. Dokážte, že potom množina

$$\Delta = \{(x, x); x \in G\}$$

je podgrupa grupy $G \times G$. Ukážte, že Δ je izomorfná s G .

Úloha 2.3.12. Nech $f, g: G \rightarrow H$ sú homomorfizmy grúp. Je množina $\{a \in G; f(a) = g(a)\}$ podgrupa grupy G ?

Úloha 2.3.13. Nech $f, g: (G, \circ) \rightarrow (H, *)$ sú homomorfizmy grúp. Definujme zobrazenie $h: G \rightarrow H$ ako $h(x) = f(x) * g(x)$. Bude aj h homomorfizmus? Bude to platiť v prípade, že H je komutatívna?

Úloha 2.3.14. Nech $(H, \circ), (G, *)$ sú grupy a $H \subseteq G$. Potom H je podgrupa G práve vtedy, keď zobrazenie $i: H \rightarrow G$ dané predpisom $i(h) = h$ je homomorfizmus.

Úloha 2.3.15. Nech $f: (G, *) \rightarrow (H, \circ)$ je homomorfizmus, ktorý je surjektívny ale nie injektívny.

- a) Dokážte, že existuje aspoň jedno pravé inverzné zobrazenie k f , ktoré nie je homomorfizmom.
 b) Ukážte na príklade, že môže nastať taká situácia, že žiadne pravé inverzné zobrazenie nie je homomorfizmom.
 c) Ukážte na príklade, že môže nastať aj taká situácia, že aspoň jedno pravé inverzné zobrazenie je homomorfizmom.

Rozhodnite podobné otázky pre injektívny ale nesurjektívny homomorfizmus a ľavé inverzné zobrazenie.

Úloha 2.3.16. Dokážte, že ak grupa H je homomorfickým obrazom komutatívnej grupy G , tak aj H je komutatívna.

Úloha 2.3.17. Nech (G, \cdot) je grupa. Pre $a \in G$ označíme $C_G(a) = \{x \in G; xa = ax\}$. Dokážte, že $C_G(a)$ je podgrupa grupy G . Čomu sa rovná $C_G(e)$? Čomu sa rovná $C_G(a)$, ak G je komutatívna grupa?

Úloha 2.3.18. Nech $(G, *)$ je grupa. Ukážte, že $(G, *')$ s operáciou definovanou ako³

$$x *' y = y * x$$

je tiež grupa a že tieto dve grupy sú izomorfné, t.j. $(G, *) \cong (G, *')$.

2.4 Cyklické grupy

V tejto kapitole budeme často využívať označenie pre opakované použitie binárnej operácie, t.j.

$$x^n = \underbrace{x \circ \dots \circ x}_{n\text{-krát}}$$

Formálne toto označenie zavedieme pomocou definície matematickou indukciou.

Definícia 2.4.1. Nech (G, \circ) je grupa a $x \in G$. Potom pre $n \in \mathbb{N}$ definujeme indukciou $x^1 = x$ a

$$x^{n+1} = x^n \circ x.$$

Ďalej definujeme $x^0 = e$, kde e je neutrálny prvok grupy G a $x^{-n} = (x^{-1})^n$ pre ľubovoľné $n \in \mathbb{N}$. (Tým je výraz x^k definovaný pre ľubovoľné $k \in \mathbb{Z}$.)

Ukážeme, že práve zadaná mocnina v grupe sa správa podobne, ako celočíselné mocniny. (Tvrdenia v nasledujúcej leme sú na prvý pohľad jasné a ich formálny dôkaz je len cvičením na matematickú indukciu.)

Lema 2.4.2. Nech (G, \circ) je grupa, $x, y \in G$, $m, n \in \mathbb{Z}$. Potom platí:

- (i) Ak $x \circ y = y \circ x$, tak $x \circ y^n = y^n \circ x$.
- (ii) Ak $x \circ y = y \circ x$, tak platí aj $(x \circ y)^n = x^n \circ y^n$.
- (iii) $x^{-n} = (x^n)^{-1}$
- (iv) $x^{m+n} = x^m \circ x^n = x^n \circ x^m$
- (v) $(x^m)^n = x^{mn}$

Dôkaz. (i): Uvedené tvrdenie dokážeme najprv pre $n \in \mathbb{N}$. Budeme postupovať matematickou indukciou vzhľadom na n .

1° Pre $n = 0$ máme $x \circ e = e \circ x$, pre $n = 1$ máme $x \circ y = y \circ x$, čo je náš predpoklad.

2° Ak platí $x \circ y^n = y^n \circ x$ (indukčný predpoklad), tak dostaneme

$$x \circ y^{n+1} = x \circ (y^n \circ y) = (x \circ y^n) \circ y \stackrel{IP}{=} (y^n \circ x) \circ y = y^n \circ (x \circ y) = y^n \circ (y \circ x) = (y^n \circ y) \circ x = y^{n+1} \circ x.$$

Ak $n < 0$, označme $k = -n$. Potom z už dokázanej časti tvrdenia máme

$$x \circ y^n = x \circ y^{-k} = x \circ (y^{-1})^k = (y^{-1})^k \circ x = y^{-k} \circ x = y^n \circ x$$

³Wikipédia: Opposite group https://en.wikipedia.org/wiki/Opposite_group

(ii): Aj túto časť najprv overíme pre $n \in \mathbb{N}$.

Opäť pre $n = 0$ je platnosť tvrdenia zrejmá a pre $n = 1$ sa zhoduje priamo s predpokladom. Predpokladajme, že (ii) platí pre n . Pre $n + 1$ dostávame postupne

$$\begin{aligned}(x \circ y)^{n+1} &= (x \circ y)^n \circ (x \circ y) \stackrel{IP}{=} (x^n \circ y^n) \circ (x \circ y) = x^n \circ (y^n \circ x) \circ y \stackrel{(i)}{=} \\ &= x^n \circ (x \circ y^n) \circ y = (x^n \circ x) \circ (y^n \circ y) = x^{n+1} \circ y^{n+1}.\end{aligned}$$

Rovnosť (ii) rozšírime na záporné čísla priamo použitím definície. Pre $n \in \mathbb{N}$ máme

$$(x \circ y)^{-n} = ((x \circ y)^{-1})^n = ((y \circ x)^{-1})^n = (x^{-1} \circ y^{-1})^n = (x^{-1})^n \circ (y^{-1})^n = x^{-n} \circ y^{-n}.$$

(iii): Najprv nech $n \in \mathbb{N}$. Z (ii) dostávame

$$x^{-n} \circ x^n = (x^{-1})^n \circ x^n = (x^{-1} \circ x)^n = e^n = e$$

(posledná rovnosť sa ľahko overí indukciou na n).

Rovnosť, ktorú sme odvodili, znamená, že $x^{-n} = (x^n)^{-1}$.

Ak $n < 0$, tak $n = -k$ pre nejaké $k \in \mathbb{N}$. Pre k už máme tvrdenie dokázané, čo znamená, že $x^{-k} = (x^k)^{-1}$ a

$$(x^n)^{-1} = ((x^k)^{-1})^{-1} = x^k = x^{-n}.$$

(iv) Overíme tvrdenie najprv pre $n \in \mathbb{N}$ a $m \geq -n$. Budeme postupovať indukciou vzhľadom na n . (T.j. indukciou na n dokazujeme výrok $(\forall m \geq -n)x^{m+n} = x^m \circ x^n = x^n \circ x^m$.)

1° Pre $n = 0$ máme $x^{m+0} = x^m \circ e = e \circ x^m$, čo evidentne platí.

2° Nech uvedená rovnosť platí pre n (a pre ľubovoľné $m \in \mathbb{N}$). Potom

$$x^{m+(n+1)} = x^{(m+n)+1} = x^{m+n} \circ x = (x^m \circ x^n) \circ x = x^m \circ (x^n \circ x) \stackrel{IP}{=} x^m \circ x^{n+1}$$

(Nerovnosť $m \geq -n$ sme potrebovali na to, aby $m + n \geq 0$, lebo iba v tomto prípade je $x^{(m+n)+1}$ definované uvedeným spôsobom. Takisto sme využili rovnosť $x^{n+1} = x^n \circ x$, ktorú zatiaľ máme len pre $n \geq 0$.)

Podobne dostaneme

$$\begin{aligned}x^{m+(n+1)} &= x^{(m+n)+1} = x^{m+n} \circ x = (x^n \circ x^m) \circ x = x^n \circ (x^m \circ x) \stackrel{(i)}{=} \\ &= x^n \circ (x \circ x^m) = (x^n \circ x) \circ x^m = x^{n+1} \circ x^m.\end{aligned}$$

Tým sme dokázali (iv) pre ľubovoľné $n \in \mathbb{N}$ a $m + n \geq 0$. Zo symetrie vyplýva, že platí aj pre $m \in \mathbb{N}$ a $m + n \geq 0$, čiže vlastne už máme túto rovnosť dokázanú pre ľubovoľné celé čísla m, n také, že $m + n \geq 0$.

Teraz, ak $m, n \in \mathbb{Z}$ sú také, že $m + n < 0$, tak

$$x^{m+n} = (x^{-1})^{(-m)+(-n)} = (x^{-1})^{-m} \circ (x^{-1})^{-n} = x^m \circ x^n,$$

podobne možno odvodiť druhú časť rovnosti (kde sú iba vymenené m a n .)

(v): Najprv túto rovnosť dokážeme pre $n \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{Z}$ pomocou (iv) indukciou vzhľadom na n . (T.j. výrok $V(n)$, ktorý dokazujeme indukciou, je $(\forall m \in \mathbb{Z})(x^m)^n = x^{mn}$.)

1° Pre $n = 0$ máme rovnosť $e = e$, pre $n = 1$ máme $x^m = x^m$; v oboch prípadoch rovnosť platí.

2° Nech (v) platí pre n . Pre $n + 1$ potom dostaneme

$$(x^m)^{n+1} = (x^m)^n \circ x^m \stackrel{IP}{=} x^{mn} \circ x^m \stackrel{(iv)}{=} x^{mn+m} = x^{m(n+1)}.$$

Na záporné čísla túto rovnosť rozšírime nasledovne

$$(x^m)^{-n} = ((x^m)^{-1})^n \stackrel{\text{(iii)}}{=} ((x)^{-m})^n = (x)^{-mn} \stackrel{\text{(iii)}}{=} x^{mn}.$$

□

Ako sme už spomínali pre definíciu I-3.3.12, niekedy namiesto a^n používame zápis $n \times a$ (hlavne ak je grupová operácia označená ako $+$ alebo \oplus) – hovoríme o multiplikatívnom a aditívnom zápise grupovej operácie.

Definícia 2.4.3. Nech (G, \circ) je grupa a $x \in G$. *Rád prvku x* v grupe G je najmenšie číslo $n \in \mathbb{N}$ také, že $n > 0$ a

$$x^n = e.$$

Ak také číslo neexistuje, rád prvku x sa definuje ako ∞ .

Indukciou sa dá ľahko dokázať (úloha 2.4.1), že pre ľubovoľný homomorfizmus $f: (G, *) \rightarrow (H, \circ)$ platí

$$f(a^n) = f(a)^n. \quad (2.2)$$

Z toho môžeme odvodiť, že ak f je izomorfizmus, tak f zachováva rády prvkov. (T.j. rád prvku a v grupe G je rovnaký ako rád $f(a)$ v H . Pozri úlohu 2.4.1.)

Tento fakt môžeme využiť, ak chceme dokázať, že medzi niektorými dvoma grupami neexistuje izomorfizmus.

Príklad 2.4.4. Ukážeme, že grupy $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ a \mathbb{Z}_4 nie sú izomorfné.

Stačí si uvedomiť, že v grupe \mathbb{Z}_4 je rád prvku 1 rovný 4. Ak by bola táto grupa izomorfná s grupou $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, tak by aj v nej musel existovať prvok rádu 4. Prvky $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ však majú rád 2 a neutrálny prvok $(0, 0)$ má rád 1. Teda v $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ nie je žiadny prvok rádu 4.

Postup z predchádzajúceho príkladu je dosť často používaný v prípade, že chceme dokázať neexistenciu izomorfizmu medzi dvoma grupami. Nájdeme nejakú vlastnosť, ktorú izomorfizmy zachovávajú (invariant) a ukážeme, že jedna z grúp túto vlastnosť nemá. Z vlastností s ktorými sme sa doteraz stretli sa dajú použiť napríklad rád prvku, veľkosť grupy alebo jej podgrúp (v zmysle počtu prvkov alebo kardinality⁴), existencia prvku spĺňajúceho nejakú identitu (ako napríklad $x * x = x$, $x^3 = a^2$ alebo $x * y \neq y * x$ – existencia prvkov, ktoré nekomutujú), atď. Niektoré z týchto vlastností sa dajú použiť aj na dôkaz, že neexistuje (surjektívny) homomorfizmus z jednej grupy do druhej.

Ľahko sa dá ukázať, že v konečnej grupe má každý prvok konečný rád (úloha 2.4.4). Tento fakt možno overiť veľmi podobným spôsobom, aký použijeme v nasledujúcom dôkaze.

Tvrdenie 2.4.5. *Nech $(G, *)$ je grupa a $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$ je jej konečná podmnožina. Potom H je podgrupa G práve vtedy, keď platí*

$$a, b \in H \Rightarrow a * b \in H. \quad (2.3)$$

Dôkaz. Implikácia $\boxed{\Rightarrow}$ je zrejmalá.

$\boxed{\Leftarrow}$ Podľa vety 2.2.5(ii) nám stačí overiť, že pre každý prvok $a \in H$ aj inverzný prvok a^{-1} patrí do H .

Na to nám stačí ukázať, že prvok $a \in H$ má konečný rád – ak totiž vieme, že existuje prirodzené číslo n také, že $a^n = e$, tak $a^{n-1} * a = a * a^{n-1} = e$, čo znamená, že a^{n-1} je inverzný

⁴S pojmom kardinality (mohutnosti) množiny ste sa už pravdepodobne stretli na niektorej inej prednáške.

prvok $k a$. Z (2.3) však indukciou ľahko dostaneme, že $a^{n-1} \in H$. (Môžeme predpokladať, že $a \neq e$, a teda $n > 1$. Pre neutrálny prvok e dokazovaná implikácia očividne platí.)

Nech teda $a \in H$. Vieme, že pre ľubovoľné n aj $a^n \in H$. Keďže množina H je konečná, existujú $m \neq k$ také, že $a^m = a^k$. Bez ujmy na všeobecnosti, nech $m > k$. Potom z rovnosti $a^m = a^k$ dostaneme $a^{m-k} = e$. Ukázali sme teda existenciu prirodzeného čísla $n := m - k$ takého, že $a^n = e$. \square

Definícia 2.4.6. *Cyklická grupa* je grupa G , ktorá je generovaná nejakým jej prvkom $a \in G$.

Prvok a , ktorý generuje grupu G , nazývame *generátor* grupy G .

Príklad 2.4.7. V príklade 2.2.17 sme videli, že $\mathbb{Z} = [1]$, teda $(\mathbb{Z}, +)$ je cyklická grupa. Súčasne platí $\mathbb{Z} = [-1]$, teda generátor cyklickej grupy nemusí byť jednoznačne určený.

Lema 2.4.8. *Ak $(G, *)$ je grupa a $a \in G$, tak $H = \{a^n; n \in \mathbb{Z}\}$ je podgrupa grupy G .*

Dôkaz. Pretože $e = a^0 \in H$, množina H je neprázdna. Overme, či pre H platí kritérium podgrupy.

Ak $a^n, a^m \in H$, tak aj $a^n * a^m = a^{n+m} \in H$.

Ak $a^n \in H$, tak aj $(a^n)^{-1} = a^{-n} \in H$. \square

Veta 2.4.9. *Ak G je cyklická grupa a a je jej generátor, tak*

$$G = \{a^n; n \in \mathbb{Z}\},$$

t.j. G pozostáva práve z mocnín generátora a .

Dôkaz. Z predchádzajúcej lemy vieme, že $H = \{a^n; n \in \mathbb{Z}\}$ je podgrupa G obsahujúca prvok a . Preto $[a] \subseteq H$. Z predpokladu, že G je generovaná prvkom a potom máme $G \subseteq H$ a keďže H je podmnožina G , musí platiť $G = H$. \square

V predchádzajúcom dôkaze sme vlastne súčasne ukázali, že

$$[a] = \{a^n; n \in \mathbb{Z}\}.$$

Lema 2.4.8 hovorí vlastne to, že pre každý prvok a obsahuje G cyklickú podgrupu generovanú prvkom a .

Pripomeňme, že pod označením $a \mid b$ (a delí b), kde $a, b \in \mathbb{Z}$ rozumieme to, že existuje nejaké celé číslo c také, že $b = c \cdot a$.

$$a \mid b \quad \Leftrightarrow \quad (\exists c \in \mathbb{Z})(b = c \cdot a)$$

Lema 2.4.10. *Ak $a \in G$, kde G je grupa, a rád prvku a je $n \in \mathbb{N}$, tak*

$$a^m = a^k \quad \Leftrightarrow \quad n \mid m - k.$$

Ak rád prvku a je ∞ , tak

$$a^m = a^k \quad \Leftrightarrow \quad m = k.$$

Dôkaz. Uvažujme najprv prípad, že rád a je n .

\Rightarrow Ak $a^m = a^k$, tak $a^{m-k} = e$. Nech $l = (m - k) \bmod n$ je zvyšok čísla $m - k$ po delení n . Potom $a^l = e$ a $0 \leq l < n$. Ak by platilo $l > 0$, dostali by sme spor s tým, že n je najmenšie prirodzené číslo s touto vlastnosťou. Preto musí platiť $l = 0$. Keďže $m - k$ má nulový zvyšok po delení číslom n , je to násobok čísla n .

⇐ Ak $m - k = cn$, t.j. $m = k + cn$, tak $a^m = a^{k+cn} = a^k(a^n)^c = a^k e^c = a^k e = a^k$.

Dôkaz prípadu, keď rád a je ∞ , je veľmi podobný, snáď len s tým rozdielom, že implikácia

⇐ je v tomto prípade zrejímavá. Dokážme teda netriviálny smer.

⇒ Bez ujmy na všeobecnosti môžeme predpokladať $m \geq k$. Ak $a^m = a^k$, tak $a^{m-k} = e$. Pretože rád a je ∞ , neexistuje číslo $n > 0$ také, že $a^n = e$. To znamená, že $m - k = 0$ a $m = k$. □

Ak sa pozrieme na to, čo nám táto lema hovorí v prípade $k = 0$, tak dostaneme:

Dôsledok 2.4.11. Ak $a \in G$, kde G je grupa, a rád prvku a je $n \in \mathbb{N}$, tak

$$a^m = e \quad \Leftrightarrow \quad n \mid m.$$

Ak rád prvku a je ∞ , tak

$$a^m = e \quad \Leftrightarrow \quad m = 0.$$

Môžete sa pokúsiť dokázať si tento dôsledok priamo, bez použitia lemy 2.4.10 – úloha 2.4.11. Vedeli by ste dokázať lemu 2.4.10 pomocou dôsledku 2.4.11. (Teda dokázať tieto dve tvrdenia v opačnom poradí, než sme to urobili v tomto texte.)

Veta 2.4.12. Nech G je cyklická grupa a a je jej generátor. Ak rád prvku a je $n \in \mathbb{N}$, tak $G \cong (\mathbb{Z}_n, \oplus)$. Ak rád prvku a je ∞ , tak $G \cong (\mathbb{Z}, +)$. (Teda každá cyklická grupa je izomorfná so \mathbb{Z} alebo so \mathbb{Z}_n).

Dôkaz. Najprv nech rád generátora a je rovný n . Definujme zobrazenie $f: k \mapsto a^k$, $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow G$. Ukážeme, že f je izomorfizmus. Z lemy 2.4.2 máme

$$a^{k+l} = a^k a^l.$$

Súčasne, z lemy 2.4.10, máme

$$a^{k+l} = a^{k \oplus l}$$

pretože čísla $k + l$ a $k \oplus l$ sa líšia o nejaký násobok čísla n .

Dalej ukážeme, že zobrazenie f je bijektívne.

Surjektívnosť: Keďže a je generátor grupy G , každý prvok tejto grupy má tvar a^s pre nejaké s (veta 2.4.9). Ak s' je zvyšok čísla s po delení číslom n , tak $s' \in \mathbb{Z}_n$ a navyše $n \mid s - s'$, takže (podľa predchádzajúcej lemy) $a^s = a^{s'} = f(s')$.

Injektívnosť: Ak $f(s) = f(t)$, čiže $a^s = a^t$, máme $n \mid s - t$. Ak $s, t \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, tak $s - t \in \{0, \pm 1, \dots, \pm(n-1)\}$. Jediné číslo z tejto množiny, ktoré je deliteľné n , je 0, a teda $s - t = 0$ a $s = t$.

Zostáva nám ešte ukázať druhý prípad, t.j. rád a je ∞ . (Dôkaz v tomto prípade je veľmi podobný.) Definujme $f: \mathbb{Z} \rightarrow G$ ako $f(n) = a^n$.

Homomorfizmus:

$$f(k+l) = a^{k+l} = a^k a^l = f(k)f(l)$$

podľa lemy 2.4.2.

Surjektívnosť: Každý prvok z G je tvaru $a^n = f(n)$ pre nejaké $n \in \mathbb{Z}$ podľa vety 2.4.9.

Injektívnosť: Druhá časť lemy 2.4.10. □

Špeciálne z predchádzajúcej vety vidíme, že každá netriviálna grupa musí obsahovať podgrupu homomorfnú so $(\mathbb{Z}, +)$ alebo s niektorým (\mathbb{Z}_n, \oplus) . Takisto si môžeme všimnúť, že rád prvku je presne počet prvkov podgrupy generovanej týmto prvkom.

Ešte sa skúsme zaoberať otázkou, či z cyklickej grupy dostaneme opäť cyklickú grupu pomocou niektorých základných operácií – podgrupa, homomorfný obraz, priamy súčin grúp (definícia 2.1.5).

Veta 2.4.13. Každá podgrupa cyklickej grupy je cyklická.

Dôkaz. Nech G je cyklická grupa s generátorom a a H je nejaká jej podgrupa. Nech d je najmenšie prirodzené číslo také, že $d > 0$ a $a^d \in H$. (Ak $H \neq \{e\}$, tak existuje aspoň jedno také číslo.) Dokážeme, že a^d generuje H (a teda H je cyklická).

Najprv si uvedomme, aké prvky patria do podgrupy $[a^d]$ generovanej prvkom a^d . Podľa vety 2.4.9 sú to presne prvky tvaru $(a^d)^k = a^{kd}$ pre $k \in \mathbb{Z}$, čiže tie mocniny generátora a , pre ktoré je exponent násobkom d .

Postupujeme sporom. Nech by existoval prvok $a^s \in H$ taký, že $a^s \notin [a^d]$. Číslo s môžeme prepísať ako $s = k \cdot d + s'$, kde $0 \leq s' < d$ (číslo s sme vydělili číslom d , zvyšok sme označili s'). Ak predpokladáme, že $a^s \notin [a^d]$, tak $s' \neq 0$. (V opačnom prípade by totiž platilo $a^s = a^{kd}$ a už sme ukázali, že prvky takéhoto tvaru patria do $[a^d]$.) Z rovnosti $a^s = a^{kd}a^{s'}$ dostaneme

$$a^{s'} = (a^{kd})^{-1}a^s,$$

a pretože $a^{kd}, a^s \in H$ a H je podgrupa, z tejto rovnosti vyplýva $a^{s'} \in H$. Pretože $0 < s' < d$, dostávame tak spor s predpokladom, že d je najmenší možný exponent taký, že $a^d \in H$. \square

Veta 2.4.14. Homomorfny obraz cyklickej grupy je cyklická grupa.

Dôkaz. Ak $f: G \rightarrow H$ je epimorfizmus a a je generátor G , tak ľahko možno vidieť, že $f(a)$ je generátor grupy H .

Skutočne, každý prvok z H je tvaru $f(a^n)$ pre nejaké $n \in \mathbb{Z}$ (na základ surjektívnosti f) a podľa (2.2) platí $f(a^n) = f(a)^n$, čiže ho vieme dostať ako mocninu prvku $f(a)$. \square

Na vyriešenie otázky, kedy je súčin cyklických grúp opäť cyklická grupa, budeme potrebovať pomocné tvrdenie týkajúce sa najväčšieho spoločného deliteľa. Nebudeme ho na tomto mieste dokazovať, keďže neskôr dokážeme všeobecnejšiu verziu tohoto výsledku – konkrétne v tvrdení 4.4.22. Ak by Vás zaujímal jeho dôkaz už teraz, môžete si ho pozrieť napríklad v [ŠHHK, Lema 3.1.3], [Č], [S2] (a v podstate v takmer každom úvodnom texte zaoberajúcom sa deliteľnosťou). Najprv však pripomeňme definíciu najväčšieho spoločného deliteľa.

Definícia 2.4.15. Najväčší spoločný deliteľ čísel $a, b \in \mathbb{Z}$ je číslo $d \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ s vlastnosťami

- (i) $d \mid a \wedge d \mid b$ (čiže d delí obe čísla);
- (ii) ak $c \mid a$ a $c \mid b$, tak $c \leq d$ (čiže d je najväčšie číslo s uvedenou vlastnosťou).

Najväčší spoločný deliteľ budeme označovať ako $d = \gcd(a, b)$.

Tvrdenie 2.4.16. Ak $d = \gcd(m, n)$ je najväčší spoločný deliteľ dvoch čísel $m, n \in \mathbb{N}$ tak existujú také $u, v \in \mathbb{Z}$, že platí $um + vn = d$.

Napríklad pre čísla 3 a 7 máme $\gcd(3, 7) = 1$ a skutočne platí $(-2) \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 1$. Ak skúsime o niečo väčšie čísla, tak napríklad $\gcd(14, 9) = 1$ a $2 \cdot 14 - 3 \cdot 9 = 1$.

Veta 2.4.17. Grupa $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ je cyklická práve vtedy, keď m a n sú nesúdeliteľné, t.j. ich najväčší spoločný deliteľ $\gcd(m, n) = 1$. V takomto prípade je prvok $(1, 1)$ jej generátorom.

Dôkaz. \Rightarrow Najprv ukážeme, že ak $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ je cyklická grupa, tak dvojica $(1, 1)$ je jej generátorom. Nech (g_1, g_2) je ľubovoľný generátor. Zrejme potom g_1 je generátor \mathbb{Z}_m a g_2 je generátor \mathbb{Z}_n . Potom priradenie $g_1 \mapsto 1$ jednoznačne určuje izomorfizmus $f_1: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$ a priradenie $g_2 \mapsto 1$ nám dáva izomorfizmus $f_2: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$. Potom $f: \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ určené predpisom

$$f(x, y) = (f_1(x), f_2(y))$$

je tiež izomorfizmus (úloha 2.3.10). Platí $f(g_1, g_2) = (1, 1)$, čiže $(1, 1)$ je generátor.

Ak $d = \gcd(m, n) > 1$, tak podgrupa $[(1, 1)]$ generovaná dvojicou $(1, 1)$ neobsahuje dvojicu $(1, 0)$. Skutočne, ak by platilo pre nejaké $k \in \mathbb{Z}$ v tejto grupe $k \times (1, 1) = (1, 0)$, znamenalo by to, že v celých číslach platia rovnosti

$$\begin{aligned}k &= am + 1 \\k &= bn\end{aligned}$$

z čoho $bn - am = 1$. Pritom však d delí obe čísla m aj n , teda $d \mid bn - am = 1$, čo je spor. (Jediné celočíselné delitele čísla 1 sú ± 1 , my sme predpokladali $d > 1$.)

◁ Očividne $[(1, 0), (0, 1)] = \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$, stačí teda ukázať, že pomocou $(1, 1)$ vieme vygenerovať dvojicu $(1, 0)$ a $(0, 1)$. Ak $am + bn = 1$, tak v grupe $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ platia rovnosti (zapísané aditívne)

$$\begin{aligned}am \times (1, 1) &= (0, 1) \\bn \times (1, 1) &= (1, 0)\end{aligned}$$

□

V príklade 2.2.18 sme videli, že grupa $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ je skutočne generovaná prvkom $(1, 1)$.

Cvičenia

Úloha 2.4.1. Nech $f: (G, *) \rightarrow (H, \circ)$ je homomorfizmus. Dokážte, že potom platí:

- $f(a^n) = f(a)^n$
- $a^n = e_G \Rightarrow f(a)^n = e_H$
- Ak f je navyše izomorfizmus, tak $a^n = e_G \Leftrightarrow f(a)^n = e_H$.
- Izomorfizmus zachováva rád prvku, t.j. rád prvku a v grupe G je rovnaký ako rád prvku $f(a)$ v grupe H .
- Viete niečo povedať o vzťahu medzi rádmi prvkov a a $f(a)$ aj ak f je homomorfizmus? (T.j. bez predpokladu o bijektivnosti.)

Úloha 2.4.2. Nech $(G, *)$ je cyklická grupa a a je jej generátor. Potom ľubovoľný homomorfizmus z G do nejakej grupy (H, \circ) je jednoznačne určený obrazom prvku a .

Úloha 2.4.3. Nájdite všetky izomorfizmy medzi (\mathbb{Z}_4, \oplus) a $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \odot)$.

Úloha 2.4.4. Ukážte, že ak G je konečná grupa, tak každý jej prvok má konečný rád.

Úloha 2.4.5. a) Ukážte, že grupa $(\mathbb{Q}, +)$ nie je cyklická.

b) Ukážte, že grupa $(\mathbb{R}, +)$ nie je cyklická.

Úloha 2.4.6. Nájdite všetky homomorfizmy:

- zo \mathbb{Z}_4 do $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$,
- zo $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ do \mathbb{Z}_4 ,

Úloha 2.4.7. Zistite, či sú grupy G a H izomorfné. Svoju odpoveď zdôvodnite!

- $G = (\mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}, \odot)$, $H = (\mathbb{Z}_6, \oplus)$
- $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = (\mathbb{Q}, +)$
- $G = (\mathbb{Z}_6, \oplus)$, $(\mathbb{Z}_2, \oplus) \times (\mathbb{Z}_3, \oplus)$

Úloha 2.4.8. V každej grupe majú nasledujúce prvky rovnaký rád: x a xyx^{-1} ; ab a ba ; abc , bca a cab . Naopak, prvky abc a cba môžu mať rôzny rád. (Hint: Jedna z možností ako dokázať, že dva prvky $g, h \in G$ majú rovnaký rád je dokázať ekvivalenciu $g^n = e \Leftrightarrow h^n = e$. Iná možnosť je nájsť izomorfizmus $f: G \rightarrow G$ taký, že $f(g) = h$, a použiť úlohu 2.4.1a.)

Úloha 2.4.9. Nech $a, b \in G$, kde G je grupa, $a, b \neq e$ také, že $ab = ba$ a $b^3 = 1$. Dokážte, že $\{a^n, ba^n, b^2a^n; n \in \mathbb{Z}\}$ je podgrupa grupy G .

Úloha 2.4.10. Nech $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Pre každé $k \mid n$ existuje k -prvková podgrupa grupy (\mathbb{Z}_n, \oplus) .

Úloha 2.4.11. Ak rád prvku a v grupe G je n a e je neutrálny prvok tejto grupy, tak pre prirodzené čísla $k \in \mathbb{N}$ platí $a^k = e$ práve vtedy, keď $n \mid k$. Ďalej pre každé $s \in \mathbb{N}$ existuje $m \in \mathbb{N}$ také, že $a^s = a^m$ a $0 \leq m \leq n - 1$.

Úloha 2.4.12. Nech x je prvok rádu n . Potom:

a) Rád prvku x^m delí n .

b*) Rád prvku x^m je $\frac{n}{(m,n)}$, kde (m, n) označuje najväčší spoločný deliteľ čísel m a n . (Hint: Tvrdenie 2.4.16.)

Úloha 2.4.13. Ak $f: G \rightarrow H$ je homomorfizmus grúp a $g \in G$ je prvok konečného rádu, tak rád prvku $f(g)$ delí rád prvku G .

Úloha 2.4.14. Nech G je grupa, $a \in G$ je prvok konečného rádu n . Nech H je podgrupa grupy G a $k = \min\{j \in \mathbb{N}; j > 0, a^j \in H\}$, t.j. k je najmenšie kladné prirodzené číslo také, že $a^k \in H$. Dokážte, že $k \mid n$; t.j. k delí rád prvku g .

Úloha 2.4.15. Nech G je grupa regulárnych matíc typu 2×2 nad \mathbb{R} s násobením a $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Dokážte, že A má rád 4, B má rád 3, ale AB má rád ∞ .

Úloha 2.4.16. Nech G je grupa a $a, b \in G$ sú prvky také, že a, b aj ab majú rád 2. Dokážte, že $ab = ba$.

Úloha 2.4.17. Nech $x, y \in G$, kde G je grupa. Ukážte, že ak $x^3y = yx^3$ a x má rád 7, tak $xy = yx$.

Úloha 2.4.18*. Nech $a, b \in G$, kde G je grupa. Ukážte, že ak $ba = a^4b^3$, tak prvky a^4b a a^2b^3 majú rovnaký rád.

Úloha 2.4.19. Nech x a y sú prvky konečného rádu grupy G a nech $xy = yx$. Dokážte, že ak $[x] \cap [y] = \{e\}$, čiže prienik podgrúp generovaných týmito prvkami je triviálna podgrupa, tak rád prvku xy je najmenší spoločný násobok rádov prvkov x a y . Platia tieto tvrdenia aj ak x a y nekomutujú?

Úloha 2.4.20*. Nech x a y sú prvky konečného rádu grupy G a nech $xy = yx$. Dokážte, že ak ich rády k a l sú nesúdeliteľné, tak rád prvku xy je kl . Dokážte, že existujú exponenty m a n , také, že rád prvku $x^m y^n$ je rovný $[k, l]$ (najmenší spoločný násobok rádov). Platia tieto tvrdenia aj ak x a y nekomutujú? (Hint: V tomto príklade môže byť užitočné tvrdenie 2.4.16.)


2.5 Permutácie

S permutáciami sme sa už stretli pri definícii determinantu (kapitola I-6).

Z minulého semestra už vieme, že pod *permutáciou* konečnej⁵ množiny M rozumieme bijekciu z M od M . Tiež sme sa dohodli na označení permutácií množiny $\{1, \dots, n\}$ pomocou zápisu

$$\left(\begin{array}{c} 1 & 2 & \dots & n \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n) \end{array} \right),$$

⁵Názov permutácia sa niekedy vyskytuje aj ako pomenovanie bijekcie nekonečnej množiny na seba. My sa budeme držať terminológie, ktorú sme zaviedli už v minulom semestri – t.j. pri permutáciách automaticky predpokladáme, že ide o konečnú množinu.



Obr. 2.1: Príklad permutácie 5-prvkovej množiny. Vidíme, že z každého prvku vychádza aj do každého prvku vchádza práve jedna šípka.

Napríklad permutáciu znázornenú na obrázku 2.1 by sme zapísali ako

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Tiež vieme, že zloženie permutácií je permutácia a inverzné zobrazenie k danej permutácii je permutácia. Pomocou týchto faktov vieme ukázať, že permutácie danej konečnej množiny tvoria grupu. Množinu všetkých permutácií n -prvkovej množiny $\{1, 2, \dots, n\}$ budeme označovať S_n a nazývať *symetrická grupa*.

V tejto časti sa budeme zaoberať o niečo podrobnejšie grupou S_n všetkých permutácií n -prvkovej množiny a niektorými jej podgrupami. Začneme tým, že si povieme o rozklade permutácie na jednoduchšie permutácie (budeme ich volať cykly), ktorý nám (okrem iného) umožní vyrátať rád ľubovoľného prvku v grupe S_n .

2.5.1 Rozklad na súčin disjunktných cyklov

Ak sa pozrieme na permutáciu na obrázku 2.1 vidíme, že na tomto obrázku sa po jednotlivých šípkach z prvku 1 dostaneme do prvku 4 a potom naspäť znova do prvku 1. Podobne z prvku 2 sa dostaneme do 3 a 5 a potom opäť do 2.

Toto musí platiť pre ľubovoľnú permutáciu. Ak začneme s ľubovoľným prvkom, opakovaným aplikovaním tej istej permutácie po konečnom počte krokov dostaneme znova ten istý prvok. Dôvodom je, že máme len konečný počet prvkov – teda po istom čase sa niektorý prvok zopakuje. Ak by to bol iný prvok, ako ten z ktorého sme začali, dané zobrazenie by nebola bijekcia. (Podrobnejšie tento argument vysvetlíme v dôkaze tvrdenia 2.5.7.) Vďaka tomu môžeme každú permutáciu rozdeliť na cykly.

Celá táto časť je venovaná spôsobu ako môžeme práve uvedený jednoduchý fakt formálne zapísať a dokázať. Tiež si povieme, prečo je tento poznatok užitočný.

Najprv potrebujeme zaviesť pojem cyklu.

Definícia 2.5.1. Permutáciu φ konečnej množiny M nazveme *cyklus*, alebo *cyklická permutácia* ak existujú prvky a_1, a_2, \dots, a_k také, že

$$\begin{cases} \varphi(a_i) = a_{i+1} \text{ pre } i = 1, 2, \dots, k-1, \\ \varphi(a_k) = a_1, \\ \varphi(a) = a \text{ pre ostatné prvky } a \neq a_i. \end{cases}$$

Pre cyklus tohoto tvaru budeme používať zápis $(a_1 a_2 \dots a_k)$.

V definícii cyklu pripúšťame aj nulový počet prvkov. *Prázdny cyklus*, ktorý označujeme $()$, sa rovná identickej permutácii.

Všimnime si, že zápis pomocou cyklov môžeme použiť pre ľubovoľnú množinu. Tento zápis však neidentifikuje množinu, ktorej permutáciu robíme – tá musí byť zadaná zvlášť.

Príklad 2.5.2. Uvažujme permutácie množiny $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Zápis $\varphi = (14)$ označuje permutáciu s vlastnosťou $\varphi(1) = 4$ a $\varphi(4) = 1$, ktorá prvky 2, 3 a 5 nemení (teda $\varphi(2) = 2$, $\varphi(3) = 3$, $\varphi(5) = 5$).

Zápis $\tau = (235)$ znamená permutáciu určenú predpisom $\tau(1) = 1$, $\tau(2) = 3$, $\tau(3) = 5$, $\tau(4) = 4$, $\tau(5) = 2$.

Všimnime si, že ten istý cyklus môže byť zapísaný viacerými spôsobmi: $\tau = (235) = (352) = (523)$.

Tiež si môžeme všimnúť, že identickú permutáciu môžeme zapísať nielen ako prázdny cyklus ale aj ako ľubovoľný jednoprvkový cyklus: $id = () = (1) = (2) = (3) = (4) = (5)$

Príklad 2.5.3. Vieme, že inverzné zobrazenie k permutácii je tiež permutácia. Ak máme cyklus $\varphi = (a_1 a_2 \dots a_n)$, tak inverzná permutácia je tiež cyklus $\varphi^{-1} = (a_n a_{n-1} \dots a_1)$. Zodpovedá to tomu, že poprechádzame po tých istých šípkach tvoriacich cyklus, ale v opačnom poradí.

Pre cykly z predchádzajúceho príkladu máme $\varphi^{-1} = (14)$ a $\tau^{-1} = (253)$.

Definícia 2.5.4. Dve permutácie φ a τ tej istej množiny M nazveme *disjunktné*, ak pre každý prvok $a \in M$ platí $\varphi(a) = a$ alebo $\tau(a) = a$. (Teda každý prvok zostáva nezmenený pri aspoň jednej z týchto dvoch permutácií.)

Špeciálne, dva cykly $(a_1 a_2 \dots a_k)$ a $(b_1 b_2 \dots b_l)$, kde $k, l \geq 2$, sú disjunktné, ak platí rovnosť $\{a_1, a_2, \dots, a_k\} \cap \{b_1, b_2, \dots, b_l\} = \emptyset$.

Nasledujúca lema hovorí, že poradie disjunktných permutácií môžeme pri skladaní vymeniť – disjunktné permutácie komutujú.

Lema 2.5.5. Ak φ a τ sú disjunktné permutácie, tak

$$\varphi \circ \tau = \tau \circ \varphi.$$

Dôkaz. Stačí priamym výpočtom overiť, že permutácia na ľavej aj pravej strane rovnosti nadobúda rovnaké hodnoty; čiže $\tau(\varphi(m)) = \varphi(\tau(m))$.

Dokážme túto rovnosť najprv pre prípad, že $\varphi(m) \neq m$. Potom z injektívnosti zobrazenia φ máme $\varphi(\varphi(m)) \neq \varphi(m)$. Pretože φ a τ sú disjunktné, permutácia τ nemení prvky m ani $\varphi(m)$, teda $\tau(m) = m$ a $\tau(\varphi(m)) = \varphi(m)$. Použitím týchto rovností dostaneme

$$\tau(\varphi(m)) = \varphi(m) = \varphi(\tau(m)).$$

Prípad $\tau(m) \neq m$ je symetrický.

Zostáva už len možnosť $\tau(m) = \varphi(m) = m$, vtedy však na oboch stranách rovnosti dostaneme m :

$$\tau(\varphi(m)) = \varphi(\tau(m)).$$

□

Príklad 2.5.6. Lahko si môžeme všimnúť, že pre permutácie, ktoré nie sú disjunktné, predchádzajúce tvrdenie neplatí. Zoberme napríklad cykly $\varphi = (12)$ a $\tau = (135)$. Potom dostaneme

$$\varphi \circ \tau = (1352) \quad \text{a} \quad \tau \circ \varphi = (1235).$$

Tvrdenie 2.5.7. Každú permutáciu možno zapísať ako zloženie disjunktných cyklov. Tento zápis je jednoznačný až na poradie cyklov (a vynechanie prázdneho cyklu a jednoprvkových cyklov). Nazývame ho rozklad permutácie na súčin disjunktných cyklov.

Dôkaz. Uvažujme ľubovoľnú permutáciu φ množiny M .

Existenciu rozkladu permutácie φ na súčin disjunktných dokážeme indukciou vzhľadom na počet prvkov množiny M . Pre jednoprvkovú množinu máme jedinou možnú permutáciu id_M , ktorá sa rovná prázdnejmu cyklu.

Predpokladajme teraz, že M má n prvkov a pre ľubovoľnú množinu s menej ako n prvkami tvrdenie platí. Zoberme teraz ľubovoľný prvok $a \in M$. Položme $a_1 = a$, $a_{i+1} = \varphi(a_i)$ pre všetky $i = 1, 2, \dots$. Nech k je najmenšie číslo také, že $k \geq 1$ a $a_{k+1} = a$. Ukážeme najprv, že také číslo musí existovať.

Pretože množina M je konečná, musia sa niektoré prvky v postupnosti (a_k) opakovať, t.j. existujú nejaké čísla s a t s vlastnosťou $a_s = a_t$ a $s \neq t$. Tvrdíme, že ak s je najmenšie možné takéto číslo, tak $s = 1$. Skutočne, v opačnom prípade máme $\varphi(a_{s-1}) = \varphi(a_{t-1})$ a z injektívnosti zobrazenia φ dostaneme $a_{s-1} = a_{t-1}$.

Zistili sme, že existuje aspoň jedno číslo s horeuvedenými vlastnosťami, preto môžeme definovať k ako najmenšie číslo, ktoré má tieto vlastnosti. Pomocou neho definujeme cyklus

$$\tau = (a_1 a_2 \dots a_k).$$

Položme ďalej $\psi = \tau^{-1}\varphi$. Ukážeme, že permutácie ψ a τ sú disjunktné a že $\psi(a) = a$.

Skutočne, pre ľubovoľný z z prvkov a_1, a_2, \dots, a_{k-1} platí $\varphi(a_i) = a_{i+1}$ a $\tau^{-1}(a_{i+1}) = a_i$, teda $\psi(a_i) = \tau^{-1}(\varphi(a_i)) = a_i$. Podobne môžeme overiť, že $\psi(a_k)\tau^{-1}(\varphi(a_k)) = \tau^{-1}(a_1) = a_k$. Vidíme, že permutácia ψ nemení žiadny z prvkov, ktoré mení cyklus τ teda tieto permutácie sú disjunktné. Špeciálne, ψ nemení prvok $a_1 = a$.

Teraz si stačí uvedomiť, že ψ (resp. zúženie tohoto zobrazenia) môžeme chápať ako permutáciu množiny $M \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$, ktorá má menej prvkov ako množina M . Podľa indukčného predpokladu teda existuje rozklad $\psi = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_l$ tejto permutácie na disjunktné cykly. Potom

$$\varphi = \tau(\tau^{-1}\varphi) = \tau\psi = \tau\tau_1 \dots \tau_l$$

je rozklad permutácie φ na disjunktné cykly.

Jednoznačnosť. Predpokladajme, že máme 2 rozklady

$$\varphi_1 \dots \varphi_s = \psi_1 \dots \psi_t$$

tej istej permutácie na disjunktné cykly, pričom v rozkladoch sa nevyskytuje prázdny cyklus. Postupujeme indukciou vzhľadom na s .

Ak $s = 0$, teda na ľavej strane rovnosti je identita, musí byť aj počet disjunktných cyklov na pravej strane nulový. V opačnom prípade by sme mali na pravej strane aspoň jeden neprázdny cyklus, teda permutácia na pravej strane by menila aspoň jeden prvok, čiže permutácia na pravej strane by nebola identita.

Predpokladajme teraz, že $s > 0$, čiže daná permutácia nie je identita. Nech a je nejaký prvok, ktorý táto permutácia mení. Tento prvok sa musí vyskytovať v aspoň jednom z cyklov, súčasne z disjunktnosti vyplýva, že sa nemôže vyskytovať vo viacerých cykloch. Teda prvok a sa vyskytuje práve v jednom z cyklov vystupujúcich na ľavej strane rovnosti, podobne v práve jednom z cyklov na pravej strane. Bez ujmy na všeobecnosti (cykly môžeme poprehadzovať) predpokladajme, že sú to cykly φ_1 a τ_1 . Potom dostaneme $\varphi_1(a) = \varphi(a) = \tau_1(a)$, podobne $\varphi_1^2(a) = \varphi^2(a) = \tau_1^2(a)$ atď. Čiže všetky prvky vyskytujúce sa v cykle φ_1 sa zobrazia rovnako aj cyklom τ_1 a obrátene. Platí teda $\varphi_1 = \tau_1$. Z toho dostaneme rovnosť $\varphi_2 \dots \varphi_s = \psi_2 \dots \psi_t$. Pre tieto cykly už môžeme použiť indukčný predpoklad. \square

Příklad 2.5.8. Pre permutáciu $\varphi = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{smallmatrix} \right)$ (obrázok 2.1) dostaneme rozklad $\varphi = (14)(235)$.

Z toho vieme hneď zistiť aj $\varphi^{-1} = (14)(253)$.

Rozklad na súčin disjunktných cyklov môže byť užitočný pri výpočte rádu permutácie (v zmysle rádu prvku grupy všetkých permutácií danej množiny).

Definícia 2.5.9. Ak φ je permutácia konečnej množiny M , tak *řád permutácie* φ je najmenšie prirodzené číslo $n \geq 1$ také, že

$$\varphi^n = id_M.$$

Napríklad v príklade I-2.3.2 sme zistili, že rád permutácie $\varphi = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ je 3. (Všimnime si, že ide o cyklickú permutáciu.)

Lema 2.5.10. *Rád cyklu je rovný jeho dĺžke, t.j. ak $\varphi = (a_1 \dots a_n)$, tak rád φ je rovný n .*

Dôkaz. Pre $k = 1, 2, \dots, n-1$ je $\varphi^k(a_1) = a_k \neq a_1$. Až pre $k = n$ prvýkrát dostaneme $\varphi^k(a_1) = a_1$. Úplne rovnaké zdôvodnenie prejde aj pre ostatné prvky cyklu, čiže máme $\varphi^n = id$ a navyše n je najmenšie číslo z množiny $\{1, 2, 3, \dots\}$ s touto vlastnosťou. \square

Z predchádzajúcej lemy vidíme, že ak n je rád cyklu φ , tak $\varphi^k = id_M$ platí práve vtedy, keď k je násobkom n , t.j. $n \mid k$.

Veta 2.5.11. *Rád permutácie je najmenší spoločný násobok dĺžok disjunktných cyklov, ktoré vystupujú v jej rozklade.*

Dôkaz. Nech $\varphi = \tau_1 \dots \tau_m$ je rozklad permutácie φ na disjunktné cykly. Pretože disjunktné cykly komutujú, mocniny permutácie φ môžeme vyjadriť ako

$$\varphi^n = \tau_1^n \dots \tau_m^n.$$

Pritom permutácie $\tau_1^n, \dots, \tau_m^n$ sú opäť disjunktné. Z toho vyplýva, že aby sme dostali identické zobrazenie, musí pre každé $i = 1, 2, \dots, m$ platiť $\tau_i^n = id_M$. To nastane práve vtedy, keď n je násobkom rádu τ_i (pre všetky i). Teda najmenšie možné n s takouto vlastnosťou je najmenší spoločný násobok rádov jednotlivých disjunktných cyklov. Podľa lemy 2.5.10 sú to presne dĺžky jednotlivých cyklov. \square

Príklad 2.5.12. Vypočítajme rád permutácie $\varphi = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right) = (14)(235)$. Podľa predchádzajúcej vety by to mal byť najmenší spoločný násobok čísel 2 a 3, čiže 6.

Keď sa to pokúsime overiť na základe definície, dospejeme k tomu istému výsledku:

$$\varphi^2 = (253),$$

$$\varphi^3 = (14),$$

$$\varphi^4 = (235),$$

$$\varphi^5 = (14)(253),$$

$$\varphi^6 = id.$$

2.5.2 Parita permutácie

S pojmom inverzie sme sa už stretli pri definícii determinantu. Teraz ho použijeme na zedefinovanie pojmu párnej a nepárnej permutácie.

Definícia 2.5.13. Dvojica $(\varphi(k), \varphi(s))$ sa volá *inverzia* permutácie φ , ak $k < s$ ale $\varphi(k) > \varphi(s)$.

Ak má permutácia φ párny počet inverzií, hovoríme, že je to *párna permutácia*, v opačnom prípade hovoríme o *nepárnej permutácii*.

Príklad 2.5.14. Permutácia $\varphi = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ má 7 inverzií: $(4,3)$, $(4,1)$, $(4,2)$, $(3,1)$, $(3,2)$, $(5,1)$ a $(5,2)$. Teda táto permutácia je nepárna.

Na dôkaz niektorých vlastností parity permutácií sa nám budú hodiť cykly dĺžky dva.

Definícia 2.5.15. Permutáciu tvaru $(a_1 a_2)$ (t.j. dvojprvkový cyklus) budeme nazývať *transpozícia*.

Príklad 2.5.16. Ukážeme, že transpozícia je nepárna permutácia. Bez ujmy na všeobecnosti, nech $a_1 < a_2$. Nech $\varphi = (a_1 a_2)$, t.j. $\varphi(a_1) = a_2$, $\varphi(a_2) = a_1$ a $\varphi(a) = a$ pre $a \neq a_1, a_2$. Potom všetky inverzie permutácie φ sú $(a_2 = \varphi(a_1), i)$ a $(i, a_1 = \varphi(a_2))$ pre $a_1 < i < a_2$ (týchto je párny počet) a inverzia (a_2, a_1) .

Tvrdenie 2.5.17. Každú permutáciu možno zapísať ako zloženie transpozícií. Navyše, pri každom takomto zápise je parita počtu transpozícií rovná parite permutácie. (Teda permutácia je párna práve vtedy, keď ju je možné získať zložením párneho počtu transpozícií. Permutácia je nepárna práve vtedy, keď sa dá dostať zložením nepárneho počtu transpozícií.)

Poznámka 2.5.18. Prvá časť tohoto tvrdenia hovoríme o tom, že každá permutácia sa dá rozložiť na transpozície. Na rozdiel od rozkladu na disjunktné cykly, v tomto prípade už rozklad nemusí byť jednoznačný. Lahko sa presvedčíte o tom, že napríklad pre permutácie množiny $\{1, 2, 3, 4\}$ máme

$$(123) = (13)(12) = (12)(23) = (12)(23)(13)(13) = (14)(34)(24)(14).$$

Je to príklad permutácie, ktorú môžeme rozložiť na transpozície rôznymi spôsobmi, dokonca aj počet použitých transpozícií môže byť rôzny. (Keďže sme v našom príklade zobrali párnú permutáciu, tak z tvrdenia 2.5.17 vieme, že pri akomkoľvek rozklade na transpozície bude ich počet párny.)

Dôkaz tvrdenia 2.5.17. Na dôkaz prvej časti stačí ukázať, že každý cyklus sa dá rozložiť na transpozície (pretože podľa tvrdenia 2.5.7 sa dá každá permutácia rozložiť na cykly). Jedna z možností, ako rozložiť cyklus dĺžky $n \geq 2$ na transpozície je

$$(a_1 a_2 \dots a_n) = (a_1 a_n)(a_1 a_{n-1}) \dots (a_1 a_2).$$

Na dôkaz druhej časti si stačí uvedomiť dve skutočnosti. Prvou z nich je, že transpozícia je nepárna permutácia – pozri príklad 2.5.16. Keď ďalej dokážeme, že pri zložení ľubovoľnej permutácie s nejakou transpozíciou sa zmení parita, dôkaz je hotový.

Majme teda ľubovoľnú permutáciu φ a uvažujme transpozíciu $\tau = (ij)$, pričom $i < j$. Potom

$$\psi = \varphi \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \varphi(1) & \dots & \varphi(i) & \dots & \varphi(j) & \dots & \varphi(n) \end{pmatrix} (ij) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \varphi(1) & \dots & \varphi(j) & \dots & \varphi(i) & \dots & \varphi(n) \end{pmatrix}.$$

(Predchádzajúcim zápisom sa myslí to, že jediné miesta, na ktorých sa ψ a φ líšia, sú i -te a j -te miesto, t.j. líšia sa len obrazy prvkov i a j . Preto sme vyznačili iba tieto prvky a okrem nich prvý a posledný prvok a ich obrazy.)

Pokúsme sa zistiť, ako sa líši počet inverzií permutácií φ a ψ . Zrejme jediné inverzie, ktoré sme mohli ovplyvniť, sú tie, ktoré obsahovali prvky i a j .

Je zrejmé, že ak $(\varphi(i), \varphi(j))$ je inverzia, t.j. ak $i < j$, tak dvojica $(\psi(i), \psi(j))$ už inverziu netvorí. Takisto obrátene, ak tieto dva prvky netvorí inverziu permutácie φ , dostaneme z nich inverziu v ψ .

Skúsme nájsť ešte aj ostatné inverzie, ktoré mohli „vzniknúť“ alebo „zaniknúť“.

Inverzie, ktoré sa ešte mohli zmeniť môžu byť jedine také, že jeden prvok z dvojice, ktorá je „zanikajúcou“ alebo „vznikajúcou“ inverziou je buď $\varphi(i)$ alebo $\varphi(j)$ a druhý prvok je $\varphi(k)$ pre niektoré $i < k < j$.

Navyše, charakter každej takejto dvojice sa zmení na opačný. T.j. ak $(\varphi(i), \varphi(k))$ je inverzia φ , tak $(\varphi(k), \varphi(i)) = (\psi(k), \psi(j))$ už nie je inverzia. A takisto obrátene, ak táto dvojica pôvodne netvorila inverziu, v permutácii ψ ju už určite tvorí. Takých dvojíc je práve $j - i - 1$.

Podobná úvaha však samozrejme platí aj keď zoberieme j namiesto i .

Celkove sme teda zistili, že pri zložení s transpozíciou (ij) sa zmení počet inverzií o ± 1 pre $2(j - i - 1) + 1$ dvojíc, čo je nepárne číslo. Teda parita permutácie sa musí zmeniť. \square

Všimnime si, že v dôkaze predchádzajúceho tvrdenia sme okrem iného ukázali aj to, že cyklus párnej dĺžky je nepárna permutácia a obrátene cyklus nepárnej dĺžky je párna permutácia. (Pretože cyklus dĺžky n sme rozložili na $n + 1$ transpozícií.)

Dôsledok 2.5.19. *Zložením dvoch permutácií rovnakej parity dostaneme párnú permutáciu. Zložením párnej a nepárnej permutácie dostaneme nepárnu permutáciu.*

Príklad 2.5.20. Uvažujeme permutáciu z predchádzajúceho príkladu a pozrime sa na jej rozklad na disjunktné cykly.

$$\varphi = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{array} \right) = (14)(235).$$

Je zložená z 2 cyklov, jeden z nich je párnej dĺžky, teda je to nepárna permutácia. Druhý z nich má nepárnu dĺžku, čiže ide o párnú permutáciu. Permutácia φ je teda zložením párnej a nepárnej permutácie, preto φ je nepárna permutácia.

Dôsledok 2.5.21. *Párne permutácie tvoria podgrupu grupy S_n . Grupu tvorenú párnymi permutáciami množiny $\{1, 2, \dots, n\}$ budeme označovať A_n a nazývať alternujúca grupa.*

Dôkaz. Zrejme $id \in A_n$, preto $A_n \neq \emptyset$. Podľa predchádzajúceho dôsledku je táto množina uzavretá na skladanie.

Keďže A_n je konečná množina, na základe tvrdenia 2.4.5 už dostávame, že to je podgrupa. \square

Hoci sme vďaka tvrdeniu 2.4.5 nepotrebovali v predošlom dôkaze kontrolovať uzavretosť na inverzné prvky, môžeme si uvedomiť, že ak je permutácia vyjadrená pomocou transpozícií, tak veľmi ľahko nájdeme vyjadrenie pre inverznú permutáciu. Najprv si všimnime, že pre ľubovoľnú transpozíciu τ platí $\tau^{-1} = \tau$. Z toho dostávame, že ak $\varphi = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_k$, kde τ_1, \dots, τ_k sú transpozície, tak

$$\varphi^{-1} = \tau_k^{-1} \tau_{k-1}^{-1} \dots \tau_2^{-1} \tau_1^{-1} = \tau_k \tau_{k-1} \dots \tau_2 \tau_1,$$

teda jednoducho stačí vymeniť poradie permutácií. (Túto úvahu by sme mohli využiť na dôkaz dôsledku 2.5.21 bez použitia tvrdenia 2.4.5.)

V oblasti zábavnej matematiky sa tiež môžeme stretnúť s podgrupami S_n . Ako grupy permutácií možno chápať povolené transformácie Rubikovej kocky (pozri [KGGS, Kapitola 3.2]) alebo tiež „hra 15“ (pozri [KGGS, Cvičenia 3.6.9*, 3.6.10*]).

Cvičenia

Úloha 2.5.1. V tomto cvičení budeme pracovať s permutáciami množiny $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (čiže prvkami grupy S_8) a budeme zadané permutácie aj výsledky vždy zapisovať ako súčiny disjunktných cyklov: Označme

$$\varphi = (14)(235)(78)$$

$$\psi = (234)(67)$$

$$\tau = (135)(24)(68)$$

a) Vypočítajte $(\varphi \circ \psi) \circ \tau$ a $\varphi \circ (\psi \circ \tau)$

- b) Ku každej z uvedených permutácií vypočítajte inverznú permutáciu.
 c) Zistite rád a paritu permutácií φ , ψ , τ a aj permutácií, ktoré sme dostali ako výsledky v predchádzajúcich častiach tejto úlohy.

Úloha 2.5.2. Pre dané permutácie určte rád, paritu, a rozklad na disjunktné cykly:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Dalej vypočítajte permutácie $\varphi\tau\psi$, φ^{-1} , τ^{-1} , ψ^{-1} .

Úloha 2.5.3. Vypočítajte $\varphi \circ \psi$ a $\psi \circ \varphi$ pre:

a) $\varphi = (14)(5678)$, $\psi = (23)(5678)$

b) $\varphi = (124)(5678)$, $\psi = (23)(5678)$.

Je niektorý z týchto prípadov príkladom nedisjunktných permutácií, ktoré komutujú?

Úloha 2.5.4. V grupe (S_7, \circ) nájdite rád a paritu permutácie $\varphi = (12)(14)(35)(26)(21)(67)$. Vypočítajte φ^{127} . Nájdite cyklickú podgrupu S_7 generovanú touto permutáciou. S ktorou grupou (\mathbb{Z}_n, \oplus) je táto podgrupa izomorfná?

Úloha 2.5.5. Zostavte tabuľku grupovej operácie pre grupu S_3 .

Úloha 2.5.6. Nájdite všetky podgrupy grupy S_3 .

Úloha 2.5.7. Ak počet inverzií permutácie $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ je k , zistite počet inverzií permutácie $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_n & a_{n-1} & \dots & a_1 \end{pmatrix}$.

Úloha 2.5.8. Dokážte, že grupa S_n je generovaná:

a) Množinou všetkých transpozícií.

b) Množinou transpozícií $\{(12), (13), \dots, (1n)\}$.

c) Množinou transpozícií $\{(12), (23), \dots, (n-1, n)\}$.

d) Transpozíciou (12) a cyklom $(12 \dots n)$. (Hint: Skúste vyrátať $(12 \dots n)^{-k}(12)(12 \dots n)^k$.) Dokážte, že S_4 nie je generovaná pomocou (13) a (1234) . (Teda S_4 síce je generovaná cyklom dĺžky 4 a transpozíciou, túto transpozíciu však nemôžeme vybrať ľubovoľne.)

Úloha 2.5.9. Dokážte, že alternujúca grupa A_n je generovaná:

a) Množinou všetkých cyklov (ijk) dĺžky 3.

b) Množinou cyklov dĺžky 3 tvaru $(123), (124), \dots, (12n)$.

Úloha 2.5.10. Popíšte permutácie z grupy S_n , ktoré majú rád 2. Aký je ich počet? (Stačí najšť rekurzívny predpis pre počet takých prvkov.)

Úloha 2.5.11. Čomu sa rovná najväčší možný rád prvku grupy S_{12} .

2.6 Cayleyho veta*

Lahko vieme overiť že pre danú množinu M všetky bijekcie z M do M tvoria s operáciou skladania zobrazení grupu. (Dôkaz je presne rovnaký ako pre permutácie v prípade, že M bola konečná.) Túto grupu budeme označovať $(S(M), \circ)$ alebo stručnejšie $S(M)$.

Definícia 2.6.1. Pod *grupou transformácií množiny M* budeme rozumieť ľubovoľnú podgrupu grupy $(S(M), \circ)$.

Ekvivalentne by sme mohli grupu transformácií definovať tak, že je to množina bijekcií z M do M uzavretá na skladanie a inverzné zobrazenie. (V [KGGS] sa grupa transformácií definuje takto, pretože tento pojem je tu zavedený skôr než pojem grupy. Aj historické poradie, v akom matematici definovali tieto pojmy, je rovnaké.)

V tejto časti ukážeme Cayleyho vetu, ktorá hovorí, že každá grupa je izomorfná s nejakou grupou transformácií. To znamená, že keby sme sa zaoberali len grupami, v ktorých je binárnou operáciou skladanie zobrazení, v podstate by sme nič nestratili.

Definícia 2.6.2. Nech $(G, *)$ je grupa a $a \in G$.

Zobrazenie $f_a: G \rightarrow G$ dané predpisom $f_a(x) = a * x$ voláme *ľavá translácia*.

Zobrazenie $g_a: G \rightarrow G$ dané predpisom $g_a(x) = x * a$ voláme *pravá translácia*.

Lema 2.6.3. Každá ľavá (pravá) translácia je bijekcia.

Dôkaz. Surjektívnosť f_a : Pre každé $x \in G$ máme $f(a^{-1} * x) = a * a^{-1} * x = x$.

Injektívnosť f_a : Ak $f_a(x) = f_a(y)$, znamená to, že $a * x = a * y$. Zo zákona o krátení potom vyplýva $x = y$.

Ukázali sme, že ľavé translácie sú bijekcie; dôkaz pre pravé translácie je úplne analogický. \square

Dôsledok 2.6.4. Pre všetky $a \in G$ platí $f_a, g_a \in S(G)$.

Lema 2.6.5. Pre ľavé translácie platí

$$f_b \circ f_a = f_{b*a}$$

Dôkaz. Pre $x \in G$ máme

$$(f_b \circ f_a)(x) = f_b(f_a(x)) = b * (a * x) = (b * a) * x = f_{b*a}(x).$$

\square

Dôsledok 2.6.6. Zobrazenie $a \mapsto f_a$ je homomorfizmus z G do $S(G)$.

Dôsledok 2.6.7. Ľavé translácie tvoria podgrupu grupy $S(G)$.

Dôkaz. Ľavé translácie sú presne obrazom G v zobrazení $a \mapsto f_a$ z G do $S(G)$. Pretože toto zobrazenie je homomorfizmus, podľa tvrdenia 2.3.9 tvoria ľavé translácie podgrupu. \square

Aby sme dokázali Cayleyho vetu, stačí už len ukázať, že práve uvedený homomorfizmus je v skutočnosti izomorfizmus na svoj obraz, t.j. že je injektívny.

Veta 2.6.8 (Cayley). Každá grupa $(G, *)$ je izomorfná s nejakou grupou transformácií. Presnejšie, $(G, *)$ je izomorfná s podgrupou grupy $S(G)$ tvorenou všetkými ľavými transláciami.

Dôkaz. Z toho, čo sme dokázali doteraz už vieme, že ľavé translácie sú skutočne podgrupou $S(G)$ a zobrazenie $a \mapsto f_a$ je surjektívny homomorfizmus z G na túto podgrupu. (Surjektívnosť vyplýva z toho, že táto podgrupa je priamo obrazom grupy G v uvedenom zobrazení.)

Zostáva teda dokázať len injektívnosť. Ak platí $f_a = f_b$ (v zmysle rovnosti zobrazení), tak potom aj $a = a * e = f_a(e) = f_b(e) = b * e = b$. \square

Dôsledok 2.6.9. ľubovoľná konečná grupa rádu n (t.j. taká, ktorá má n prvkov) je izomorfná s podgrupou grupy permutácií S_n .

Príklad 2.6.10. Ilustrujme si Cayleyho vetu na príklade grupy $(\mathbb{Z}, +)$. (Keďže ide o komutatívnu grupu, v tomto prípade sú ľavé a pravé translácie totožné.)

V tomto prípade pre $a \in \mathbb{Z}$ máme zobrazenie $f_a: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$f_a(x) = a + x,$$

ktoré je očitne bijektívne, čiže $f_a \in S(\mathbb{Z})$. Takisto sa lahko overí, že $f_{a+b} = f_a \circ f_b$, z čoho vidíme, že $a \mapsto f_a$ je homomorfizmus. Fakt, že tento homomorfizmus je injektívny, môžeme overiť podobne ako v dôkaze Cayleyho vety.

Príklad 2.6.11. Skúsme sa pozrieť na reprezentáciu grupy (S, \cdot) , kde $S = \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}$ pomocou Cayleyho vety.

V tomto prípade máme $f_z(x) = zx$. Z Moivreovej vety vieme, že vynásobenie komplexných číslom z s jednotkovou veľkosťou presne zodpovedá otočeniu bodu v komplexnej rovine okolo počiatku o uhol φ taký, že $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Čiže v tomto prípade tvoria grupu transformácií z Cayleyho vety všetky otočenia kružnice okolo nuly.

Poznámka 2.6.12. Ďalšou zaujímavou oblasťou, ktorá súvisí s grupami transformácií sú grupy symetrií rovinných útvarov alebo telies. V prípade, že by Vás táto téma zaujímala, môžete si o nej niečo prečítať napríklad v [KGGs, Kapitola 3.1].

Cvičenia

Úloha 2.6.1.

Izomorfizmus grupy G na samú seba voláme *automorfizmus*. Dokážte, že:

- Množina $\text{Aut } G$ všetkých automorfizmov grupy G je grupou transformácií.
- Definujeme pre ľubovoľné $a \in G$ zobrazenie $f_a: G \rightarrow G$ ako $f_a(g) = aga^{-1}$. Potom platí $f_{ab} = f_a \circ f_b$ pre ľubovoľné $a, b \in G$.
- Pre každé $a \in G$ je zobrazenie f_a automorfizmus grupy G (takýto automorfizmus nazveme vnútorný).
- Množina $\text{VAut } G$ všetkých vnútorných automorfizmov grupy G je grupou transformácií.
- Grupa G je komutatívna práve vtedy, keď množina $\text{VAut } G$ všetkých jej vnútorných automorfizmov je jednoprvková.
- Zobrazenie $a \mapsto f_a$ je surjektívny homomorfizmus z G na $\text{VAut } G$. Nájdite jadro tohoto automorfizmu.

Kapitola 3

Faktorizácia

3.1 Relácie ekvivalencie a rozklady

So základnými vlastnosťami ekvivalencií a rozkladov a s ich vzájomným súvisom ste sa už stretli na iných prednáškach (pozri [KGGs, časť 1.4], [OŠ]), napriek tomu tu však zopakujeme niektoré ich základné vlastnosti.

Definícia 3.1.1. *Relácia ekvivalencie* je relácia R na množine A , ktorá je reflexívna, symetrická a tranzitívna; t.j. pre všetky $a, b, c \in A$ platí:

$$\begin{aligned} aRa \\ aRb \Rightarrow bRa \\ aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc \end{aligned}$$

Množina $\{b \in A; aRb\}$ sa nazýva *triedou ekvivalencie s reprezentantom a* a označuje sa $[a]_R$, prípadne len $[a]$.

Definícia 3.1.2. *Rozklad množiny A* je taká množina $\mathcal{A} = \{A_i; i \in I\}$ neprázdnych podmnožín množiny A , že platí:

- (i) Pre všetky $i, j \in I$ platí buď $A_i = A_j$ alebo $A_i \cap A_j = \emptyset$.
- (ii) $\bigcup_{i \in I} A_i = A$.

Pred hlavnými výsledkami týkajúcimi sa rozkladov a ekvivalencií uvidíme si ešte jednu lemu:

Lema 3.1.3. *Nech R je relácia ekvivalencie. Potom*

$$aRb \Leftrightarrow [a]_R = [b]_R.$$

Veta 3.1.4. *Ak R je relácia ekvivalencie na A , tak množina všetkých tried ekvivalencie tvorí rozklad množiny A .*

Veta 3.1.5. *Ak $\mathcal{A} = \{A_i; i \in I\}$ je rozklad množiny A , tak relácia R definovaná tak, že*

$$aRb \quad \Leftrightarrow \quad (\exists i \in I) a \in A_i \wedge b \in A_i$$

je relácia ekvivalencie. (Definícia relácie R vlastne hovorí, že dva prvky sú v relácii R práve vtedy, keď ležia v tej istej množine rozkladu \mathcal{A} .)

Dôkaz týchto viet môžete nájsť napríklad v [OŠ].

Videli sme, že relácii ekvivalencie na množine A môžeme priradiť rozklad množiny A a opačne. Chceli by sme ukázať, že táto korešpondencia medzi reláciami ekvivalencie a rozkladmi je jednoznačná; čiže relácie ekvivalencie a rozklady sú vlastne len 2 rôzne pohľady na tú istú vec.

Označme rozklad prislúchajúci relácii ekvivalencie R ako \mathcal{A}_R a reláciu ekvivalencie danú rozkladom \mathcal{A} ako $R_{\mathcal{A}}$. My vlastne chceme ukázať, že tieto 2 priradenia sú navzájom inverzné, čiže $R_{\mathcal{A}_R} = R$ a $\mathcal{A}_{R_{\mathcal{A}}} = \mathcal{A}$.

(Tu je tiež dôležité si uvedomiť, čo znamená že 2 relácie resp. 2 rozklady sú rovnaké. Relácie chápeme ako podmnožiny $A \times A$, 2 relácie sa R a R' sa rovnajú práve vtedy, keď platí $aRb \Leftrightarrow aR'b$ pre všetky $a, b \in A$. Rovnosť pre rozklady takisto chápeme ako rovnosť množín – to znamená, že rovnaké rozklady pozostávajú z tých istých podmnožín.)

Z lemy 3.1.3 vidíme, že ak priradíme relácii ekvivalencie rozklad, tak v rovnakých podmnožinách budú práve tie prvky, ktoré sú v relácii R , a teda skutočne platí $R_{\mathcal{A}_R} = R$. Platnosť rovnosti $\mathcal{A}_{R_{\mathcal{A}}} = \mathcal{A}$ pre ľubovoľný rozklad sa tiež ukáže pomerne jednoducho (úloha 3.1.2 – dá sa opäť použiť lema 3.1.3).

Cvičenia

Úloha 3.1.1. Dokážte lemu 3.1.3.

Úloha 3.1.2. Dokážte, že pre ľubovoľný rozklad \mathcal{A} platí $\mathcal{A}_{R_{\mathcal{A}}} = \mathcal{A}$.

Úloha 3.1.3. a) Nech $f: A \rightarrow B$ je surjektívne zobrazenie. Dokážte, že relácia R na množine A určená predpisom $aRa' \Leftrightarrow f(a) = f(a')$ je relácia ekvivalencie a triedy rozkladu sú množiny $f^{-1}(\{b\}) = f^{-1}(b)$ pre $b \in B$.

b) Nech R je relácia ekvivalencie na množine A a nech B je množina všetkých tried ekvivalencie. Dokážte, že zobrazenie $f: A \rightarrow B$, ktoré každému prvku priradí jeho triedu ekvivalencie (teda $f: a \mapsto [a]$) je surjektívne.

c) V predchádzajúcej časti sme každému surjektívnemu zobrazeniu priradili reláciu ekvivalencie a obrátene. Sú tieto dve priradenia sú navzájom inverzné?

Úloha 3.1.4. Dokážte, že relácia $R_1 = A \times A$ na A je relácia ekvivalencie. Dokážte, že $R_2 = \{(a, a); a \in A\}$ je relácia ekvivalencie na A .

Úloha 3.1.5. Ak R_1, R_2 sú relácie ekvivalencie na A , tak aj $R_1 \cap R_2$ je relácia ekvivalencie na A .

Úloha 3.1.6. Nech pre každé $i \in I$ je R_i relácia na množine A a nech $R = \bigcap_{i \in I} R_i$. Dokážte, že:

- Ak všetky relácie R_i sú reflexívne, tak aj ich prienik R je reflexívna relácia.
- Ak všetky relácie R_i sú symetrické, tak aj ich prienik R je symetrická relácia.
- Ak všetky relácie R_i sú tranzitívne, tak aj ich prienik R je tranzitívna relácia.
- Ak všetky relácie R_i sú relácie ekvivalencie, tak aj ich prienik R je relácia ekvivalencie.

Úloha 3.1.7. Nech S je relácia na množine A . Ukážte, že existuje relácia R na množine A , ktorá je najmenšia vzhľadom na inklúziu medzi reláciami s vlastnosťami:

- $S \subseteq R$ a R je reflexívna.
- $S \subseteq R$ a R je symetrická.
- $S \subseteq R$ a R je tranzitívna.
- $S \subseteq R$ a R je relácia ekvivalencie.

Úloha 3.1.8. Dokážte, že nasledujúce relácie sú relácie ekvivalencie:

- Relácia R na množine S_n taká, že $\varphi R \tau$ práve vtedy, keď permutácie φ a τ majú rovnaký počet inverzií;
- relácia R na množine \mathbb{Z} definovaná ako $xRy \Leftrightarrow x$ a y majú rovnaký ciferný súčet;
- relácia R na množine \mathbb{Z} definovaná predpisom $xRy \Leftrightarrow x + y$ je párne;
- pre ľubovoľnú (konečnú) množinu M relácia R na množine $\mathcal{P}(M)$ definovaná ako $ARB \Leftrightarrow |A| = |B|$. (Pod označením $|A|$ rozumieme buď počet prvkov – v prípade, že M je konečná, alebo mohutnosť množiny.)

Úloha 3.1.9. Dokážte, že nasledujúce relácie sú relácie ekvivalencie:

- relácia R na množine \mathbb{R} definovaná ako $(x, y, z)R(x', y', z') \Leftrightarrow x + y + z = x' + y' + z'$,
- relácia R na množine S_n definovaná ako $\varphi R \tau \Leftrightarrow \varphi$ a τ majú rovnakú paritu,
- relácia R na množine \mathbb{Z} definovaná ako $xRy \Leftrightarrow 5 \mid x - y$
- pre ľubovoľnú maticu typu $m \times n$ nad poľom F je relácia $\vec{\alpha}R\vec{\beta} \Leftrightarrow A\vec{\alpha}^T = A\vec{\beta}^T$ relácia ekvivalencie na množine F^n ;
- relácia R na množine \mathbb{R} definovaná tak, že $xRy \Leftrightarrow x = y \vee x = -y$;
- relácia R na množine $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ všetkých zobrazení $z \in \mathbb{R}$ do \mathbb{R} definovaná ako $fRg \Leftrightarrow f(0) = g(0)$.

Úloha 3.1.10. Nech R je relácia ekvivalencie na množine X a S je relácia ekvivalencie na množine Y . Potom relácia T určená ako $(x, y)T(x', y') \Leftrightarrow xRx' \wedge ySy'$ je relácia ekvivalencie na množine $X \times Y$.

Úloha 3.1.11. Nech $f: X \rightarrow Y$ je surjektívne zobrazenie.

- Ak R je relácia ekvivalencie na X , tak relácia S na Y daná predpisom $ySy' \Leftrightarrow$ existujú $x, x' \in X$ také, že $f(x) = y$, $f(x') = y'$ a xRx' je tiež relácia ekvivalencie.
- Ak S je relácia ekvivalencie na množine Y tak relácia R na X daná predpisom $xRx' \Leftrightarrow f(x)Sf(x')$ je tiež relácia ekvivalencie. (Ako špeciálny prípad dostaneme tvrdenie z úlohy 3.1.3b.)

3.2 Rozklad grupy podľa podgrupy

Najprv si zadefinujeme jeden pomocný pojem – násobenie podmnožín grupy.

Definícia 3.2.1. Nech G je grupa a $A, B \subseteq G$ sú jej ľubovoľné podmnožiny. Potom definujeme *súčin* AB *podmnožín* A, B ako

$$AB = \{ab; a \in A, b \in B\}.$$

V prípade, že jedna z množín je jednoprvková, budeme používať stručnejší zápis aB namiesto $\{a\}B$ a Ab namiesto $A\{b\}$.

Niektoré užitočné vlastnosti násobenia podmnožín zhrnieme v nasledujúcej leme:

Lema 3.2.2. *Nech G je grupa.*

- Násobenie podmnožín je asociatívne, t.j. $A(BC) = (AB)C$ pre ľubovoľné podmnožiny $A, B, C \subseteq G$.*
- Pre ľubovoľnú podmnožinu $A \subset G$ platí $eA = Ae = A$.*
- Ak $B \subseteq C$, tak $AB \subseteq AC$ a $BA \subseteq CA$.*

- (iv) Ak H je podgrupa grupy G a $h \in H$, tak $hH = H$.
- (v) Ak H je podgrupa grupy G , tak $H^2 = H \cdot H = H$.
- (vi) Pre ľubovoľnú podmnožinu $A \subseteq G$ platí $(A^{-1})^{-1} = A$, kde používame označenie $A^{-1} = \{a^{-1}; a \in A\}$.
- (vii) Ak H je podgrupa grupy G , tak $H^{-1} = \{h^{-1}; h \in H\} = H$.
- (viii) Pre ľubovoľné podmnožiny $A, B \subseteq G$ platí $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- (ix) Ak K, H sú podgrupy grupy G , tak $(HK)^{-1} = K^{-1} \cdot H^{-1} = KH$.

Označenie H^{-1} v predchádzajúcej leme neznamená, že by táto množina bola inverzným prvkom ku H v $\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$ s operáciou násobenia podmnožín – H^{-1} jednoducho len označuje množinu inverzných prvkov ku prvkom z H .

Nebudeme dokazovať všetky časti tejto lemy – väčšinu z nich ponecháme ako cvičenie (úloha 3.2.1). Na ukážku si dokážme (vi).

Dôkaz. (vi): Pretože $(a^{-1})^{-1} = a$, každý prvok z A patrí aj do $(A^{-1})^{-1}$, čiže $A \subseteq (A^{-1})^{-1}$.

Obrátene, ak $b \in (A^{-1})^{-1}$, tak $b = (a^{-1})^{-1}$ pre nejaké $a \in A$, ale $(a^{-1})^{-1} = a$, teda $b = a \in A$. Ukázali sme aj inklúziu $(A^{-1})^{-1} \subseteq A$. \square

Násobenie podmnožín vo všeobecnosti nemusí byť komutatívne (ako kontrapríklad stačí zobrať v nekomutatívnej grupe 2 jednoprvkové množiny $\{a\}$ a $\{b\}$ pre prvky a a b , ktoré nekomutujú). Samozrejme, pre komutatívnu grupu je aj násobenie podmnožín komutatívne.

Predchádzajúce tvrdenie hovorí o tom, že takto definovaný súčin množín je asociatívny a má aj neutrálny prvok. Nie pre každú množinu však existuje inverzný prvok. Špeciálne nemusí platiť $AA^{-1} = \{e\}$ (úloha 3.2.2).

Definícia 3.2.3. Ak H je podgrupa grupy G , tak označíme pre $a \in G$

$$aH = \{ah; h \in H\},$$

$$Ha = \{ha; h \in H\}.$$

Množiny aH nazývame *ľavé triedy grupy G podľa H* (alebo ľavé triedy grupy G modulo H), množiny Ha sú *pravé triedy grupy G podľa H* .

Ako sme už spomenuli, násobenie podmnožín vo všeobecnosti nemusí byť komutatívne, takisto ani nemusí vo všeobecnosti platiť $aH = Ha$. V ďalšej časti uvidíme, že podgrupy, ktoré majú túto vlastnosť sú z istého hľadiska zaujímavé. Je zrejme, že táto rovnosť platí ak G je komutatívna.

Začali by sme však s tým, že ukážeme, že ľavé triedy G podľa H tvoria rozklad G (a podobne to platí pre pravé triedy).

Príklad 3.2.4. Triedy \mathbb{Z} podľa $3\mathbb{Z}$ sú $\{3k; k \in \mathbb{Z}\}$, $\{3k + 1; k \in \mathbb{Z}\}$ a $\{3k + 2; k \in \mathbb{Z}\}$. Je zrejme, že tvoria rozklad množiny \mathbb{Z} – každé celé číslo je buď tvaru $3k$, $3k + 1$ alebo $3k + 2$. (V tomto prípade ide o komutatívnu grupu, preto sú ľavé a pravé triedy totožné.)

Lema 3.2.5. *Nech H je podgrupa G a $a, b \in G$. Potom $aH = bH$ práve vtedy, keď $b^{-1}a \in H$. (Ďalšou ekvivalentnou podmienkou je $a^{-1}b \in H$).*

Podobne platí $Ha = Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \Leftrightarrow ba^{-1} \in H$.

Dôkaz. \Rightarrow Ak $aH = bH$, tak $a \in bH$, čiže $a = bh$ pre nejaké $h \in H$. Z toho $b^{-1}a = h \in H$.

\Leftarrow Ak $b^{-1}a \in H$, tak $b^{-1}aH = H$, a teda $bH = b(b^{-1}aH) = (bb^{-1})aH = eaH = aH$.

Pretože $(b^{-1}a)^{-1} = a^{-1}(b^{-1})^{-1} = a^{-1}b$, aj tretia uvedená podmienka je ekvivalentná.

Dôkaz druhej časti tejto lemy je analogický. \square

Tvrdenie 3.2.6. *Ľavé triedy grupy G podľa jej podgrupy H tvoria rozklad G . (Inak: $\{aH; a \in G\}$ je rozklad množiny G .)*

Pravé triedy grupy G podľa jej podgrupy H tvoria rozklad G .

Dôkaz. Každá trieda aH obsahuje prvok a , je teda neprázdna. Overme teda ešte ostatné dve podmienky z definície rozkladu.

Platí $\bigcup_{a \in G} aH \supseteq \bigcup_{a \in G} \{a\} = G$, teda zjednotenie všetkých ľavých tried je celé G .

Nech $a, b \in G$. Stačí ukázať, že ak $aH \cap bH \neq \emptyset$, tak $aH = bH$. Nech teda $x \in aH \cap bH$. To znamená, že $x = ah = bh'$ pre nejaké $h, h' \in H$. Z rovnosti $ah = bh'$ ľahko dostaneme $b^{-1}a = h'h^{-1}$, a teda $b^{-1}a \in H$. Podľa lemy 3.2.5 potom platí $aH = bH$.

Dôkaz pre pravé triedy je skoro identický. \square

Napriek tomu, že tu budeme tak trochu opakovať podobné úvahy ako v dôkaze lemy 3.2.5, možno sa oplatí urobiť aj iný dôkaz. Z neho navyše hneď vidno aj to, že ľavé triedy sú vlastne triedy rozkladu zodpovedajúcemu istej relácii ekvivalencie.

Dôkaz. Pomerne ľahko sa ukáže, že $a \sim b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$ je relácia ekvivalencie (úloha 3.2.3). Vieme, že relácia ekvivalencie nám dáva rozklad, teda nám stačí ukázať, že triedy rozkladu pre túto reláciu ekvivalencie sú presne ľavé triedy G podľa H .

Chceme teda zdôvodniť, že $[a] = aH$. Platí:

$$\begin{aligned} [a] &= \{b \in G; a \sim b\} \\ &= \{b \in G; a^{-1}b \in H\} \stackrel{(*)}{=} aH. \end{aligned}$$

Azda jediná rovnosť, ktorá potrebuje trochu detailnejšie zdôvodnenie je rovnosť označená (*).

\subseteq Ak $a^{-1}b \in H$, tak z rovnosti $b = a(a^{-1}b)$ máme $b \in aH$.

\supseteq Ak $b \in aH$, tak $b = ah$ pre nejaké $h \in H$. Z rovnosti $b = ah$ dostaneme $h = a^{-1}b$, čiže vidíme, že $a^{-1}b \in H$. \square

Definícia 3.2.7. Nech G je grupa a H je podgrupa. Rozklad $\{aH; a \in G\}$ sa nazýva *ľavý rozklad G podľa H* a rozklad $\{Ha; a \in G\}$ sa nazýva *pravý rozklad G podľa H* .

Všimnime si, že $eH = He = H$, teda ako jedna z ľavých (pravých) tried sa vždy vyskytne podgrupa H .

Príklad 3.2.8. Uvažujme podgrupu $H = \{(x, x); x \in \mathbb{R}\}$ grupy $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$. Ide o komutatívnu grupu, takže ľavý aj pravý rozklad sú rovnaké. Dva prvky $(a, b), (c, d) \in G$ ležia v tej istej triede rozkladu práve vtedy, keď $(a, b) - (c, d) = (a - c, b - d) \in H$, teda keď $a - c = b - d$, čo je ekvivalentné s

$$a - b = c - d.$$

To znamená, že každá trieda rozkladu je určená rozdielom $r = a - b$. Inak povedané, jednotlivé triedy rozkladu sú práve množiny

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x - y = r\}$$

pre $r \in \mathbb{R}$. Všimnime si, že rôznym r zodpovedajú rôzne triedy ekvivalencie, takže každú triedu ekvivalencie dostaneme takýmto spôsobom iba raz. Z každej triedy rozkladu by sme mohli vybrať napríklad reprezentanta tvaru $\{(r, 0); r \in \mathbb{R}\}$, t.j. triedy rozkladu môžeme zapísať ako

$$(r, 0) + H$$

pre $r \in \mathbb{R}$.

Uvedme ešte aspoň jeden príklad, kde G je konečná grupa.

Príklad 3.2.9. Nech $G = (\mathbb{Z}_8, \oplus)$ a $H = 4\mathbb{Z}_8 = \{0, 4\}$. Opäť sú obe grupy komutatívne, takže ľavý a pravý rozklad sú totožné. Rozklad G podľa H obsahuje 4 triedy: $\{0, 4\}$, $\{1, 5\}$, $\{2, 6\}$, $\{3, 7\}$.

Teraz ukážeme nejaké tvrdenia hovoriace o počtoch (mohutnostiach) tried rozkladu G podľa H . (Môžete si ich podrobnejšie rozmyslieť na rozkladoch z príkladov 3.2.4, 3.2.8, 3.2.9.)

Lema 3.2.10. *Nech H je podgrupa grupy G a $a \in G$. Potom zobrazenie $\varphi: H \rightarrow aH$ definované ako*

$$\varphi: h \mapsto ah$$

je bijekcia.

Podobne zobrazenie $\psi: H \rightarrow Ha$, $\psi: h \mapsto ha$ je bijekcia.

Dôkaz. Zobrazenie φ je injekcia: $\varphi(h_1) = \varphi(h_2) \Rightarrow ah_1 = ah_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ (podľa zákonov o krátení).

Priamo z definície množiny aH vyplýva, že φ je aj surjekcia.

Dôkaz pre zobrazenie ψ by bol analogický. □

Z predchádzajúcej lemy okamžite dostávame, že:

Veta 3.2.11. *Nech H je konečná podgrupa G . Potom počet prvkov každej ľavej triedy aH je rovnaký (a rovná sa počtu prvkov podgrupy H). Takisto sa rovná počtu prvkov ľubovoľnej pravej triedy Hb .*

Lema 3.2.12. *Nech H je podgrupa grupy G . Potom zobrazenie*

$$\varphi: aH \mapsto Ha^{-1}$$

je bijekcia medzi množinami tried $\{aH; a \in G\}$ a $\{Ha; a \in G\}$.

Dôkaz. Všimnime si, že platí $(aH)^{-1} = H^{-1}a^{-1} = Ha^{-1}$.

Z toho vyplýva, že zobrazenie φ je dobre definované. (Nezávisí od výberu reprezentanta triedy aH , keďže sme ukázali, že $\varphi(aH)$ je práve množina všetkých inverzných prvkov k prvkom z aH .)

Zobrazenie φ je zrejme surjekcia (vzorom pre triedu Hb je ľavá trieda $b^{-1}H$).

Na základe rovnosti $Ha^{-1} = (aH)^{-1}$ ďalej dostaneme $Ha^{-1} = Hb^{-1} \Leftrightarrow (aH)^{-1} = (bH)^{-1} \Leftrightarrow aH = bH$. (Využili sme lemu 3.2.2(vi,viii).) Vidíme teda, že φ je injekcia. □

Na základe predchádzajúcej vety, ktorá hovorí, že počet ľavých a pravých tried je rovnaký, má zmysel nasledujúca definícia.

Definícia 3.2.13. Nech H je podgrupa konečnej grupy. Potom $[G: H]$ je počet všetkých ľavých (pravých) tried rozkladu G podľa H . Toto číslo nazývame *indexom grupy G podľa H* .

Veta 3.2.14 (Lagrangeova veta). *Ak G je konečná grupa a H je jej podgrupa, tak platí*

$$|G| = |H| \cdot [G : H].$$

Teda počet prvkov podgrupy H delí počet prvkov G .

Dôkaz. Máme rozklad množiny G na $[G : H]$ tried rovnakej veľkosti $|H|$. Potom $|G| = [G : H]|H|$.

Z toho je zrejmé aj to, že $|H| \mid |G|$ (počet prvkov H delí počet prvkov G). \square

Na tomto mieste treba spomenúť, že neplatí obrátenie Lagrangeovej vety v tom zmysle, že pre každý deliteľ k čísla $|G|$ (počtu prvkov grupy G) by musela existovať k -prvková podgrupa. Pozri úlohu 3.3.3. (Pre cyklické grupy však toto tvrdenie platí, tam dokonca existuje jediná k -prvková podgrupa. Takéto tvrdenie – že by počtom prvkov bola podgrupa jednoznačne určená – takisto vo všeobecnosti neplatí.)

Nasledujúci výsledok by snád mohol vysvetlovať, prečo namiesto počtu prvkov konečnej grupy niekedy používame aj termín *řád grupy*.

Dôsledok 3.2.15. *Ak G je konečná grupa, tak rád každého prvku delí rád grupy G (počet prvkov grupy G).*

Dôkaz. Stačí si uvedomiť, že rád prvku a je počet prvkov podgrupy $[a]$. \square

Dôsledok 3.2.16. *Ak G je p -prvková grupa a p je prvočíslo, tak každý jej prvok okrem neutrálneho prvku je generátorom G (a teda G je cyklická).*

Dôkaz. Rád prvku $a \neq e$ nie je 1 a keďže je deliteľ prvočísla p , musí byť rovný p . Teda $[a]$ obsahuje p rôznych prvkov $e, a^1, a^2, \dots, a^{p-1}$, čiže $[a] = G$. \square

Dôsledok 3.2.17. *Každá 4-prvková grupa je izomorfná buď so \mathbb{Z}_4 alebo so $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.*

Dôkaz. Nech G je 4-prvková grupa. Podľa dôsledku 3.2.15 rády jej prvkov môžu byť jedine 1, 2 alebo 4. Ak G obsahuje prvok rádu 4, tak tento prvok je jej generátor. V tomto prípade dostávame, že G je cyklická a $G \cong \mathbb{Z}_4$.

Druhá možnosť je, že všetky prvky s výnimkou neutrálneho majú rád 2, čiže pre každý prvok platí $a^2 = e$, kde e je neutrálny prvok G . Inak povedané, pre všetky $a \in G$ platí $a = a^{-1}$. Z toho dostávame aj to, že G je komutatívna: $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$.

Označme prvky tejto grupy e, a, b, c . Zatiaľ o nich vieme toto:

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e		
b	b		e	
c	c			e

Podľa zákonov o krátení sa každý prvok vyskytne v ľubovoľnom riadku a v ľubovoľnom stĺpci tabuľky grupovej operácie práve raz. Tento fakt nám umožní jednoznačne doplniť prázdne miesta v tabuľke. Všimnime si napríklad, že prvok ab nemôže byť a, e ani b (inak by sme mali v niektorom riadku alebo stĺpci tento prvok dvakrát). Podobnú úvahu môžeme urobiť pre prvok ba . Dostávame:

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	
b	b	c	e	
c	c			e

Teraz už v každom riadku a stĺpci máme jediné voľné miesto, teda zostávajúci prvok je jednoznačne určený

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Pretože aj $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ má tú vlastnosť, že všetky prvky okrem neutrálneho majú rád 2, a práve sme ukázali, že touto podmienkou je grupa jednoznačne určená (až na označenie prvkov – čiže až na izomorfizmus), máme $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. \square

Cvičenia

Úloha 3.2.1. Dokážte zvyšné časti lemy 3.2.2.

Úloha 3.2.2. Ukážte na konkrétnom príklade, že v grupe nemusí platiť $AA^{-1} = \{e\}$.

Platí vo všeobecnosti $AA^{-1} = A^{-1}A$?

Tvorí množina $\mathcal{P}(G)$ s operáciou násobenia množín grupu?

Úloha 3.2.3. Ukážte, že ak H je podgrupa grupy G , tak relácia určená podmienkou

$$a \sim b \quad \Leftrightarrow \quad a^{-1}b \in H$$

je relácia ekvivalencie.

Úloha 3.2.4. Ak G je konečná grupa, H je podgrupa G a K je podgrupa H , tak $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Úloha 3.2.5. Dokážte, že každá grupa, ktorá má menej ako 6 prvkov, je komutatívna.

Úloha 3.2.6. Nájdite všetky ľavé (pravé) triedy grupy G podľa podgrupy H , ak

a) $G = (\mathbb{R}, +)$, $H = \mathbb{Z}$;

b) $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$, $H = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}; y = 3x\}$;

c) $G = (\mathbb{Z}_6, \oplus)$, $H = 2\mathbb{Z}_3$;

d) $G = S_n$, $H = A_n$;

e) $G = S_3$, $H = [(12)]$;

f) $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = 3\mathbb{Z}$.

(Pod „nájdite všetky triedy“ sa rozumie to, že pre každú triedu vyberieme jedného reprezentanta, v prípade, že ide o konečné množiny ich môžeme aj vypísať.)

Úloha 3.2.7. Dokážte, že každá 8-prvková grupa obsahuje dvojjprvkovú podgrupu.

Úloha 3.2.8. Ak G má p^2 prvkov, kde p je prvočíslo, tak každá vlastná podgrupa G je cyklická.

Úloha 3.2.9. Ak p je prvočíslo a $k \geq 1$ prirodzené číslo, tak každá p^k -prvková grupa má p -prvkovú podgrupu.

Úloha 3.2.10. Nech G je konečná grupa, počet jej prvkov označme n . Ak $A \subseteq G$ a A má viac než $n/2$ prvkov, tak A generuje G .

Úloha 3.2.11. Nech $\varphi: G \rightarrow H$ je homomorfizmus grúp. Nech $g \in G$. Označme $h := \varphi(g)$, $A := \varphi^{-1}(h) = \{x \in G; \varphi(x) = h\}$ a $K := \text{Ker } \varphi$. (Z dôsledku 2.3.10 vieme, že K je podgrupa grupy H .) Dokážte, že $A = gK$.

Úloha 3.2.12. Nech S_i je podgrupa G a $t_i \in G$ pre každé $i \in I$. Označme $D = \bigcap_{i \in I} S_i$. Dokážte, že buď $\bigcap_{i \in I} S_i t_i = \emptyset$ alebo existuje $g \in G$ také, že $\bigcap_{i \in I} S_i t_i = Dg$. (T.j. prienik pravých tried $S_i t_i$ je buď prázdna množina alebo niektorá pravá trieda rozkladu podľa D .)

Úloha 3.2.13. Dokážte, že v každej grupe s nepárnym počtom prvkov je ľubovoľný prvok štvorcom nejakého (a navyše jednoznačne určeného) prvku tejto grupy.

Úloha 3.2.14. Nech H je podgrupa G . Ukážte, že systém $\{HaH; a \in G\}$ je rozklad množiny G .

Úloha 3.2.15. Nech $(G, *)$ je grupa. Dokážte alebo vyvráťte: $H = \{g^2; g \in G\}$ je podgrupa grupy G .

3.3 Normálne podgrupy

Dostali sme teda rozklad G na ľavé triedy a rozklad G na pravé triedy. Tieto dva rozklady môžu byť vo všeobecnosti rôzne – my sa budeme snažiť nájsť podmienky, kedy sú rovnaké.

Tvrdenie 3.3.1. Nech H je podgrupa grupy G . Ak $aH = Hb$, tak $Ha = Hb$. (Takisto za týchto predpokladov platí $aH = bH$.)

Dôkaz. Ak $aH = Hb$, tak $a \in Hb$, čiže $a = hb$ pre nejaké $h \in H$. Potom $h = ab^{-1} \in H$ a podľa lemy 3.2.5 máme $Ha = Hb$.

Dôkaz druhej časti tvrdenia je analogický. □

Veta 3.3.2. Nech H je podgrupa G . Nasledujúce podmienky sú ekvivalentné:

- (i) $aH = Ha$ pre všetky $a \in G$,
- (ii) $aH \subseteq Ha$ pre všetky $a \in G$,
- (iii) $Ha \subseteq aH$ pre všetky $a \in G$,
- (iv) $aHa^{-1} \subseteq H$ pre všetky $a \in G$,
- (v) $H \subseteq aHa^{-1}$ pre všetky $a \in G$,
- (vi) $aHa^{-1} = H$ pre všetky $a \in G$,
- (vii) $\{aH; a \in G\} = \{Hb; b \in G\}$.

Všimnime si, že podmienku (v) môžeme zapísať aj tak, že platí $aha^{-1} \in H$ pre všetky $h \in H$ a $a \in G$, čiže

$$h \in H \quad \Rightarrow \quad aha^{-1} \in H. \quad (3.1)$$

V nasledujúcom dôkaze budeme využívať vlastnosti násobenia podmnožín sformulované v leme 3.2.2 ako aj pomerne ľahko dokázateľný fakt, že násobenie podmnožín zachováva inklúzie. (Vlastne nám budú stačiť implikácie $B \subseteq C \Rightarrow aB \subseteq aC$ a $B \subseteq C \Rightarrow Ba \subseteq Ca$.)

Dôkaz. Zrejme: (i) \Rightarrow (ii), (i) \Rightarrow (iii)

(ii) \Rightarrow (iv): Ak platí $aH \subseteq Ha$, tak platí aj

$$aHa^{-1} \subseteq (Ha)a^{-1} = H(aa^{-1}) = He = H.$$

Podobne sa ukáže (iii) \Rightarrow (iv): Keď použijeme (iii) pre prvok a^{-1} , tak máme $Ha^{-1} \subseteq a^{-1}H$. Z tejto inklúzie dostaneme

$$aHa^{-1} \subseteq aa^{-1}H = H.$$

(iv) \Rightarrow (v): Použitím (iv) pre prvok a^{-1} dostaneme $a^{-1}Ha \subseteq H$. Keď túto inklúziu vynásobíme zľava a a sprava a^{-1} , tak máme

$$H = a(a^{-1}Ha)a^{-1} \subseteq aHa^{-1}.$$

(v) \Rightarrow (vi): Stačí v skutočnosti ukázať, že (v) \Rightarrow (iv), pretože z (v) a (iv) okamžite vyplýva (vi). Dôkaz implikácie (v) \Rightarrow (iv) je takmer rovnaký ako dôkaz predchádzajúcej implikácie. Ak použijeme (v) pre prvok a^{-1} , dostaneme $a^{-1}Ha \subseteq H$. Keď túto inklúziu vynásobíme zľava a a sprava a^{-1} , tak máme

$$H = a(a^{-1}Ha)a^{-1} \subseteq aHa^{-1}.$$

(vi) \Rightarrow (i): Ak $H = aHa^{-1}$, tak $Ha = (aHa^{-1})a = aH(a^{-1}a) = a(He) = aH$.

Takisto implikácia (i) \Rightarrow (vii) je zřejmá. Opačná implikácia (vii) \Rightarrow (i) vyplýva z tvrdenia 3.3.1. Z rovnosti $\{aH; a \in G\} = \{Hb; b \in G\}$ totiž vyplýva, že každé aH sa musí rovnať nejakému Hb , ale potom podľa tvrdenia 3.3.1 platí aj $aH = Ha$.

Dokázali sme:

(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (v) \Rightarrow (vi) \Rightarrow (i),

(i) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (v) \Rightarrow (vi) \Rightarrow (i),

(i) \Leftrightarrow (vii),

z čoho vyplýva, že všetky uvedené podmienky sú ekvivalentné. \square

Definícia 3.3.3. Podgrupa H grupy G sa nazýva *normálna (invariantná) podgrupa*, ak spĺňa niektorú z ekvivalentných podmienok uvedených vo vete 3.3.2. Označujeme $H \triangleleft G$.

Ak G je komutatívna grupa, tak každá jej podgrupa je invariantná.

Z vety 3.3.2 vidíme, že pre invariantnú podgrupu ľavé a pravé triedy rozkladu sú totožné.

Príklad 3.3.4. Pre každú grupu G sú jej podgrupy G a $\{e\}$ normálnymi podgrupami.

Pretože v komutatívnej grupe je každá podgrupa normálna, úloha zistiť, či nejaká podgrupa je normálna, je zaujímavá len v nekomutatívnom prípade.

Príklad 3.3.5. Preskúmame, ktoré podgrupy S_3 sú normálne. Zostavme najprv tabuľku grupovej operácie. (Do riadku φ a stĺpca τ zapisujeme $\varphi \circ \tau$.)

	id	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
id	id	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(12)	(12)	id	(132)	(123)	(23)	(13)
(13)	(13)	(123)	id	(132)	(12)	(23)
(23)	(23)	(132)	(123)	id	(13)	(12)
(123)	(123)	(13)	(23)	(12)	(132)	id
(132)	(132)	(23)	(12)	(13)	id	(123)

Teraz skúsme nájsť všetky podgrupy grupy S_3 . Z Lagrangeovej vety 3.2.14 vieme, že (okrem podgrúp $\{e\}$ a S_3) stačí hľadať podgrupy rádu 2 a 3. Podľa dôsledku 3.2.16 ide o cyklické grupy, teda nám stačí nájsť všetky prvky rádu 2 resp. 3.

Prvky rádu 2 sú práve cykly dĺžky 2. Tie vygenerujú podgrupy $H_1 = \{id, (12)\}$, $H_2 = \{id, (13)\}$ a $H_3 = \{id, (23)\}$.

Napríklad pre podgrupu $H_1 = \{id, (12)\}$ máme $(13)H_1 = \{(13), (123)\}$ a $H_1(13) = \{(13), (132)\}$. Keďže sme dostali pre ten istý prvok inú ľavú a pravú triedu, podgrupa H_1 nespĺňa podmienku (i) z vety 3.3.2, a teda nie je normálna.

Podobným spôsobom môžeme overiť, že ani ostatné 2-prvkové podgrupy nie sú normálne.

Prvky rádu 3 sú trojcykly (123) a (132) . Obe generujú tú istú 3-prvkovú podgrupu $A_3 = \{id, (123), (132)\}$ pozostávajúcu z párnych permutácií množiny $\{1, 2, 3\}$. Vidíme, že pravý i ľavý rozklad je rovnaký, jeho triedy sú množina A_3 (párne permutácie) a jej doplnok $S_3 \setminus A_3$ (nepárne permutácie). Teda A_3 spĺňa podmienku (vii) z vety 3.3.2, čiže je normálna. (Na zdôvodnenie toho, že A_4 je normálna sme mohli použiť aj všeobecnejší fakt, že každá podgrupa indexu 2 je normálna – úloha 3.3.2.)

Všimnime si, že H_1 je komutatívna grupa. Teda komutatívna podgrupa ešte nutne nemusí byť normálna. (Ako sme už spomínali, ak vieme, že *celá* je komutatívna, tak každá podgrupa je normálna.)

Cvičenia

Úloha 3.3.1. Dokážte, že prienik (ľubovoľného systému) normálnych podgrúp danej grupy G je opäť normálna podgrupa G .

Úloha 3.3.2. Ak H je podgrupa G a $[G : H] = 2$, tak H je normálna podgrupa. Navyše, pre každý prvok $x \in G$ platí $x^2 \in H$. (Poznámam, že riešenie druhej časti – hovoriacej o $x^2 \in H$ – sa dá urobiť pomocou faktorových grúp, tie sú až v nasledujúcej podkapitole. Dá sa však vymyslieť aj riešenie bez nich.)

Úloha 3.3.3*. Dokážte, že grupa A_4 párnych permutácií 4-prvkovej množiny nemá žiadnu 6-prvkovú podgrupu.

Úloha 3.3.4. Pre všetky $n \in \mathbb{N}$ je A_n normálna podgrupa grupy S_n .

Úloha 3.3.5. Dokážte, že ľubovoľná normálna podgrupa A_n pre $n \geq 5$, ktorá obsahuje aspoň jeden cyklus dĺžky 3 je celá grupa A_n .

Úloha 3.3.6. Nájdite všetky normálne podgrupy v grupe: a) (\mathbb{Z}_5, \oplus) , b) (\mathbb{Z}_6, \oplus) , c) (\mathbb{Z}_4, \oplus) , d) $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \oplus)$, e) $(\mathbb{Z}_{12}, \oplus)$, f) (\mathbb{Z}_p, \oplus) , kde p je prvočíslo, g*) (A_4, \circ) , h*) (S_4, \circ) .

Úloha 3.3.7. Dokážte, že každá jednoduchá podgrupa grupy S_n , ktorá má viac ako 2 prvky, je obsiahnutá v grupe A_n . (Grupa sa nazýva jednoduchá, ak nemá žiadne normálne podgrupy okrem seba samej a triviálnej podgrupy.)

Úloha 3.3.8. Centrom grupy G nazývame množinu $Z(G) = \{g \in G; (\forall h \in G)gh = hg\}$ takých prvkov, ktoré komutujú so všetkými prvkami G . Ukážte, že $Z(G)$ je normálna podgrupa grupy G .

Úloha 3.3.9. Ak A a B sú normálne podgrupy G , $a \in A$ a $b \in B$, tak $aba^{-1}b^{-1} \in A \cap B$.

Úloha 3.3.10. Ak H a H' sú normálne podgrupy G také, že $H \cap H' = \{e\}$, tak $hh' = h'h$ pre ľubovoľné $h \in H$ a $h' \in H'$ (ľubovoľný prvok H komutuje s ľubovoľným prvkom H' .)

Úloha 3.3.11. Uvažujme grupu $G = \{A \in M_{2,2}(F); |A| = 1\}$ s operáciou násobenia. (Pričom F je ľubovoľné pole.) Definujme $H = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}; a \in F\right\}$.

a) Overte, že H je podgrupa G .

b) Je táto podgrupa komutatívna?

c) Je táto podgrupa normálna?

Aké lineárne zobrazenia zodpovedajú maticiam patriacim do H ?

Úloha 3.3.12. Nech $G = \left\{\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\right\}$ a $H = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}; c \in \mathbb{R}\right\}$.

a) Overte, že G tvorí s operáciou násobenia matic grupu a že H je podgrupa grupy G .

b) Je H normálna podgrupa grupy G ?

(Všimnite si, že H je tá istá grupa, ako v predošlej úlohe, ale teraz sa na ňu pozeráme ako na podgrupu inej grupy.)

Úloha 3.3.13. Uvažujme grupu G všetkých zhodných izometrií¹ roviny nemeniacich orientáciu. Inak povedané, sú to všetky zobrazenia, ktoré môžeme dostať ako zloženie posunutia o nejaký vektor \vec{u} a otočenia o nejaký uhol α , čiže zobrazenia dané predpisom $(x, y) \mapsto (c + x \cos \alpha + y \sin \alpha, d - x \sin \alpha + y \cos \alpha)$. Sú nasledujúce grupy normálnymi podgrupami grupy G ?

a) $H =$ všetky posunutia;

b) $H =$ rotácie okolo počiatku súradnicovej sústavy;

c) $H_x =$ všetky zobrazenia z G také, že $f(x) = x$, pričom $x \in \mathbb{R}^2$ je nejaký pevne zvolený bod roviny.

3.4 Faktorové grupy

Veta 3.4.1. Ak G je grupa a H je jej invariantná podgrupa, tak na množine všetkých tried G podľa H môžeme definovať operáciu \cdot ako

$$(aH) \cdot (bH) = (ab)H \quad (3.2)$$

Táto operácia je dobre definovaná (nezávisí od výberu reprezentanta triedy) a množina všetkých tried G podľa H s touto operáciou tvorí grupu. Túto grupu označujeme G/H a nazývame faktorová grupa grupy G podľa H .

Je dôležité si uvedomiť, že faktorovú grupu môžeme definovať iba pre invariantnú podgrupu.

Dôkaz. Všetky tvrdenia vety vlastne vyplývajú z toho, že takto definované násobenie je to isté ako násobenie podmnožín grupy G . Platí totiž

$$(aH)(bH) = (aH)(Hb) = a(HH)b = aHb = a(Hb) = a(bH) = (ab)H.$$

Z toho vyplýva, že operácia, ktorú sme definovali je dobre definovaná a takisto, že je asociatívna.

Pretože $eH = H$ a $HH = H$, trieda eH je neutrálny prvok.

Inverzný prvok k aH je $a^{-1}H$, pretože $(aH)(a^{-1}H) = (aa^{-1})H = eH = H$. \square

Príklad 3.4.2. Ak $G = \mathbb{Z}$ a $H = 3\mathbb{Z}$ tak G/H obsahuje 3 triedy H , $1 + H$ a $2 + H$ (príklad 3.2.4).

¹izometria=zobrazenie zachovávajúce vzdialenosti; zhodné = zachovávajú aj orientáciu

	H	$1 + H$	$2 + H$
H	H	$1 + H$	$2 + H$
$1 + H$	$1 + H$	$2 + H$	H
$2 + H$	$2 + H$	H	$1 + H$

Z predchádzajúcej tabuľky vidíme, že $H \mapsto 0$, $1 + H \mapsto 1$, $2 + H \mapsto 2$ je izomorfizmus medzi G/H a (\mathbb{Z}_3, \oplus) , čiže v tomto prípade je faktorová grupa izomorfná s grupou \mathbb{Z}_3 .

Príklad 3.4.3. Nech $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$ a $H = \{(x, x); x \in \mathbb{R}\}$.

V príklade 3.2.8 sme videli, že každú triedu rozkladu môžeme reprezentovať ako $(r, 0) + H$ (a navyše takto dostaneme každú triedu práve raz). Z toho pomerne ľahko vidno, že zobrazenie

$$(r, 0) + H \mapsto r$$

je izomorfizmus medzi grupami G/H a $(\mathbb{R}, +)$, čiže $G/H \cong \mathbb{R}$.

Podobne môžeme vidieť, že pre $G = \mathbb{Z}_8$ a $H = 4\mathbb{Z}_8$ máme $G/H \cong \mathbb{Z}_4$. V ďalšej podkapitole dokážeme vetu, ktorá nám umožní takéto vlastnosti dokazovať pomerne jednoducho a elegantne.

Cvičenia

Úloha 3.4.1. Dokážte, že ak H je normálna podgrupa G a $[G : H] = n$, tak $x^n \in H$ pre ľubovoľné $x \in G$. Ukážte na príklade, že toto tvrdenie nemusí platiť, ak H nie je normálna.

3.5 Vety o izomorfizme

V úlohe 3.1.3 sme videli vzťah medzi surjektívnymi zobrazeniami a reláciami ekvivalencie. V prípade, že na danej množine máme navyše grupovú štruktúru, surjektívne homomorfizmy budú podobným spôsobom zodpovedať normálnym podgrupám (a navyše, ako uvidíme v cvičeniach za touto časťou, istým špeciálnym reláciám ekvivalencie, ktoré voláme kongruencie).

Veta 3.5.1 (Kanonický homomorfizmus). *Ak G je grupa a H je normálna podgrupa G , tak zobrazenie $f: G \rightarrow G/H$ dané predpisom*

$$f: a \mapsto aH$$

je surjektívny homomorfizmus. Tento homomorfizmus voláme kanonický homomorfizmus.

Navyše, jadro kanonického homomorfizmu je práve podgrupa H .

Dôkaz. Z vlastností násobenia podmnožín grupy (lema 3.2.2) a z toho, že H je normálna podgrupa dostaneme

$$f(a)f(b) = (aH)(bH) = a(Hb)H = a(bH)H = (ab)H^2 = (ab)H = f(ab).$$

Teda toto zobrazenie je skutočne homomorfizmus.

Surjektívnosť vyplýva priamo z definície.

Pretože neutrálny prvok faktorovej grupy G/H je $eH = H$, jadro zobrazenia f je množina tých $a \in G$, pre ktoré platí $aH = eH$, čo je presne podgrupa H (vyplýva to napríklad z lemy 3.2.5, ľahko to však môžeme overiť aj priamo.) \square

Vidíme teda, že pre každú faktorovú grupu máme surjektívny homomorfizmus. Obrátené tvrdenie dáva nasledujúca veta:

Veta 3.5.2 (Veta o izomorfizme). *Ak $f: G \rightarrow G'$ je homomorfizmus grúp, tak $\text{Ker } f$ je normálna podgrupa grupy G a faktorová grupa $G/\text{Ker } f$ je izomorfná s podgrupou $\text{Im } f$ grupy G' .*

Dôkaz. Označme $H = \text{Ker } f$ a neutrálny prvok grupy G' označme ako e' . Z dôsledku 2.3.10 vieme, že H je podgrupa G . Ukážeme, že táto podgrupa je normálna. Skutočne, ak $h \in \text{Ker } f$, t.j. $f(h) = e'$, tak aj

$$f(aha^{-1}) = f(a)f(h)f(a)^{-1} = f(a)e'f(a)^{-1} = f(a)f(a)^{-1} = e'$$

a $aha^{-1} \in \text{Ker } f = H$.

Definujme zobrazenie $\varphi: G/H \rightarrow \text{Im } f$ ako

$$\varphi: aH \mapsto f(a).$$

Najprv ukážeme, že toto zobrazenie je dobre definované (nezávisí od výberu reprezentanta ľavej triedy aH). Skutočne, ak $aH = bH$, tak $b^{-1}a \in H = \text{Ker } f$, čiže $f(b^{-1}a) = e'$. Potom

$$f(b) = f(b)e' = f(b)f(b^{-1}a) = f(bb^{-1}a) = f(a).$$

Zostáva dokázať, že takto definované zobrazenie je bijektívny homomorfizmus. Máme

$$\varphi(abH) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(aH)\varphi(bH),$$

teda φ je homomorfizmus.

Surjektívnosť vyplýva z toho, že za obor hodnôt sme zobrali $\text{Im } f$. Aby sme ukázali, že homomorfizmus φ je injektívny, stačí ukázať, že $\text{Ker } \varphi$ obsahuje iba neutrálny prvok (úloha 2.3.7). Skutočne, ak $\varphi(aH) = e'$, znamená to, že $f(a) = e'$ a $a \in \text{Ker } f = H$, teda $aH = H$. \square

Dôsledok 3.5.3. *Ak $f: G \rightarrow H$ je surjektívny homomorfizmus grúp, tak grupa H je izomorfná s faktorovou grupou $G/\text{Ker } f$.*

Vety 3.5.1 a 3.5.2 nám hovoria, že normálne podgrupy sú práve jadrá homomorfizmov. (Jadro každého homomorfizmu je normálna podgrupa a obrátene, pre každú normálnu podgrupu máme epimorfizmus na faktorovú grupu, ktorého jadrom je práve táto podgrupa.)

Môžeme si všimnúť, že veta o izomorfizme nám dáva ďalšiu možnosť ako ukázať, že nejaká podgrupa grupy G je normálna – ak sa nám podarí nájsť homomorfizmus z G do inej grupy, ktorého jadrom je daná podgrupa. Dokonca vieme jednoducho popísať aj triedy rozkladu – do jednej triedy patria tie prvky z G , ktoré majú v tomto homomorfizme ten istý obraz. (Úloha 3.5.12, viac-menej to vidno už aj z dôkazu vety o izomorfizme.)

Z vety o izomorfizme okamžite dostaneme nasledujúce jednoduché dôsledky.

Príklad 3.5.4. Použijme vetu o izomorfizme pre homomorfizmy $f: G \rightarrow H$, $f(x) = e$ (kde G , H sú ľubovoľné grupy a e označuje neutrálny prvok grupy H) a $\text{id}_G: G \rightarrow G$. Platí $\text{Ker } f = G$ a $\text{Ker } \text{id}_G = \{e\}$, z čoho vyplýva na základe vety 3.5.2 $G/G \cong \{e\}$ a $G/\{e\} \cong G$.

V predchádzajúcej podkapitole sme uviedli niekoľko príkladov faktorových grúp pričom sme spomenuli, že sú izomorfné s niektorými známymi grupami. Predchádzajúca veta je jednoduchým prostriedkom ako ukázať, že ide skutočne o izomorfné grupy.

Príklad 3.5.5. Z príkladu 3.2.4 vieme, že rozklad grupy \mathbb{Z} podľa podgrupy $3\mathbb{Z}$ má 3 prvky. Z toho je jasné, že faktorová grupa $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ je izomorfná s grupou (\mathbb{Z}_3, \oplus) . (Z dôsledku 3.2.16 a vety 2.4.12 vyplýva, že \mathbb{Z}_3 je, až na izomorfizmus, jediná trojprvková grupa.)

Skúsme však tento fakt odvodiť na základe vety 3.5.2. Na to stačí nájsť surjektívny homomorfizmus so \mathbb{Z} na \mathbb{Z}_3 , ktorého jadro je práve $3\mathbb{Z}$. Takýmto homomorfizmom je zobrazenie $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3$ dané predpisom

$$f: n \mapsto n \bmod 3,$$

t.j. každému prvku priradí zvyšok po delení 3.

Príklad 3.5.6. Uvažujme situáciu z príkladu 3.2.8, t.j. grupu $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$ a jej podgrupu $H = \{(x, x); x \in \mathbb{R}\}$. Jednoducho možno overiť, že zobrazenie $f: (G, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$

$$f: (x, y) \mapsto x - y$$

je epimorfizmus a $\text{Ker } f = H$. Z toho vyplýva, že $G/H \cong (\mathbb{R}, +)$.

Príklad 3.5.7. V príklade 3.2.9 sme mali $G = \mathbb{Z}_8$ a $H = 4\mathbb{Z}_8 = \{0, 4\}$. V tomto prípade máme surjektívny homomorfizmus $f: \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_4$

$$f: n \mapsto n \bmod 4$$

a faktorová grupa G/H je izomorfná s grupou (\mathbb{Z}_4, \oplus) .

Príklad 3.5.8. V príklade 3.3.5 sme videli, že jedinou normálnou podgrupou grupy S_3 je podgrupa A_3 všetkých párnych permutácií. Zobrazenie $f: S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_2$, ktoré priradí párnym permutáciám 0 a nepárnym 1 je surjektívny homomorfizmus taký, že $\text{Ker } f = A_3$.

3.5.1 Druhá a tretia veta o izomorfizme*

Dôkaz nasledujúceho tvrdenia je veľmi podobný tej časti dôkazu vety 3.5.2, v ktorej sme dokazovali, že ide o homomorfizmus.

Lema 3.5.9. *Nech $f: G \rightarrow G'$ je grupový homomorfizmus. Nech H je normálna podgrupa G taká, že $H \subseteq \text{Ker } f$. Potom zobrazenie $\varphi: G/H \rightarrow G'$ dané predpisom*

$$\varphi(aH) = f(a)$$

je dobre definované a je to grupový homomorfizmus.

Navyše, ak f je epimorfizmus, tak aj φ je epimorfizmus.

Dôkaz. Najprv ukážeme, že φ je dobre definované. Ak máme 2 rôznych reprezentantov tej istej triedy, t.j. $aH = bH$, tak platí $b^{-1}a \in H \subseteq \text{Ker } f$. To znamená, že $f(b^{-1}a) = e'$, a teda

$$f(b) = f(b)e' = f(b)f(b^{-1}a) = f(bb^{-1}a) = f(a).$$

Overíme teraz, že φ je homomorfizmus.

$$\varphi(abH) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(aH)\varphi(bH).$$

Ak f je surjektívne zobrazenie, tak pre každé $b \in G'$ existuje $a \in G$ také, že $f(a) = b$. Potom platí $\varphi(aH) = b$, teda aH je vzor b v zobrazení φ . Z toho vyplýva, že aj zobrazenie φ je surjektívne. \square

Ak túto lemu použijeme na kanonický homomorfizmus $\varphi: G \rightarrow G/K$, dostaneme:

Dôsledok 3.5.10. *Ak H, K sú normálne podgrupy grupy G a $H \subseteq K$, tak zobrazenie $f: G/H \rightarrow G/K$*

$$f: aH \mapsto aK$$

je surjektívny homomorfizmus.

Pomocou predchádzajúcej vety môžeme odvodiť výsledok, ktorý pripomína „krátenie“ pre faktorové grupy. Dôležité je uvedomiť si, že ak H, K sú normálne podgrupy G a $H \subseteq K$, tak H je normálna podgrupa K . Navyše K/H je podmnožina G/H tvorená triedami aH pre ktoré $a \in K$.

Veta 3.5.11 (Tretia veta o izomorfizme). *Ak H, K sú normálne podgrupy G , pričom $H \subseteq K \subseteq G$, tak K/H je normálna podgrupa G/H a platí*

$$G/K \cong (G/H)/(K/H).$$

Dôkaz. Pretože $H \subseteq K$, dostávame z dôsledku 3.5.10, že zobrazenie $\psi: G/H \rightarrow G/K$ určené predpisom

$$\psi: aH \mapsto aK$$

je surjektívny homomorfizmus. Potom podľa vety 3.5.2 je grupa G/K izomorfná s grupou $(G/H)/(\text{Ker } \psi)$. Pokúsme sa teda určiť jadro homomorfizmu ψ .

Do $\text{Ker } \psi$ patria tie ľavé triedy aH grupy G/H , ktoré sa zobrazia na neutrálny prvok grupy G/K , čiže na $eK = K$. Teda $aH \in \text{Ker } \psi$ platí práve vtedy, keď $aK = K$, čiže $a \in K$. To znamená, že $\text{Ker } \psi = K/H$ (keďže $\text{Ker } \psi$ pozostáva práve z tých ľavých tried aH , pre ktoré $a \in K$). Vďaka tomu vidíme z vety o izomorfizme, že $K/H = \text{Ker } \psi$ je normálna podgrupa a

$$(G/H)/(K/H) \cong G/K.$$

□

Dôkaz predchádzajúcej vety opäť ilustruje užitočnosť vety 3.5.2. Keby sme namiesto použitia tejto vety robili priamy dôkaz, museli by sme pracovať s prvkami grupy $(G/H)/(K/H)$, čo sú triedy rozkladu faktorovej grupy G/H podľa jej podgrupy K/H , ktorých reprezentantmi sú opäť triedy rozkladu, tentokrát rozkladu K podľa H . Zdá sa, že prístup využívajúci vetu o izomorfizme je prehľadnejší.

Ukážeme si ešte jeden výsledok o faktorových grupách.

Veta 3.5.12 (Druhá veta o izomorfizme). *Nech G je grupa, N je normálna podgrupa G a S je podgrupa G . Potom množina SN tvorí podgrupu grupy G , N je normálna podgrupa SN , $S \cap N$ je normálna podgrupa S a platí*

$$S/(S \cap N) \cong SN/N.$$

Dôkaz. Najprv overme, že $SN = \{ab; a \in S, b \in N\}$ je podgrupa G . Z toho, že N je normálna, máme $gN = Ng$ pre každé $g \in G$, teda pre ľubovoľné $g \in G$ a $n \in N$ existuje $n' \in N$ také, že $gn = n'g$. Pomocou tejto vlastnosti už ľahko overíme kritérium podgrupy.

Ak máme 2 prvky z SN tvaru a_1b_1, a_2b_2 , kde $a_{1,2} \in S$ a $b_{1,2} \in N$, tak ich súčin môžeme vyjadriť ako

$$a_1b_1a_2b_2 = a_1a_2b'_1b_2$$

pre nejaké $b'_1 \in N$. Keďže $a_1a_2 \in S$ a $b'_1b_2 \in N$, vidíme, že uvedený súčin patrí do SN .

Ak máme prvok z SN tvaru ab , pričom $a \in S$, $b \in N$, tak tento prvok môžeme prepísať ako $b'a$ pre vhodné $b \in N$. Potom inverzný prvok

$$(b'a)^{-1} = a^{-1}b'^{-1}$$

je opäť z SN .

Z toho, že $N \subseteq SN$ dostaneme, že N je podgrupa SN . Fakt, že $N \triangleleft SN$, t.j. ide o normálnu podgrupu, overíme použitím podmienky (vi) z vety 3.3.2. Skutočne, pre ľubovoľné $a \in S$, $b \in N$ máme

$$(ab)N(ab)^{-1} = (ab)N(b^{-1}a^{-1}) = a(bNb^{-1})a^{-1} = aNa^{-1} = N.$$

Na dôkaz ostatných častí tvrdenia použijeme kanonický homomorfizmus

$$\begin{aligned} f: a &\mapsto aN, \\ f: G &\rightarrow G/N. \end{aligned}$$

Aj jeho zúženie $f|_S: S \rightarrow G/N$ na množinu S je homomorfizmus. Pokúsme sa zistiť, čomu sa rovná jeho jadro.

Máme

$$\text{Ker } f|_S = \{a \in S; aN = N\} = \{a \in S; a \in N\} = S \cap N.$$

Podľa vety o izomorfizme je $S \cap N$ normálna podgrupa S a platí

$$S/(S \cap N) \cong \text{Im } f|_S.$$

Stačí nám už teda len dokázať, že $\text{Im } f|_S = SN/N$.

Množina $\text{Im } f|_S$ pozostáva práve z tých tried aN , pre ktoré $a \in S$;

$$\text{Im } f|_S = \{aN; a \in S\}.$$

Súčasne však máme

$$SN/N = \{abN; a \in S, b \in N\} = \{aN; a \in S\},$$

teda skutočne platí rovnosť $\text{Im } f|_S = SN/N$. □

Cvičenia

Úloha 3.5.1. Overte, či H je normálna podgrupa grupy G a opíšte faktorovú grupu G/H (aké má triedy, vybrať z každej triedy práve jedného reprezentanta, zistiť, či je izomorfná s nejakou známou grupou).

- a) $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$, $H = \{(x, y); x + 2y = 0\}$
- b) $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$, $H = \{(x, 3x); x \in \mathbb{R}\}$
- c) $G = (\mathbb{C}, +)$, $H = \mathbb{R}$
- d) $G = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$, $H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- e) $G = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$, $H = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R}; x > 0\}$
- f) $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = 4\mathbb{Z} = \{4z; z \in \mathbb{Z}\}$
- g) $G = (\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6, +)$, $H = [(2, 2)]$
- h) $G = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +)$, $H = \{(n, m, 0); n, m \in \mathbb{Z}\}$
- i) $G = (\{c \in \mathbb{C}; c^{12} = 1\}, \cdot)$, $H = \{c \in \mathbb{C}; c^4 = 1\}$
- j) $G = (S_n, \circ)$, $H = A_n$
- k) $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = n\mathbb{Z}$
- l) $G = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$, $H = \{c \in \mathbb{C}; c^6 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$
- m) $G = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$, $H = \{c \in \mathbb{C}; c^n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$

- Úloha 3.5.2.** Zistite, či dané grupy sú izomorfné. V celom cvičení budeme ako S označovať grupu $(\{c \in \mathbb{C}; |c| = 1\}, \cdot)$ (prípadne množinu prvkov tejto grupy) a $C_n = (\{c \in \mathbb{C}; c^n = 1\}, \cdot)$
- $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot) / \{c \in \mathbb{C}; c^n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}, (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot) / \mathbb{R}^+$ (pod \mathbb{R}^+ tu myslíme kladné reálne čísla, čiže $0 \notin \mathbb{R}^+$), S
 - $(\mathbb{R}, +) / \mathbb{Z}, S / C_n, S$
 - $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot) / C_n$
 - $(\{c \in \mathbb{C}; c^n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}, \cdot) / \mathbb{R}^+, C_n$
 - $(\{c \in \mathbb{C}; c^n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}, \cdot) / C_n, \mathbb{R}^+$
 - $C_{12} / C_4, \mathbb{Z}_3$
 - $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, +) / (\mathbb{Z}_2 \times \{0\}), \mathbb{Z}_3$
 - $S_3 / [(123)], (\mathbb{Z}_2, +)$

Úloha 3.5.3. Nech G je grupa všetkých regulárnych matíc typu $n \times n$ (s operáciou násobenia matíc). Ako H označme tie z nich, ktoré majú determinant $|A| = 1$. Dokážte, že H je invariantná podgrupa G ! Vedeli by ste nájsť grupu izomorfnú s G/H ?

Úloha 3.5.4. Nech $S = \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}$ (jednotková kružnica v komplexnej rovine). Ukážte, že zobrazenie $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow S$ definované ako $\varphi(x) = e^{2\pi xi} = \cos 2\pi x + i \sin 2\pi x$ je surjektívny homomorfizmus. Nájdite $\text{Ker } \varphi$. Aká faktorová grupa je potom izomorfná s kružnicou?

Úloha 3.5.5. Je podgrupa $\{id, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ normálna podgrupa A_4 ?

Úloha 3.5.6. Ukážte, že \mathbb{Q}/\mathbb{Z} (obe grupy berieme so sčítaním) je nekonečná grupa, v ktorej má každý prvok konečný rád.

Úloha 3.5.7. Nech $\varphi: G \rightarrow G/H$ je kanonický homomorfizmus a $X \subset G$. Dokážte: Ak $\varphi[X]$ generuje G/H , tak $H \cup X$ generuje G .

Úloha 3.5.8. Ukážte na príklade, že ak H je normálna podgrupa G , tak G nemusí obsahovať podgrupu izomorfnú s G/H .

Úloha 3.5.9. Nech H je podgrupa grupy G a $[G : H] = n$.

- Ukážte, že ak H je normálna podgrupa, tak pre každé $x \in G$ platí $x^n \in H$.
- Platí toto tvrdenie pre ľubovoľnú podgrupu (t.j. aj bez predpokladu, že H je normálna)?

Úloha 3.5.10. Nech G je množina všetkých matíc tvaru $\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ a $a \neq 0$. Dokážte:

- G s násobením matíc tvorí grupu.
- Zobrazenia $f: G \rightarrow (\mathbb{R}, \cdot)$ a $g: G \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ dané ako $f: \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \mapsto a$; $g: \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \mapsto b$ sú homomorfizmy.
- Izomorfizmus akých grúp dostaneme podľa časti b) na základe vety o izomorfizme?
- Popíšte lineárne zobrazenia zodpovedajúce maticiam z $\text{Ker } f$, $\text{Ker } g$ a G .

Úloha 3.5.11. Nech $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R}; a^2 + b^2 = 1 \right\}$ (operácia je násobenie matíc.) Nech ďalej $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R}; a^2 + b^2 = 1 \right\}$.

- Zistite, či G je grupa a či H je podgrupa G .
- Je H normálna podgrupa grupy G ? Ak áno, s akou grupou je izomorfná grupa G/H ?
- Ako sa dajú geometricky popísať lineárne zobrazenia zodpovedajúce maticiam z G a H ?

Úloha 3.5.12. Dokážte, že ak $f: G \rightarrow H$ je surjektívny homomorfizmus grúp, tak ľavý (pravý) rozklad grupy G podľa normálnej podgrupy $\text{Ker } f$ pozostáva presne z množín $f^{-1}(x) = \{g \in G; f(g) = x\}$ pre $x \in H$. (Teda triedy rozkladu sú presne vzory prvkov z H . Takto dostávame bijekciu medzi triedami rozkladu G podľa $\text{Ker } f$ a prvkami H , táto bijekcia sa už vyskytla v dôkaze vety o izomorfizme.)

Úloha 3.5.13. V úlohe 3.3.8 sme videli, že centrum grupy G , t.j. množina $Z(G) = \{g \in G; (\forall h \in G)gh = hg\}$, je normálna podgrupa G . Dokážte, že faktorová grupa $G/Z(G)$ je izomorfná s grupou $\text{VAut } G$ všetkých vnútorných automorfizmov grupy G (pozri úlohu 2.6.1).

Úloha 3.5.14. Vo vete 3.3.1 sme ukázali, že ak $H \triangleleft G$, tak predpis

$$(aH) \cdot (bH) = (ab)H$$

dobře definuje binárnu operáciu na množine ľavých tried rozkladu G podľa H . Ukážte, že platí aj opačná implikácia: Ak uvedený predpis dobre definuje binárnu operáciu, tak $H \triangleleft G$. (Teda invariantnosť podgrupy H je nielen postačujúca ale aj nutná podmienka na to, aby táto binárna operácia bola dobre definovaná.)

Úloha 3.5.15*. Dokážte, že v grupe $(\mathbb{Q}, +)$ neexistuje maximálna (vzhľadom na inklúziu) vlastná podgrupa. T.j. neexistuje podgrupa S grupy $(\mathbb{Q}, +)$ taká, že ak $S \subseteq T$ a T je podgrupa, tak $T = S$ alebo $T = \mathbb{Q}$. (Inak povedané: Jediné podgrupy obsahujúce S by boli S a \mathbb{Q} .)

3.6 Grupové kongruencie

Už vieme, že normálne podgrupy sú presne jadrá homomorfizmov. Veta o izomorfizme nám tiež ukazuje súvis medzi surjektívnymi homomorfizmami a faktorovými grupami.

Táto podkapitola nám dá ešte jeden možný pohľad na faktorové grupy a normálne podgrupy. Uvedomiť si vzťah medzi týmito rôznymi prístupmi môže byť užitočné pre lepšie pochopenie týchto pojmov.

My sme najprv zaviedli normálne grupy a pomocou nich faktorové grupy. V princípe by sa dalo postupovať aj naopak – začať s pojmom kongruencie, pomocou neho definovať faktorovú grupu a takto sa dostať aj k pojmu faktorovej grupy. Je na vašom posúdení, ktorý postup sa vám zdá prirodzenejší a zrozumiteľnejší.

To, čo budeme robiť v tejto kapitole sa dá zhruba zhrnúť takto: Ak máme nejakú reláciu ekvivalencie na danej množine G , tak dostávame rozklad na triedy ekvivalencie. Predpokladajme, že máme k dispozícii aj binárnu operáciu na tejto množine – primárne nás bude zaujímať prípad, že máme grupu (G, \cdot) . Vieme potom nejakou dostať binárnu operáciu alebo dokonca grupu na množine tried ekvivalencie? Aké podmienky by mala spĺňať táto relácia ekvivalencie, aby sa to dalo urobiť?

3.6.1 Pojem kongruencie pre celé čísla

Neskôr aspoň stručne spomenieme aj kongruencie pre okruhy (definícia 4.2.23). Na začiatok je ale možno jednoduchšie pozeráť sa na prípad, keď máme iba jednu operáciu – takže hlavný cieľ tejto časti je pozrieť sa na kongruencie v grupách.

Napriek tomu však najprv pripomeniem situáciu, v ktorej ste sa už so slovom *kongruencia* stretli – a je to v skutočnosti špeciálny prípad okruhovej kongruencie.

Pre ľubovoľné dve celé čísla vieme povedať čo to znamená, že sú kongruentné modulo n .

Definícia 3.6.1. Nech $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$. Pre $x, y \in \mathbb{Z}$ hovoríme, že x a y sú *kongruentné modulo n* , ak platí $n \mid x - y$. Fakt, že x a y sú kongruentné modulo n označujeme ako

$$x \equiv y \pmod{n}.$$

Dve celé čísla sú teda kongruentné ako ich rozdiel je násobok n – čo je vlastne to isté, ako povedať, že dávajú rovnaký zvyšok po delení číslom n .

Tiež si môžeme všimnúť, že čísla x a y sú kongruentné modulo n práve vtedy, keď $x - y \in n\mathbb{Z} = \{nk; k \in \mathbb{Z}\}$ a množina $n\mathbb{Z}$ je podgrupa grupy $(\mathbb{Z}, +)$. Pripomenúť si tento základný príklad môže byť užitočné neskôr, keď sa budeme snažiť pozrieť na vzťah medzi grupovými kongruenciami a normálnymi podgrupami.

Všimnime si, že tento vzťah sa pekne správa vzhľadom na sčítovanie aj násobenie. Konkrétne, ak platí

$$\begin{aligned}x_1 &\equiv y_1 \pmod{n} \\x_2 &\equiv y_2 \pmod{n}\end{aligned}$$

tak platí aj

$$\begin{aligned}x_1 + y_1 &\equiv x_2 + y_2 \pmod{n} \\x_1 \cdot y_1 &\equiv x_2 \cdot y_2 \pmod{n}\end{aligned}$$

(Ak to nie je jasné, skúste si rozmyslieť prečo.)

Tiež by malo byť pomerne ľahké skontrolovať, že vzťah „byť kongruentný modulo n “ je relácia ekvivalencie.

Cieľom tejto kapitoly je pozeráť sa na veľmi podobný pojem – budeme mať nejakú reláciu ekvivalencie, ktorá rešpektuje našu grupovú operáciu. A budeme sa chcieť pozrieť na to, aké ďalšie veci z toho vieme dostať. (A tiež na to, ako to celé súvisí s faktorovými grupami a s normálnymi podgrupami.)

Na množine celých čísel máme dve operácie, obe sa slušne správajú vzhľadom na kongruenciu. Teda asi prirodzenejšie by bolo pozeráť sa na tento príklad ako na príklad okruhovej kongruencie. Ak chceme teda celé čísla použiť ako ilustráciu pojmu, ktorému sa venujeme teraz, tak si všimajme iba sčítovanie a pracujme s grupou $(\mathbb{Z}, +)$. Potom tento vzťah je špeciálnym prípadom grupovej kongruencie, ktorú teraz ideme zadefinovať.

3.6.2 Relácia kongruencie

Pre danú grupu G sa budeme pozeráť na vhodné relácie ekvivalencie na množine G .

Definícia 3.6.2. Nech (G, \cdot) je grupa. Relácia ekvivalencie \sim na množine G sa nazýva *kongruencia*, ak pre ľubovoľné $x_{1,2} \in G$, $y_{1,2} \in G$ platí

$$x_1 \sim y_1, x_2 \sim y_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 \cdot x_2 \sim y_1 \cdot y_2. \quad (3.3)$$

Ako sme už spomenuli, kongruencie sa dajú zaviesť aj pre iné typy štruktúr. Niekedy teda budeme používať aj názov *grupová kongruencia*.

Podmienka (3.3) je pomerne prirodzená. Vlastne hovorí, že nás zaujímajú iba také relácie ekvivalencie, ktoré sa správajú rozumne vzhľadom na našu operáciu \cdot .

Predtým, než budeme s kongruenciami pracovať ďalej, skúsme si uvedomiť, že kongruencie zachovávajú aj inverzné prvky.

Ako to často pri zavádzaní nového pojmu býva, aj tu vieme vymyslieť nejaké veľmi triviálne prípady

Príklad 3.6.3. Pre ľubovoľnú grupu (G, \cdot) sú relácie

$$\begin{aligned}R_1 &= G \times G \\R_2 &= \{(x, y) \in G \times G; x = y\}\end{aligned}$$

grupové kongruencie.

Príklad 3.6.4. Iný príklad grupovej kongruencie sme už spomenuli. Zoberme si napríklad $(\mathbb{Z}, +)$ a reláciu

$$x \sim y \Leftrightarrow 6 \mid x - y,$$

t.j. reláciu hovoriacu, že x a y sú kongruentné modulo 6. Dostaneme tak grupovú kongruenciu, pretože

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \equiv b_1 \pmod{6} \\ a_2 \equiv b_2 \pmod{6} \end{array} \right\} \implies a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{6}$$

A takisto to funguje ak namiesto čísla šesť vezmeme ľubovoľné $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$.

Lema 3.6.5. *Nech (G, \cdot) je grupa a \sim je grupová kongruencia. Potom pre ľubovoľné prvky $x, y \in G$ také, že $x \sim y$ platí aj $x^{-1} \sim y^{-1}$.*

$$(\forall x, y \in G) x \sim y \implies x^{-1} \sim y^{-1}$$

Dôkaz nie je príliš ťažký – oplatí sa nad ním skúsiť zamyslieť aj samostatne. Ale pre úplnosť som ho uviedol.

Dôkaz. Zo vzťahu $x \sim y$, z definície kongruencie a z vlastností grupy postupne dostaneme:

$$\begin{aligned} x &\sim y \\ xx^{-1} &\sim yx^{-1} \\ e &\sim yx^{-1} \\ y^{-1} &\sim y^{-1}yx^{-1} \\ y^{-1} &\sim x^{-1} \\ x^{-1} &\sim y^{-1} \end{aligned}$$

(V dôkaze sme vlastne využívali aj asociatívnosť – vďaka tomu sme mohli vynechať zátvorky.) \square

3.6.3 Faktorová grupa pre danú reláciu

Po tejto drobnej príprave sa už môžeme pozrieť na to, že kongruencia je presne ten typ relácie, pre ktorú vieme vyrobiť binárnu operáciu (a grupu) aj na množine tried.

Pre reláciu ekvivalencie \sim na množine G si označme množinu tried ekvivalencie ako

$$G/\sim = \{[a]; a \in G\}.$$

Tvrdenie 3.6.6. *Nech (G, \cdot) je grupa a \sim je grupová kongruencia na G .*

(i) *Predpis*

$$[a] \cdot [b] = [a \cdot b] \tag{3.4}$$

určuje dobre definovanú binárnu operáciu na množine G .

(ii) *Množina G s uvedenou operáciou tvorí grupu. Ak G je komutatívna, tak aj grupa G/\sim je komutatívna.*

Grupu G/\sim budeme nazývať faktorová grupa.

Síce sme ten istý názov názov faktorová grupa použili v dvoch rôznych definíciach – vysvetlíme si však, že sú to vlastne iba dva rôzne pohľady na tú istú vec. (A aj teraz – kým sme ešte nepovedali nič o vzťahu medzi grupovými kongruenciami a normálnymi podgrupami – by malo byť z kontextu jasné, či faktorizujeme podľa podgrupy alebo podľa kongruencie.)

Dôkaz. (i): Vlastne chceme ukázať, že pre ľubovoľné $a_1, a_2, b_1, b_2 \in G$ platí

$$\left. \begin{array}{l} [a_1] = [b_1] \\ [a_2] = [b_2] \end{array} \right\} \implies [a_1 a_2] = [b_1 b_2]$$

Pre reláciu ekvivalencie sú však podmienky $[x] = [y]$ a $x \sim y$ ekvivalentné. Po prepísaní teda vidíme, že uvedená podmienka je ekvivalentná s takouto implikáciou.

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \sim b_1 \\ a_2 \sim b_2 \end{array} \right\} \implies a_1 a_2 \sim b_1 b_2$$

To je ale presne podmienka (3.3) z definície kongruencie.²

(ii): Ak už vieme, že sme dostali binárnu operáciu, tak ostatné časti dôkazu sú už vcelku priamočiare.³

Na overenie asociatívosti stačí skontrolovať, že platí:

$$\begin{aligned} [a] \cdot ([b] \cdot [c]) &= [a] \cdot ([b \cdot c]) = [a \cdot (b \cdot c)] = \\ &= [(a \cdot b) \cdot c] = [a \cdot b] \cdot [c] = ([a] \cdot [b]) \cdot [c] \end{aligned}$$

Neutrálnym prvkom je trieda $[e]$:

$$\begin{aligned} [a] \cdot [e] &= [a \cdot e] = [a] \\ [e] \cdot [a] &= [e \cdot a] = [a] \end{aligned}$$

A inverzným prvkom ku $[a]$ je $[a^{-1}]$:

$$\begin{aligned} [a] \cdot [a^{-1}] &= [a \cdot a^{-1}] = [e] \\ [a^{-1}] \cdot [a] &= [a^{-1} \cdot a] = [e] \end{aligned}$$

V dôkaze tejto časti sme v skutočnosti využili lemu 3.6.5. Naschvál som nezdôraznil, kde je táto lema potrebná – a ktorá časť uvedeného dôkazu nie je celkom v poriadku tak, ako som ju napísal tu – pretože chcem, aby ste sa nad tým skúsili zamyslieť samostatne: úloha 3.6.1.

Dôkaz poslednej časti týkajúcej sa komutatívnosti je tiež veľmi priamočiary – úloha 3.6.2. \square

Ďalšia vec, ktorú vidno vcelku ľahko, je existencia pomerne prirodzeného homomorfizmu z G do G/\sim .

Tvrdenie 3.6.7. *Nech \sim je grupová kongruencia na grupa (G, \cdot) . Potom zobrazenie*

$$\begin{aligned} \varphi: G &\rightarrow G/\sim \\ \varphi: x &\mapsto [x] \end{aligned}$$

je surjektívny grupový homomorfizmus. Tento homomorfizmus budeme nazývať kanonický homomorfizmus.

²Z tohto dôkazu vidíme aj to, že podmienka (3.3) je veľmi prirodzená. Inak povedané, grupovú kongruenciu sme definovali presne takým spôsobom, aby sme na množine tried dostali dobre definovanú binárnu operáciu.

³Aj tu – a aj pri všetkých ostatných dôkazoch v tejto časti – platí, že sa oplatí nad dôkazom jednotlivých tvrdení zamyslieť samostatne.

Dôkaz. Vyplýva z definície homomorfizmu a z definície operácie na G/\sim .

$$\varphi(x \cdot y) = [x \cdot y] = [x] \cdot [y] = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$$

Tiež pomerne ľahko vidno, že zobrazenie φ je surjektívne – každý prvok z G/\sim má tvar $[x] = \varphi(x)$ pre nejaké $x \in G$. \square

Tvrdenie 3.6.7 môžeme v istom zmysle obrátiť – každý surjektívny homomorfizmus grúp vyzerá „v podstate“ takto.

Tvrdenie 3.6.8. *Nech $f: G \rightarrow G'$ je surjektívny grupový homomorfizmus. Potom:*

(i) *Relácia \sim na množine G zadaná ako*

$$a \sim b \quad \Leftrightarrow \quad f(a) = f(b)$$

je grupová kongruencia.

(ii) *Pre faktorovú grupu platí*

$$G/\sim \cong G'.$$

Dôkaz. (i) Vieme, že takýmto spôsobom dostaneme reláciu ekvivalencie – úloha 3.1.3. Treba ešte ukázať, že relácia \sim sa správa rozumne vzhľadom na grupovú operáciu. Skutočne však pre $a_1 \sim b_1$ a $a_2 \sim b_2$ máme $f(a_1) = f(b_1)$ aj $f(a_2) = f(b_2)$. Z čoho vyplýva

$$f(a_1 a_2) \stackrel{(*)}{=} f(a_1) f(a_2) = f(b_1) f(b_2) \stackrel{(*)}{=} f(b_1 b_2),$$

a teda

$$a_1 a_2 \cong b_1 b_2.$$

Symbolom $(*)$ sme vyznačili miesta, na ktorých sme využili fakt, že f je homomorfizmus. (A v prvej časti tvrdenia sme dokonca ani nikde nepotrebovali surjektívnosť.)

(ii) Chceli by sme nájsť izomorfizmus medzi G/\sim a G' . Pokúsme sa ho zdefinovať ako

$$\begin{aligned} \varphi: G/\sim &\rightarrow G' \\ \varphi: [a] &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

Ako prvú vec si musíme rozmyslieť, či sme skutočne dostali zobrazenie – t.j. či φ je *dobře definované*.

Ak platí $[a] = [b]$, znamená to, že $a \sim b$, a teda

$$f(a) = f(b).$$

Čiže uvedený predpis naozaj definuje zobrazenie z G/\sim do G' .

Zo surjektívnosti zobrazenia f vidíme, že aj φ je *surjektívne*.

Navyše φ je aj *injektívne*, z rovnosti $\varphi([a]) = \varphi([b])$ totiž vyplýva $f(a) = f(b)$, čo znamená, že $a \sim b$ a $[a] = [b]$.

Zostáva ukázať, že φ je homomorfizmus – úloha 3.6.3. \square

Vidíme teda, že relácie kongruencie súvisia so surjektívnymi homomorfizmami. Chceli by sme sa dostať aj k súvisu s normálnymi podgrupami a k tomu, aký je vzťah medzi faktorizáciou podľa relácie kongruencie a faktorizáciou podľa normálnej podgrupy.

Najprv sa pozrime na to, ako vyzerá jadro kanonického homomorfizmu. Pomerne ľahko si uvedomíme, že platí:

$$\begin{aligned} \text{Ker } \varphi &= \{a \in G; \varphi(a) = [e]\} \\ &= \{a \in G; [a] = [e]\} \\ &= \{a \in G; a \sim e\} \\ &= [a]. \end{aligned}$$

Je to teda presne trieda neutrálneho prvku.

Už sme videli, že normálne podgrupy sú presne tie podgrupy, ktoré sa dajú dostať ako jadrá homomorfizmov. Dá sa teda očakávať, že trieda neutrálneho prvku môže hrať významnú úlohu.

Tvrdenie 3.6.9. *Nech (G, \cdot) je grupa a \sim je kongruencia na grupe G . Potom $H = [e]$ je normálna podgrupa grupy G .*

Navyše platí

$$a \sim b \quad \Leftrightarrow \quad ab^{-1} \in H.$$

Dôkaz. H je podgrupa. Evidentne platí $e \in [e]$, a teda množina $[e]$ je neprázdna.

Ak $x, y \in [e]$ tak z (3.3) máme

$$x \cdot y \sim e \cdot e = e,$$

a teda aj $xy \in [e]$.

Lema 3.6.5 zabezpečí uzavretosť množiny $[e]$ vzhľadom na inverzné prvky.

H je normálna. Pre ľubovoľný prvok $x \in H$ a ľubovoľné $g \in G$ dostaneme

$$gxg^{-1} \sim geg^{-1} = e,$$

teda aj $gxg^{-1} \in H$.

Vzťah medzi \sim a H . Ak platí $a \sim b$, tak máme aj

$$ab^{-1} \sim bb^{-1} = e,$$

a teda $ab^{-1} \in H$.

Obrátene, ak $ab^{-1} \in H$, znamená to, že

$$\begin{aligned} ab^{-1} &\sim e \\ (ab^{-1}) \cdot b &\sim e \cdot b \\ a &\sim b \end{aligned}$$

□

Vidíme teda, ako môžeme z kongruencie dostať normálnu podgrupu. Ale aj obrátene z normálnej podgrupy vieme dostať kongruenciu.

Tvrdenie 3.6.10. *Nech (G, \cdot) je grupa a H je normálna podgrupa grupy G . Potom predpis*

$$x \sim y \quad \Leftrightarrow \quad xy^{-1} \in H$$

dáva kongruenciu na grupe G .

Navyše pre túto kongruenciu platí $H = [e]$, t.j. podgrupa H je presne trieda neutrálneho prvku.

Dôkaz. Úloha 3.6.4. □

Keď poskladáme doteraz spomínané pojmy dokopy, tak vidíme, že oba doteraz spomenuté pojmy, ktoré sme nazvali faktorovou grupou – t.j. G/\sim a G/H – vlastne predstavujú to isté.

Ak máme na grupe G nejakú reláciu kongruencie \sim , tak:

- Trieda $H = [e]$ je normálna podgrupa.
- Pre túto podgrupu máme $x \sim y \Leftrightarrow xy^{-1} \in H$.
- Pre každý prvok $x \in G$ platí $xH = [x]$, t.j. triedy rozkladu G podľa relácie \sim sú presne ľavé (pravé) triedy rozkladu G podľa podgrupy H .
- Teda množiny G/\sim a G/H sú presne rovnaké. A operácia definovaná vzťahmi (3.2) a (3.4) je presne tá istá operácia.

Podobne, ak začneme s normálnou podgrupou H , tak z nej vieme dostať uvedeným spôsobom reláciu kongruencie \sim a opäť platí, že G/\sim a G/H je presne tá istá grupa.

Máme teda viacero prístupov k tomu, ako sa dá pozeráť na faktorové grupy resp. na normálne podgrupy:

- rozklad grupy podľa normálnej podgupy;
- rozklad grupy podľa grupovej kongruencie;
- obraz grupy v surjektívnom homomorfizme.

faktorová grupa	normálna podgrupa
G/\sim	$[e]$
G/H	H
$f: G \rightarrow G'$	$\text{Ker } f$

Súčasne máme tri pohľady na normálne podgrupy.

- Sú to podgrupy, pre ktoré je ľavý a pravý rozklad rovnaký.
- Sú to presne tie podgrupy, ktoré vieme dostať z relácie kongruencie ako triedu neutrálneho prvku.
- Sú to práve tie podgrupy, ktoré sú jadrami grupových homomorfizmov.

Príklad 3.6.11. Pozrime na najjednoduchší príklad, ktorý sme spomínali – grupa $(\mathbb{Z}, +)$, relácia „byť kongruentný modulo n “, podgrupa $H = n\mathbb{Z}$. Pomerne ľahko sa dá skontrolovať, že všetky doteraz spomínané veci fungujú:

- Trieda $[0]$ je presne podgrupa $n\mathbb{Z}$.
- Z podgrupy $H = n\mathbb{Z}$ dostaneme reláciu určenú podmienkou $x - y \in n\mathbb{Z}$, čo je presne kongruencia modulo n .
- Trieda celého čísla x je presne $x + H = \{x + kn; k \in \mathbb{Z}\}$.
- Ak vytvoríme faktorovú grupu, tak dostaneme presne $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

3.6.4 Faktorizácia v ďalších štruktúrach

Faktorizácii sa budeme venovať neskôr pre okruhy – v časti 4.2. Uvidíme, že okruh sa dá faktorizovať podľa ideálu – teda ideály tu hrajú podobnú úlohu ako normálne podgrupy pri faktorových grupách. Aj tu by sa dalo začať s okruhovými kongruenciami a vybudovať pojem faktorového okruhu pomocou nich. Okruhovú kongruenciu sú spomenuté v definícii 4.2.23 a v niektorých cvičeniach za kapitolou o faktorových okruhoch.

Z podobnosti týchto konštrukcií sa dá prísť na to, že kongruencie by sme boli schopní zdefinovať aj v iných situáciách. Ak pracujeme so štruktúrou určenou niekoľkými binárnymi operáciami na množine, tak môžeme zdefinovať kongruencie – sú to relácie ekvivalencie rešpektujúce všetky uvedené operácie. A potom môžeme definovať faktorovú štruktúru. Pomerne všeobecne sa takéto niečo dá zdefinovať pre *univerzálne algebry*.

Ako jeden špeciálny prípad môžeme spomenúť *pologrupy* (definícia 2.1.1). Môžete si všimnúť, že pri niektorých častiach v tejto kapitole sme vlastne nepotrebovali štruktúru grupy – iba binárnu operáciu na množine G . Takže by sme boli schopní zdefinovať reláciu kongruencie a pomocou nej faktorovú pologrupu.

Je tu však jeden podstatný rozdiel. V každej grupe máme jeden význačný prvok – neutrálny prvok. Pomocou neho sme sa teda vedeli dostať k normálnym podgrupám. (Normálna podgrupa je trieda ekvivalencie neutrálneho prvku. Okrem toho sme normálne podgrupy vedeli dostať ako vzory neutrálneho prvku v homomorfizme.) V definícii pologrupy sa nijaký špeciálny prvok nevyskytuje – nevieme tu teda dostať podpologrupy, ktoré by v nejakom zmysle zodpovedali normálnym podgrupám.

Iný typ faktorovej štruktúry, s ktorou by ste sa možno mohli stretnúť, sú faktorové bo-olovské algebry.

Okrem toho v časti 3.8 stručne spomíname aj faktorové vektorové priestory. Tu je situácia trochu iná než to, čo sme spomenuli vyššie – násobenie skalárom totiž nie je binárna operácia na V . Konštrukcia faktorového vektorového priestoru je však výrazne jednoduchšia než to, čo sme robili pre grupy. (Faktorizovať sa dá podľa každého podpriestoru.)

Cvičenia

Úloha 3.6.1. Akým spôsobom sa v dôkaze existencie inverzného prvku faktorovej grupy v tvrdení 3.6.6 využíva fakt, že relácia kongruencie zachováva inverzné prvky (t.j. lema 3.6.5)?

Úloha 3.6.2. Ukážte, že ak G je komutatívna grupa, tak aj faktorová grupa G/\sim je komutatívna.

Úloha 3.6.3. Dokážte, že zobrazenie φ z dôkazu druhej časti tvrdenia 3.6.8 je skutočne homomorfizmus.

Úloha 3.6.4. Ukážte, že pre ľubovoľnú normálnu podgrupu H grupy G predpis

$$x \sim y \quad \Leftrightarrow \quad xy^{-1} \in H$$

definuje reláciu kongruencie na grupe G a že pre túto reláciu platí $H = [e]$.

Úloha 3.6.5. Nech G je grupa a $R \subseteq G \times G$ je relácia na množine G . Ukážte, že R je (grupová) kongruencia práve vtedy, keď R je podgrupa grupy $G \times G$.

Úloha 3.6.6. Nech pre každé $i \in I$ je R_i relácie grupová kongruencia na G . Dokážte, že aj relácia $R = \bigcap_{i \in I} R_i$ je kongruencia na grupe G .

3.7 Komutátor a komutant*

Skúsme sa pozrieť na problém, kedy je faktorová grupa komutatívna. Lahko dostaneme nasledujúce kritérium.

Lema 3.7.1. Ak G je grupa a H je jej normálna podgrupa, tak G/H je komutatívna práve vtedy, keď pre ľubovoľné $a, b \in G$ platí

$$a^{-1}b^{-1}ab \in H.$$

Dôkaz. Grupa G/H je komutatívna práve vtedy, keď pre ľubovoľné $a, b \in G$ platí $(ab)H = (ba)H$. Podľa lemy 3.2.5 je to ekvivalentné s podmienkou

$$(ba)^{-1}ab = a^{-1}b^{-1}ab \in H.$$

□

Definícia 3.7.2. Nech G je grupa. Pre $a, b \in G$ nazývame prvok

$$[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab$$

sa *komutátor* prvkov a a b .

Podgrupa generovaná všetkými komutátormi sa nazýva *komutant* grupy G a označuje sa ako $[G, G]$.

Poznamenajme, že množina všetkých komutátorov ešte nemusí tvoriť podgrupu, hoci nie je celkom ľahké nájsť kontrapríklad. (Najmenší možný kontrapríklad je 96-prvková grupa [Rot, Exercise 2.43]).

Ukážeme, že komutant je vždy normálna podgrupa. Na to sa nám bude hodiť explicitný popis podgrupy generovanej danou množinou.

Lema 3.7.3. Ak G je grupa a $A \subseteq G$, tak podgrupa $[A]$ generovaná množinou A pozostáva práve z prvkov tvaru

$$a_1^{\varepsilon_1} a_2^{\varepsilon_2} \dots a_n^{\varepsilon_n}$$

pre $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in A$ a $\varepsilon_i \in \{\pm 1\}$. (V prípade, že $n = 0$, pod týmto súčynom chápeme neutrálny prvok.)

Dôkaz. □

Tvrdenie 3.7.4. Nech G je grupa. Jej podgrupa $[G, G]$ je normálna.

Dôkaz. □

3.8 Faktorové vektorové priestory *

Keď sme zvládli faktorové grupy, môžeme si uvedomiť, že podobná konštrukcia bude fungovať aj pre vektorové priestory.

V tomto prípade je situácia výrazne jednoduchšia – vektorový priestor sa dá faktorizovať podľa ľubovoľného podpriestoru. (Pri faktorových grupách sme nemohli použiť ľubovoľnú podgrupu – fungovalo to iba pre normálne podgrupy. Podobne pri faktorových okruhoch sa nedá použiť ľubovoľný podokruh – faktorizovať sa dá podľa ideálu.)

Definícia 3.8.1. Nech $(V, +, \cdot)$ je vektorový priestor nad poľom F a S je jeho podpriestor. Triedy rozkladu grupy $(V, +)$ podľa podgrupy S budeme v tomto prípade označovať ako $\vec{\alpha} + S$ pre $\vec{\alpha} \in V$. Potom $(V/S, +)$ s operáciou $(\vec{\alpha} + S) + (\vec{\beta} + S) = (\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + S$ tvorí komutatívnu grupu. Ukážeme, že aj násobenie dané predpisom

$$c \cdot (\vec{\alpha} + S) = (c \cdot \vec{\alpha}) + S$$

pre $c \in F$ a $\vec{\alpha} \in V$ je dobre definované a V/S spolu s týmito operáciami tvorí vektorový priestor nad poľom F . Tento vektorový priestor nazývame *faktorový vektorový priestor* V podľa S .

Dôkazy faktov, ktoré sme spomínali v predchádzajúcej definícii sú pomerne jednoduché a mohli by sme ich ponechať ako cvičenie, pre úplnosť ich však aspoň naznačíme.

Dôkaz. Operácia $\cdot : F \times V/S \rightarrow V/S$ je dobre definovaná. Ak $\vec{\alpha} + S = \vec{\beta} + S$, tak $\vec{\alpha} - \vec{\beta} \in S$. Pretože S je podpriestor, platí potom aj $c(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = c\vec{\alpha} - c\vec{\beta} \in S$, čiže

$$c\vec{\alpha} + S = c\vec{\beta} + S.$$

V/S s uvedenými operáciami tvorí vektorový priestor nad F . Vieme, že V/S je komutatívna grupa.

Z ostatných podmienok vystupujúcich v definícii vektorového priestoru overme na ukážku jednu, všetky ostatné sa overia veľmi podobne.

Nech napríklad $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in V$ a $c \in F$. Potom

$$c[(\vec{\alpha} + S) + (\vec{\beta} + S)] = c[(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + S] = c(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + S = (c\vec{\alpha} + c\vec{\beta}) + S = (c\vec{\alpha} + S) + (c\vec{\beta} + S).$$

□

Príklad 3.4.3, t.j. faktorová grupa grupy $G = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +)$ podľa podgrupy $H = \{(x, x); x \in \mathbb{R}\}$ je súčasne aj príkladom faktorového vektorového priestoru (keďže G je súčasne vektorový priestor a H je jeho podpriestor).

Kapitola 4

Okruhy a polia

4.1 Okruhy (a súvisiace pojmy)

Definícia 4.1.1. Trojicu $(R, +, \cdot)$ nazývame *okruh* ak $+$ a \cdot sú binárne operácie na množine R také, že

(i) $(R, +)$ je komutatívna grupa,

(ii) operácia \cdot je asociatívna¹,

$$(\forall a, b, c \in R) \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

(iii) pre operácie $+$ a \cdot platia *distributívne zákony*

$$(\forall a, b, c \in R) \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(\forall a, b, c \in R) \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

Neutrálny prvok operácie $+$ budeme označovať 0 . Podobne ako sme to robili pre polia, inverzný prvok k prvku a vzhľadom na operáciu $+$ budeme označovať $-a$. Označenie $b - a$ bude znamenať $b + (-a)$.

Ak je navyše operácia \cdot komutatívna, t.j.

$$(\forall a, b \in R) \quad a \cdot b = b \cdot a,$$

tak $(R, +, \cdot)$ voláme *komutatívny okruh*.

Ak existuje neutrálny prvok e operácie \cdot a súčasne $e \neq 0$ (ako sme sa dohodli, 0 označuje neutrálny prvok operácie $+$), tak tento neutrálny prvok označujeme 1 a hovoríme že, že $(R, +, \cdot)$ je *(komutatívny) okruh s jednotkou*.²

Poznámka 4.1.2. Označenie pre operáciu \cdot obvykle vynechávame, čiže namiesto $a \cdot b$ častejšie budeme používať označenie ab .

¹t.j. (R, \cdot) je pologrupa

²Prípád, že neutrálny prvok oboch operácií je ten istý, ktorý sme z tejto definície vylúčili, nastane iba pre jednoprvkový okruh $\{0\}$.

Z minulého semestra vieme, že jednotka v okruhu musí byť jednoznačne určená – tvrdenie I-3.1.7.

V niektorých učebniciach sa v definícii okruhu s jednotkou nepožaduje podmienka $1 \neq 0$, potom sa však táto podmienka objaví ako jeden z predpokladov vo väčšine viet, ktoré o okruhoch s jednotkou dokazujeme, preto sme tu zvolili túto formu definície.

Takisto, keď budú uvažované binárne operácie jasné z kontextu, budeme písať stručne R namiesto $(R, +, \cdot)$.

Pri grupách sme spomínali aditívny a multiplikatívny zápis – v okruhu vždy pre operáciu $+$ používame aditívny a pre operáciu \cdot multiplikatívny zápis. Teda použitie operácie viackrát na ten istý prvok označíme ako $n \times a$ pre operáciu $+$ a a^n pre operáciu \cdot (kde $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$).

Príklad 4.1.3. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ – celé čísla s obvyklým sčítaním a násobením tvoria komutatívny okruh s jednotkou.

$(\mathbb{Z}_n, \oplus, \odot)$ – množina $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ so sčítaním modulo n tvorí komutatívny okruh s jednotkou.

Príklad 4.1.4. Príklad komutatívneho okruhu, ktorý nemá jednotku: $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

Dôkaz nasledujúcej lemy ponechávame ako cvičenie, keďže je veľmi podobný dôkazom, ktoré sme robili pre polia.

Lema 4.1.5. *Nech $(R, +, \cdot)$ je okruh, $a, b \in R$. Potom platí*

$$\begin{aligned} 0a &= a0 = 0 \\ a(-b) &= -ab = (-a)b \\ (-a)(-b) &= ab \end{aligned}$$

Príklad 4.1.6. Na množine $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definujeme operácie $+$ a \cdot ako sčítanie a násobenie po zložkách, t.j.

$$\begin{aligned} (a, b) + (a', b') &= (a + a', b + b'), \\ (a, b)(a', b') &= (aa', bb'). \end{aligned}$$

Potom $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$ je komutatívny okruh s jednotkou. (Jednotka je dvojica $(1, 1)$, nula je dvojica $(0, 0) = 0$.)

Všimnime si, že $(1, 0) \cdot (0, 1) = (0, 0)$, teda v okruhu môže byť súčin nenulových prvkov rovný nule.

Predchádzajúci príklad možno jednoducho zovšeobecniť:

Príklad 4.1.7. Ak $(R_1, +, \cdot)$ a $(R_2, +, \cdot)$ sú okruhy, tak $R_1 \times R_2$ tvorí s operáciami definovanými po zložkách

$$\begin{aligned} (a_1, a_2) + (b_1, b_2) &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2) \\ (a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) &= (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2) \end{aligned}$$

tiež okruh.

Podobne, ak pre každé $i \in M$ je $(R_i, +, \cdot)$ okruh, tak aj množina³ $\prod_{i \in M} R_i = \{f: M \rightarrow \bigcup_{i \in M} R_i \mid (\forall i \in M)(f(i) \in R_i)\}$ tvorí s operáciami definovanými po zložkách

$$\begin{aligned} (f + g)(i) &= f(i) + g(i) \\ (f \cdot g)(i) &= f(i) \cdot g(i) \end{aligned}$$

okruh.

V prípade, že všetky použité okruhy sú rovnaké, t.j. $R_i = R$ pre každé $i \in M$, budeme používať označenie R^M . Okruh R^M pozostáva zo všetkých zobrazení z M do R .

³Takto sa definuje karteziánsky súčin pre ľubovoľný (teda nie len konečný) počet množín. V prípade, že ste to nemali na žiadnom inom predmete, bude asi jednoduchšie, keď túto definíciu budete čítať tak, ako keby $R_i = R$ pre všetky $i \in M$ – pozri poznámku na konci tohoto príkladu.

Príklad 4.1.8. Dôležitý príklad okruhu tvoria matice $M_{n,n}(F)$ typu $n \times n$ nad polom F spolu s násobením matíc. To, že sčítovanie a násobenie matíc spĺňajú podmienky z definície okruhu, sme ukázali v minulom semestri. Tento okruh má jednotku, je ňou jednotková matica I . Tento okruh nie je komutatívny.

Definícia 4.1.9. Nech $(R, +, \cdot)$ je okruh a $S \subseteq R$ je neprázdna podmnožina množiny R . Hovoríme, že S je *podokruh* okruhu R , ak pre ľubovoľné $a, b \in S$ platí $a - b \in S$, $ab \in S$.

$$a, b \in S \quad \Rightarrow \quad a - b \in S, ab \in S$$

Inými slovami, podokruh je podgrupa grupy $(R, +)$, ktorá je navyše uzavretá vzhľadom na násobenie.

Pomerne jednoducho sa dá overiť, že platí

Tvrdenie 4.1.10. Nech $(R, +, \cdot)$ je okruh a $S \subseteq R$, $S \neq \emptyset$. Množina S je podokruh okruhu $(R, +, \cdot)$ práve vtedy, keď S s operáciami $+$ a \cdot zúženými na množinu S tvorí okruh.

Príklad 4.1.11. $2\mathbb{Z}$ je podokruh $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

\mathbb{N} nie je podokruh $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ (je uzavretý na násobenie a súčet, nie však na rozdiel).

Príklad 4.1.12. Uvažujme zobrazenia z uzavretého intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ do \mathbb{R} . Z matematickej analýzy vieme, že rozdiel a súčin spojitých funkcií je opäť spojitá funkcia. Vďaka tomu spojité funkcie $f: \langle 0, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ tvoria, so sčítovaním a násobením funkcií po bodoch, podokruh okruhu $\mathbb{R}^{\langle 0, 1 \rangle}$. Tento okruh označujeme $C(0, 1)$.

Definícia 4.1.13. Ak v okruhu $(R, +, \cdot)$ neexistujú prvky a, b také, že $a, b \neq 0$ a

$$ab = 0,$$

tak hovoríme, že R je *okruh bez deliteľov nuly* (alebo tiež, že R nemá delitele nuly).

Ak $(R, +, \cdot)$ je komutatívny okruh s jednotkou bez deliteľov nuly, hovoríme, že $(R, +, \cdot)$ je *obor integrity*.

Fakt, že R je okruh bez deliteľov nuly môžeme vyjadriť pomocou nasledovnej implikácie⁴

$$(\forall a, b \in R) \quad ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0.$$

Príklad okruhu, ktorý nie je oborom integrity, je okruh $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ z príkladu 4.1.6. Dokonca ľubovoľný okruh tvaru $R_1 \times R_2$ (pozri príklad 4.1.7), kde ani jeden z okruhov R_1, R_2 nie je nulový, nám dáva takýto príklad.

Ľahko sa overí, že v okruhu bez deliteľov nuly môžeme krátiť nenulovými prvkami:

Tvrdenie 4.1.14. Nech R je okruh bez deliteľov nuly a $a, b, c \in R$. Ak $a \neq 0$ a platí $ab = ac$, tak $b = c$.

Dôkaz. Z rovnosti $ab = ac$ dostaneme pomocou distributívnosti $a(b - c) = 0$. Keďže $a \neq 0$, máme $b - c = 0$, a teda $b = c$. \square

Definícia 4.1.15. Okruh R s jednotkou nazývame *telesom*, ak ku každému nenulovému prvku $a \in R \setminus \{0\}$ existuje inverzný prvok vzhľadom na násobenie, t.j.

$$(\forall a \in R \setminus \{0\})(\exists b \in R) \quad ab = ba = 1$$

Komutatívne teleso voláme *pole*.

⁴Je to negácia výroku $(\exists a, b \in \mathbb{R}) \quad ab = 0 \wedge (a \neq 0 \wedge b \neq 0)$.

Tvrdenie 4.1.16. Každé teleso je okruh bez deliteľov nuly.

Každé pole je oborom integrity.

Dôkaz. Nech R je teleso a pre $a, b \in R$ platí $ab = 0$. Predpokladajme, že $a \neq 0$. Potom existuje $c \in R$ taký, že $ca = 1$. Z toho dostaneme

$$b = 1b = cab = c0 = 0,$$

čiže $b = 0$. Podobne, z predpokladu $b \neq 0$ by sme dostali $a = 0$.

Druhá časť tvrdenia ľahko vyplýva z prvej časti. \square

Definícia 4.1.15 vlastne hovorí, že ak $(R, +, \cdot)$ je okruh a navyše $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ je grupa, ide o teleso. Ak je to komutatívna grupa, ide o pole. Táto definícia poľa je teda ekvivalentná s definíciou I-3.3.1, ktorú sme uviedli v minulom semestri. Z minulého semestra poznáme veľa príkladov polí – \mathbb{C} , \mathbb{R} , \mathbb{Q} s obvyklým sčítaním a násobením, $(\mathbb{Z}_p, \oplus, \odot)$ pre ľubovoľné prvočíslo p .

Príkladom telesa, ktoré nie je poľom (t.j. nekomutatívneho telesa) sú kvaternióny. Viac sa o nich môžete dozvedieť v [KGGs, Kapitola 4.7].

Cvičenia

Úloha 4.1.1. Zistite (a svoje tvrdenie zdôvodnite) ktoré z uvedených vlastností sa z okruhu R prenesú na uvedené konštrukcie: ⁵

	$R \times R$	R/I	R^M	podokruh
pole				
obor integrity				
nemá delitele nuly				
má delitele nuly				
komutatívny okruh				
okruh s jednotkou				

Úloha 4.1.2. Je každý podokruh poľa okruh bez deliteľov nuly? Je každý podokruh poľa obsahujúci 1 oborom integrity?

Úloha 4.1.3. Zistite, či nasledujúce množiny tvoria podokruhy poľa $(\mathbb{C}, +, \cdot)$. Zistite, ktoré z nich sú navyše poľami.

a) $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Z}\}$

b) $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Q}\}$

Úloha 4.1.4. Zistite, či nasledujúce množiny tvoria podokruhy poľa $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$. Sú niektoré z nich poľa?

a) Všetky zlomky také, že v základnom tvare je menovateľ nepárne číslo.

b) Všetky zlomky také, že v základnom tvare je menovateľ párne číslo.

c) Všetky zlomky také, že v základnom tvare je čitateľ nepárne číslo.

d) Všetky zlomky také, že v základnom tvare je čitateľ párne číslo.

e) Všetky druhé mocniny racionálnych čísel.

⁵Označenie R/I označuje faktorový okruh okruhu R podľa ideálu I . O faktorových okruhoch sa dozviete v nasledujúcej podkapitole, čiže tento stĺpec zatiaľ nechajte nevyplnený a vráťte sa k nemu neskôr.

Úloha 4.1.5. Dokážte: Ak R je obor integrity a $x^2 = 1$, tak $x = 1$ alebo $x = -1$.

Platí takéto tvrdenie aj za predpokladu, že R je komutatívny okruh s jednotkou? (T.j. ak vynecháme predpoklad, že R nemá delitele nuly.)

Úloha 4.1.6. Ak R je okruh bez deliteľov nuly a $ab = 1$, tak aj $ba = 1$.

Úloha 4.1.7. Nech $(R, +, \cdot)$ je okruh. Definujme binárnu operáciu $*$ ako $a*b = b \cdot a$. Dokážte, že aj $(R, +, *)$ je okruh.

Úloha 4.1.8. Dokážte, že $\{(r, r); r \in R\}$ je podokruh okruhu $R \times R$. Je tento podokruh izomorfný s okruhom R ?

Úloha 4.1.9. Zistite, či S je podokruhom R , a tiež či v okruhoch S a R existuje jednotka (a ak áno, tak či je v oboch prípadoch rovnaká).

a) $R = \mathbb{Z}_6$, $S = 2\mathbb{Z}_3 = \{0, 2, 4\}$.

b) $R = A \times A$ a $S = A \times \{0\}$, kde A je ľubovoľný okruh s jednotkou.

c) $R = M_{2,2}(\mathbb{R})$, t.j. reálne matice rozmerov 2×2 a $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; a \in \mathbb{R} \right\}$.

Úloha 4.1.10. Nech R je okruh. Centrom okruhu R nazveme množinu $Z = \{z \in R; (\forall r \in R) zr = rz\}$. Ukážte, že:

a) Z je podokruh R .

b) Ak R má jednotku, tak $1 \in Z$.

c) Centrum telesa je pole.

Úloha 4.1.11*. Nech $(R, +, \cdot)$ je okruh s jednotkou. Ak existuje inverzný prvok vzhľadom na operáciu \cdot k $1 - ab$, tak existuje aj inverzný prvok k $1 - ba$.

4.2 Homomorfizmy, ideály a faktorové okruhy

Definícia 4.2.1. Nech $(R, +, \cdot)$, $(S, +, \cdot)$ sú okruhy. Zobrazenie $f: R \rightarrow S$ nazývame *homomorfizmus*, ak platí

$$f(a + b) = f(a) + f(b),$$

$$f(ab) = f(a)f(b).$$

Surjektívny homomorfizmus nazývame *epimorfizmus*, injektívny homomorfizmus nazývame *monomorfizmus* a bijektívny homomorfizmus nazývame *izomorfizmus*. Ak existuje izomorfizmus medzi $(R, +, \cdot)$ a $(S, +, \cdot)$, hovoríme, že okruhy R a S sú izomorfné a píšeme $R \cong S$.

Pretože oba tieto pojmy používame aj pre grupy, občas sa vyskytne situácia, že budeme potrebovať rozlíšiť, či hovoríme o homomorfizme (izomorfizme) grúp alebo okruhov. V takomto prípade použijeme termín *grupový homomorfizmus (izomorfizmus)* alebo *okruhový homomorfizmus (izomorfizmus)*.

Dôkaz nasledujúceho tvrdenia vynechávame – je skoro identický s dôkazom analogického tvrdenia pre grupy.

Tvrdenie 4.2.2. *Zloženie homomorfizmov je homomorfizmus. Zloženie izomorfizmov je izomorfizmus.*

Príklad 4.2.3. Jednoduché príklady homomorfizmov:

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, f: k \mapsto k \bmod n$$

$$g: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, g: (a, b) \mapsto a$$

$$h: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, h: a + bi \mapsto a - bi$$

Opäť, podobne ako pri grupách, existencia izomorfizmu medzi dvoma okruhmi znamená, že tieto okruhy sú z hľadiska teórie okruhov rovnaké – nie sú rozlíšiteľné pomocou pojmov definovaných pre ľubovoľné okruhy. (Obe operácie pracujú rovnako, len prvky sú inak pomenované a izomorfizmus je bijektívne zobrazenie, ktoré poskytuje „slovník“ na preklad medzi týmito dvoma pomenovaniami.)

Túto myšlienku je možné použiť aj keď chceme ukázať, že nejaká množina s danými binárnymi operáciami tvorí okruh – nájdeme bijekciu medzi touto množinou a nejakým známym okruhom, ktorá zachováva operácie.

Príklad 4.2.4. Uvažujme podmnožinu S okruhu $M_{2,2}(\mathbb{R})$ tvorenú maticami tvaru

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},$$

kde $a, b \in \mathbb{R}$.

Overme najprv, že ide o podokruh. Zrejme rozdiel 2 matíc takéhoto tvaru má opäť uvedený tvar. Pre súčin máme

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix}, \quad (4.1)$$

čiže súčin matíc z S opäť patrí do S .

Definujme teraz zobrazenie $f: S \rightarrow \mathbb{C}$ predpisom

$$f: \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mapsto a + bi.$$

Z rovnosti (4.1) vidíme, že pre $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \in S$ máme

$$f(AB) = (ac - bd) + (ad + bc)i = (a + bi)(c + di) = f(A)f(B).$$

Overenie, že f zachováva súčty je jednoduché, takže ide o okruhový homomorfizmus.

Navyše, f je bijekcia, je to teda izomorfizmus medzi okruhom A a polom komplexných čísel.

Toto zobrazenie by sme mohli použiť napríklad na dôkaz, že komplexné čísla tvoria okruh; alebo tiež na dôkaz, že A je podokruh (ak by sme už mali dokázané, že \mathbb{C} je okruh; t.j. stačilo by nám overiť, že sa zachovávajú operácie). Vďaka tomu, že sme našli izomorfizmus medzi uvedenými dvoma okruhmi, hneď vieme, že A je pole – aj bez toho, že by sme to museli overovať priamym výpočtom.

Môžeme si položiť otázku, či sa na túto maticovú reprezentáciu komplexných čísel dá prísť aj nejakým priamočiarym spôsobom, bez toho, aby nám ho niekto povedal, alebo aby sme ho „uhádli“.

Skúsme sa, pre dané komplexné číslo $z = a + bi$ pozrieť na zobrazenie $f_z: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f_z: x \mapsto zx$ (toto je presne zobrazenie, ktoré sme priradili komplexnému číslu v Cayleyho vete 2.6.8, pozri tiež príklad 2.6.11). Ak komplexné číslo z vyjadríme v goniometrickom tvare ako $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ tak z Moivreovej vety vieme, že násobenie číslom z znamená otočenie bodu (komplexné čísla chápeme ako body v rovine) okolo bodu 0 o uhol φ a potom jeho r -násobné zväčšenie.

Obidve tieto zobrazenia – otočenie aj natiahnutie – sú lineárne zobrazenia. Skúsme sa pozrieť na maticu takéhoto zobrazenia – nato stačí vedieť kam sa zobrazia vektory $(1, 0)$ a $(0, 1)$.

Vektor $(1, 0)$ sa zobrazí otočením o uhol φ na $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ a vektor $(1, 0)$ na $(-\sin \varphi, \cos \varphi)$. To znamená, že otočeniu zodpovedá matica

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Ak ešte použijeme natiahnutie s koeficientom r , dostaneme maticu

$$\begin{pmatrix} r \cos \varphi & r \sin \varphi \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

čiže presne tú, ktorú sme použili v našom izomorfizme.

Príklad 4.2.5. Uvažujme lineárne zobrazenia z F^n do F^n . Označme množinu všetkých takýchto zobrazení A . Ukážeme, že $(A, +, \circ)$ je okruh s jednotkou ($+$ znamená obvyklé sčítanie funkcií a \circ) je skladanie funkcií.

Namiesto toho, aby sme priamo overovali definíciu okruhu, uvažujme zobrazenie $f: A \rightarrow M_{n,n}(F)$, ktoré každému zobrazeniu priradí jeho maticu. Toto zobrazenie je bijektívne a navyše, keď ho berieme ako zobrazenie medzi $(A, +, \circ)$ a okruhom $(M_{n,n}(F), +, \cdot)$ rešpektuje binárne operácie (matica súčtu zobrazení je súčet matíc, matica súčinu zobrazení je súčin matíc). Keďže už vieme, že matice typu $n \times n$ tvoria okruh, vyplýva z toho, že aj $(A, +, \circ)$ je okruh. (Samozrejme, nie je ťažké overiť vlastnosti okruhu aj priamo, bez toho, aby sme si pomáhali maticami.)

Môžeme si ešte všimnúť, že podobné tvrdenie už neplatí, ak vezmeme ľubovoľné zobrazenia (t.j. nielen lineárne). Napríklad pre $F^n = \mathbb{R}^1$ a zobrazenia $f(x) = x^2$, $g(x) = x$, $h(x) = 1$ máme $f(g(x) + h(x)) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$, zatiaľčo $f(g(x)) + f(h(x)) = x^2 + 1$, čiže

$$f \circ (g + h) \neq f \circ g + f \circ h.$$

Lahko sa dá ukázať, že jadro a obraz homomorfizmu musia byť podokruhy. Pri grupách sme videli, že nie každá podgrupa danej grupy môže byť jadrom nejakého homomorfizmu – túto vlastnosť mali len invariantné podgrupy. V prípade okruhov je zodpovedajúcim pojmom pojem ideálu.

Definícia 4.2.6. Nech R je okruh. Neprázdna podmnožina $I \subseteq R$ je *ideál* v okruhu R , ak platí

$$\begin{aligned} (\forall a, b \in I) \quad & a - b \in I \\ (\forall a \in I)(\forall r \in R) \quad & ar \in I, ra \in I \end{aligned}$$

t.j. ak je táto množina uzavretá vzhľadom na sčítanie (prvkov z I) a násobenie ľubovoľným prvkom z R .

Inak povedané, ideál je taký podokruh, ktorý je uzavretý vzhľadom na násobenie všetkými prvkami z R .

Príklad 4.2.7. V každom okruhu máme ideály $\{0\}$ a R . Ideály I také, že $I \neq R$ voláme *vlastné*.

Pre ľubovoľné $k \in \mathbb{Z}$ je podmnožina $k\mathbb{Z} = \{kz; z \in \mathbb{Z}\}$ ideálom v okruhu $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

V okruhu $R_1 \times R_2$ tvoria podmnožiny $R_1 \times \{0\}$ aj $\{0\} \times R_2$ ideály.

Príkladom podokruhu, ktorý nie je ideálom, je napríklad \mathbb{Z} v $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

Často sa budú vyskytovať ideály určené jediným prvkom.

Definícia 4.2.8. Ak R je komutatívny okruh a $a \in R$, tak množina

$$(a) = \{ax; x \in R\}$$

je ideálom v R (úloha 4.2.4). Ideály takéhoto tvaru voláme *hlavné ideály*.

Nasledujúce pozorovanie je veľmi jednoduché, sformulujeme ho však do lemy, aby sme sa naň neskôr mohli odkazovať.

Lema 4.2.9. *Nech R je okruh s jednotkou a I je ideál v R . Potom $I = R$ práve vtedy, keď $1 \in I$.*

Dôkaz. Implikácia \Rightarrow je úplne triviálna. Na dôkaz opačnej implikácie si stačí všimnúť, že pre ľubovoľné $c \in R$ máme

$$c = c.1$$

a ak $1 \in I$, tak aj $c.1$ patrí do ideálu I . □

Dôsledok 4.2.10. *Ak R je pole, tak jediné ideály v R sú $\{0\}$ a R .*

Dôkaz. Ak ideál I obsahuje prvok $a \neq 0$, tak k prvku a existuje inverzný prvok b , t.j. taký prvok, že $ba = 1$. Potom ale priamo z definície ideálu vyplýva, že aj $1 = ba \in I$, a teda $I = R$. □

Prvý krok na ceste k tomu, aby sme ukázali, že ideály majú pre okruhy podobnú úlohu ako normálne podgrupy pre grupy, je nasledujúca lema.

Lema 4.2.11. *Ak $\varphi: R \rightarrow S$ je homomorfizmus okruhov, tak jeho jadro $\text{Ker } \varphi$ je ideál v R .*

Dôkaz. Ak $a \in \text{Ker } \varphi$, znamená to, že $\varphi(a) = 0$. Potom pre ľubovoľné $x \in R$ máme

$$\begin{aligned}\varphi(ax) &= \varphi(a)\varphi(x) = 0\varphi(x) = 0 \\ \varphi(xa) &= \varphi(x)\varphi(a) = \varphi(x)0 = 0\end{aligned}$$

čiže aj $ax, xa \in \text{Ker } \varphi$. □

Podobne ako pri grupách sme pre invariantné podgrupy boli schopní zdefinovať faktorovú grupu aj v tomto prípade vieme definovať faktorový okruh.

Ak na chvíľu zabudneme na operáciu \cdot , tak máme komutatívnu grupu $(R, +)$ a I je jej podgrupa. Pretože každá podgrupa komutatívnej podgrupy je normálna, máme potom faktorovú grupu $(R/I, +)$. Dôkaz nasledujúcej vety v podstate spočíva v overení, že sa dá pridať operácia \cdot a že tak dostaneme okruh. Overenie týchto podmienok je vlastne jednoduchým mechanickým výpočtom, pričom používame iba definíciu ideálu a podmienku

$$a + I = b + I \quad \Leftrightarrow \quad a - b \in I,$$

ktorú poznáme z lemy 3.2.5. Takisto v ďalších výsledkoch o faktorových okruhoch sa budeme často odvolávať na to, čo už vieme o faktorových grupách; potom zostane overiť niektoré vlastnosti operácie \cdot .

Veta 4.2.12. *Nech $(R, +, \cdot)$ je ľubovoľný okruh a I je ideál v R . Ak na prvkoch faktorovej⁶ grupy $(R, +)$ podľa podgrupy I*

$$R/I = \{a + I; a \in R\}$$

⁶Grupa $(R, +)$ je komutatívna, takže jej podgrupa I je invariantná. Má teda zmysel hovoriť o faktorovej grupe.

definujeme binárnu operáciu \cdot ako

$$(a + I) \cdot (b + I) = (a \cdot b) + I,$$

tak je táto binárna operácia dobre definovaná a $(R/I, +, \cdot)$ je okruh. Tento okruh voláme faktorový okruh R podľa I .

Ak je okruh R komutatívny, tak aj R/I je komutatívny. Ak R je okruh s jednotkou a $I \neq R$, tak $1 + I$ je jednotka faktorového okruhu R/I .

Dôkaz. Najprv ukážeme, že uvedená operácia je dobre definovaná. T.j. potrebujeme dokázať, že ak $a + I = a' + I$ a $b + I = b' + I$, tak aj $ab + I = a'b' + I$. Rovnosť $a + I = a' + I$ je však ekvivalentná s tým, že $a - a' \in I$ (lema 3.2.5), podobne druhú podmienku môžeme nahradiť podmienkou $b - b' \in I$.

Ak $a - a' \in I$, $b - b' \in I$, tak $ab - a'b' = a(b - b') + (a - a')b' \in I$. (Máme $a(b - b') \in I$, lebo $b - b' \in I$, podobne $(a - a')b' \in I$ lebo $a - a' \in I$, uvedený prvok je teda súčet dvoch prvkov z I .) Z $ab - a'b' \in I$ už vyplýva, že $ab + I = a'b' + I$.

Keď už vieme, že uvedený predpis definuje binárnu operáciu na R/I , zostáva overiť podmienky z definície okruhu. Vieme, že $(R/I, +)$ je grupa, navyše je aj komutatívna (lebo grupa R je komutatívna). Zostáva overiť asociatívnosť a distributívnosť. Máme

$$\begin{aligned} (a + I)((b + I)(c + I)) &= a(bc) + I = (ab)c + I = ((a + I)(b + I))(c + I) \\ (a + I)((b + I) + (c + I)) &= a(b + c) + I = (ab + ac) + I = (ab + I) + (ac + I) \\ ((b + c) + I)(a + I) &= (b + c)a + I = (ba + ca) + I = (ba + I) + (ca + I) \end{aligned}$$

Úplne rovnako sa dokáže komutatívnosť R/I v prípade, že R je komutatívny a takisto, že $1 + I$ je neutrálny prvok operácie \cdot . Podmienka $I \neq R$ zabezpečí, že $1 = 1 - 0 \notin I$, t.j. $1 + I \neq 0 + I$ (v okruhu s jednotkou požadujeme aj aby $1 \neq 0$). \square

Aj pre faktorové okruhy platí veta o izomorfizme.

Veta 4.2.13 (Veta o izomorfizme). *Ak $f: R \rightarrow R'$ je homomorfizmus okruhov, tak $\text{Ker } f$ je ideál v okruhu R a faktorový okruh $R/\text{Ker } f$ je izomorfný s podokruhom $\text{Im } f$ okruhu R' .*

Dôkaz. Z lemy 4.2.11 vieme, že $\text{Ker } f$ je ideál.

Označme $I = \text{Ker } f$. Pretože $(R, +)$ je komutatívna grupa, jej podgrupa I je invariantná podgrupa. Potom (podľa vety o izomorfizme pre grupy) je zobrazenie $\varphi: R/I \rightarrow R'$ určené predpisom

$$\varphi: a + I \mapsto f(a)$$

dobre definované a je to injektívny grupový homomorfizmus. Zostáva teda len dokázať, že je to aj okruhový homomorfizmus, t.j. že zachováva aj operáciu \cdot . To však ľahko vyplýva z toho, že f je okruhový homomorfizmus:

$$\varphi(ab + I) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(a + I)\varphi(b + I).$$

\square

Postupom z predchádzajúceho dôkazu sa dá ukázať, že pre každý ideál I je zobrazenie $\varphi: R \rightarrow R/I$ určené predpisom

$$\varphi: a \mapsto a + I$$

okruhový homomorfizmus. Toto zobrazenie voláme *kanonický homomorfizmus*. Pre kanonický homomorfizmus platí $I = \text{Ker } \varphi$.

Videli sme, že faktorový okruh komutatívneho okruhu je opäť komutatívny okruh a (s výnimkou prípadu $I = R$) dostaneme aj z okruhu s jednotkou znovu okruh s jednotkou. Otázka, či sa na faktorový okruh preniesie aj vlastnosť „byť oborom integrity“ alebo „byť poľom“ je o čosi komplikovanejšia.

Definícia 4.2.14. Ideál I v okruhu R sa nazýva prvoideál, ak pre ľubovoľné $a, b \in R$ také, že $a \cdot b \in I$ aspoň jeden z prvkov a, b patrí do I čiže ak platí

$$a \cdot b \in I \quad \Rightarrow \quad a \in I \vee b \in I.$$

Môžeme si všimnúť, že $\{0\}$ je prvoideál v R práve vtedy, keď R nemá delitele nuly.

Príklad 4.2.15. Pozrime sa na ideály v okruhu $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Nie je príliš ťažké ukázať, že každý ideál v \mathbb{Z} je hlavný – nebudeme sa tomu venovať na tomto mieste, lebo neskôr ukážeme všeobecnejší výsledok v tvrdení 4.4.16.

Otázka teda je, ktoré hlavné ideály v \mathbb{Z} sú prvoideály.

Chceme sa pozrieť na ideál (p) pre nejaké celé číslo $p \neq 0$. Pýtame sa teda na to, kedy platí

$$ab \in (p) \Rightarrow a \in (p) \vee b \in (p).$$

Ideál p obsahuje presne násobky čísla p . Teda sa vlastne pýtame na platnosť podmienky

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \vee p \mid b.$$

Vieme, že táto podmienka je splnená pre všetky prvočísla. Keď pracujeme v celých číslach, musíme pridať aj opačné čísla.

Naopak, pre zložené čísla táto podmienka neplatí. Ak $p = ab$ pre nejaké čísla $a, b \neq \pm 1$, tak máme $ab \in (p)$ ale a ani b do (p) nepatria.

Vidíme teda, že (p) je prvoideál v \mathbb{Z} práve vtedy, keď $\pm p$ je prvočíslo (alebo 0).

Veta 4.2.16. *Nech R je komutatívny okruh s jednotkou a I je ideál v R . Potom faktorový okruh R/I je oborom integrity práve vtedy, keď I je vlastný prvoideál.*

Dôkaz. \Rightarrow Nech R/I je obor integrity. Z toho hneď vyplýva $1 + I \neq 0 + I$, a teda ideál I je vlastný. Využijeme fakt, že $I = \text{Ker } \varphi$ pre kanonický homomorfizmus $\varphi: R \rightarrow R/I$; $\varphi(a) = a + I$. Z toho vyplýva, že ak $ab \in I$, tak

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0.$$

Pretože R/I je obor integrity, z predchádzajúcej rovnosti vyplýva, že $\varphi(a) = 0$ alebo $\varphi(b) = 0$, čiže $a \in I = \text{Ker } \varphi$ alebo $b \in I = \text{Ker } \varphi$.

\Leftarrow Podobne ako v prvej časti využijeme surjektívny homomorfizmus $\varphi: R \rightarrow R/I$; $\varphi(a) = a + I$. Ak $x, y \in R/I$ sú také, že $xy = 0$ a $x = \varphi(a)$, $y = \varphi(b)$ (zo surjektívnosti vyplýva, že také $a, b \in R$ existujú) tak máme

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = xy = 0,$$

čiže $ab \in \text{Ker } \varphi = I$. Pretože I je prvoideál, tak z toho vyplýva $a \in I = \text{Ker } \varphi$ alebo $b \in I = \text{Ker } \varphi$, čo však znamená, že

$$x = \varphi(a) = 0 \quad \vee \quad y = \varphi(b) = 0.$$

□

Príklad 4.2.17. Ako ilustráciu predchádzajúcej vety si môžeme všimnúť, že $\mathbb{Z}/(3) \cong \mathbb{Z}_3$ je pole, a teda aj obor integrity. Vcelku ľahko skontrolujeme, že (3) je maximálny ideál v \mathbb{Z} . (V skutočnosti môžeme číslo 3 nahradiť ľubovoľným prvočísлом.)

Ale napríklad $\mathbb{Z}/(4) \cong \mathbb{Z}_4$ nie je obor integrity (a (4) nie je prvoideál v \mathbb{Z}).

Definícia 4.2.18. Ideál I v okruhu R nazývame *maximálny*, ak $I \neq R$ a súčasne pre každý ideál J s vlastnosťou $I \subseteq J \subseteq R$ platí $I = J$ alebo $J = R$.

Predchádzajúca definícia vlastne hovorí, že maximálne ideály sú práve maximálne prvky množiny vlastných ideálov okruhu R vzhľadom na usporiadanie \subseteq .

Poznámka 4.2.19. Bez dôkazu⁷ spomeňme, že pre každý ideál I taký, že $I \neq R$ existuje maximálny ideál M obsahujúci I , t.j. $I \subseteq M$.

Veta 4.2.20. *Nech R je komutatívny okruh s jednotkou a I je ideál v R . Potom faktorový okruh R/I je pole práve vtedy, keď I je maximálny ideál.*

Dôkaz. \Rightarrow Predpokladajme, že R/I je pole. Potom musí platiť $0 + I \neq 1 + I$, čiže $1 \notin I$ a I je vlastný ideál.

Ďalej nech $I \subseteq J \subseteq R$. Predpokladajme, že $I \neq J$, teda existuje prvok $a \in J$ taký, že $a \notin I$. Potom $a + I \neq 0 + I$, čiže k $a + I$ existuje v poli R/I inverzný prvok. To znamená, že existuje $c \in R$ také, že

$$(ac) + I = 1 + I,$$

čiže $1 - ac \in I \subseteq J$. Potom z toho, že $ac \in J$ (lebo $a \in J$) a $1 - ac \in J$ vyplýva $1 \in J$ a $J = R$ (lema 4.2.9).

\Leftarrow Nech I je maximálny ideál. Ak $a \notin I$ (čiže $a + I \neq 0 + I$), chceme ukázať, že k $a + I$ existuje v R/I inverzný prvok. Definujme

$$J = \{j + ca; j \in I, c \in R\}.$$

Overme najprv, že J je ideál. Skutočne, $(j + ca) - (j' + c'a) = (j - j') + (c - c')a$ a $j - j' \in I$, $c - c' \in R$ pre $j, j' \in J$, $c, c' \in R$. Ďalej $(j + ca)r = jr + car = jr + (cr)a$ a z $jr \in I$ dostávame, že $(j + ca)r \in I$ pre ľubovoľné $r \in R$.

Navyše, pre ideál J platí $I \subsetneq J \subseteq R$. Pretože I je maximálny ideál, máme potom $J = R$, a teda $1 \in J$. To znamená, že existujú $c \in R$, $j \in I$ také, že $j + ca = 1$. Potom máme

$$\begin{aligned} ca - 1 &\in I, \\ ca + I &= 1 + I, \end{aligned}$$

čiže $c + I$ je inverzný prvok vzhľadom na násobenie k $a + I$ v okruhu R/I . \square

Pretože každé pole je oborom integrity, dokázali sme súčasne:

Dôsledok 4.2.21. *V komutatívnom okruhu s jednotkou je každý maximálny ideál prvoideál.*

Príklad 4.2.22. Je prirodzené sa pýtať, či implikáciu v dôsledku 4.2.21 nie je možné obrátiť, teda či vieme nájsť príklad prvoideálu (v nejakom komutatívnom okruhu s jednotkou), ktorý nie je maximálny.

Z viet, ktoré sme práve ukázali a z toho, že $R/(0) \cong R$ ľahko vidno, že ak R je obor integrity, ktorý nie je polom, tak (0) je prvoideál, ktorý nie je maximálny.

⁷Dôkaz vynechávame z toho dôvodu, že sa nedá urobiť pomocou vecí, ktoré ste sa zatiaľ učili. Obvyklý dôkaz je založený na Zornovej leme (resp. Axióme výberu). V prípade záujmu môžete dôkaz nájsť napríklad v [S1].

Teda napríklad ideál (0) v okruhu $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ je prvoideál, ktorý nie je maximálny. Lahko to vidno aj priamo, bez odvolávania sa na predošlé vety. To, že ide o prvoideál, vidno z platnosti implikácie $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$ v okruhu \mathbb{Z} . Nie je maximálny, lebo napríklad $(0) \subsetneq (2) \subsetneq \mathbb{Z}$.

O trochu menej triviálny (aj keď veľmi podobný) príklad máte v úlohe 4.2.20.

V tvrdení 4.4.19 budeme vidieť, že okruhu \mathbb{Z} by sme už nijaký iný kontrapríklad ako (0) nájsť nemohli.

Opäť, podobne ako v prípade grúp a normálnych podgrúp, zodpovedajú ideály kongruenciám na okruhu R (pozri úlohy 4.2.25, 4.2.26).

Definícia 4.2.23. Nech $(R, +, \cdot)$ je okruh. Relácia ekvivalencie E na R sa nazýva *kongruencia*, ak platí

$$aEa', bEb' \quad \Rightarrow \quad (a+b)E(a'+b'), (ab)E(a'b')$$

Aj tu by sa dali zopakovať všetky tvrdenia z časti 3.6 – v podstate bezo zmeny, len by sme všade nahradili výraz „normálna podgrupa“ výrazom ideál a výraz „faktorová grupa“ výrazom „faktorový okruh“. (A pracovali by sme s okruhovými kongruenciami namiesto grupových kongruencií.)

Aspoň niečo je sformulované v cvičeniach (úlohy 4.2.25 a 4.2.26). Dá sa však predpokladať, že čitateľ, ktorý dostatočne porozumel faktorizácii pri grupách bude schopný si zobrať všetky tvrdenia o grupových kongruenciách a samostatne si rozmyslieť, ako vyzerajú analogické tvrdenia pre okruhovú kongruenciu a ako by sa dali dokázať.

Cvičenia

Úloha 4.2.1. Nech $X \neq \emptyset$ je ľubovoľná neprázdna množina. Dokážte, že potenčná množina $(P(X), \Delta, \cap)$ s operáciami Δ (symetrická diferencia množín) a \cap (priemik množín) tvorí okruh. Nájdite izomorfizmus medzi týmto okruhom a okruhom \mathbb{Z}_2^X . (Poznámka: Bijekcia, ktorú nájdete v druhej časti, by sa dala použiť aj na dôkaz tvrdenia uvedeného v prvej časti.)

Úloha 4.2.2. Nech F je pole a $A \neq \emptyset$ je neprázdna množina. Dokážte, že v okruhu F^A (príklad 4.1.7) je každý ideál tvaru $M_p = \{f \in F^A; f(p) = 0\}$, kde p je nejaký prvok z A , maximálny. (Hint: Dá sa využiť veta 4.2.20. Ale dá sa postupovať aj priamo z definície.)

Úloha 4.2.3. Priemik ľubovoľného systému podokruhov je podokruh. Priemik ľubovoľného systému ideálov je ideál.

Úloha 4.2.4. Overte, že $(a) = \{ax; x \in R\}$ je ideál v komutatívnom okruhu R (teda hlavné ideály sú skutočne ideály.)

Úloha 4.2.5. Dokážte, že zobrazenie $f_1: R_1 \times R_2 \rightarrow R_1$ určené predpisom $f_1(r_1, r_2) = r_1$ je homomorfizmus.

Dokážte, že pre každé $i \in I$ je zobrazenie $f_i: R^I \rightarrow R$ dané predpisom $f_i(g) = g(i)$ (pre ľubovoľné $g: I \rightarrow R$) je homomorfizmus.

Úloha 4.2.6. Nech $R \neq \{0\}$ je komutatívny okruh s jednotkou taký, že jediné ideály v R sú $\{0\}$ a R . Dokážte, že R je pole.

Úloha 4.2.7. Ak I_1 je ideál v okruhu R_1 a I_2 je ideál v okruhu R_2 , tak podmnožina $I_1 \times I_2$ je ideál v okruhu $R_1 \times R_2$.

Úloha 4.2.8. Ak I_1, I_2 sú ideály v komutatívnom okruhu $(R, +, \cdot)$, tak aj

a) $I_1 + I_2 = \{a + b; a \in I_1, b \in I_2\}$ je ideál v R .

b) $I_1 \cdot I_2 = \{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n; n \in \mathbb{N}, a_i \in I_1, b_i \in I_2\}$ je ideál v R .

Úloha 4.2.9. Nech $(G, *)$ je cyklická grupa, a je jej generátor, t.j. $G = [a]$. Ak definujeme operáciu \cdot ako $a^k \cdot a^l = a^{k \cdot l}$ (pre ľubovoľné $k, l \in \mathbb{Z}$), tak $(G, *, \cdot)$ je okruh. Viete povedať (v závislosti od rádu generátora a) s akým okruhom je tento okruh izomorfný?

Úloha 4.2.10. Ak pre každé $n \in \mathbb{N}$ je I_n ideál v okruhu R a navyše platí $I_n \subseteq I_{n+1}$, tak aj zjednotenie $\bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$ je ideál v R .

Úloha 4.2.11. Okruh R sa volá boolovský okruh, ak pre každé $a \in R$ platí $a^2 = a$. Dokážte, že každý boolovský okruh je komutatívny. (Boolovským okruhom je napríklad okruh z úlohy 4.2.1.)

Úloha 4.2.12. Dokážte, že okruhy $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ a $(3\mathbb{Z}, +, \cdot)$ nie sú izomorfné.

Úloha 4.2.13. Nájdite všetky homomorfné obrazy okruhu \mathbb{Z} .

Úloha 4.2.14. Nájdite všetky homomorfizmy zo \mathbb{Z} do \mathbb{Z}_{30} .

Úloha 4.2.15. Nájdite všetky homomorfizmy:

a) zo $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ do $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$,

b) z $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ do $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

(Tieto okruhy sú definované v úlohe 4.1.3.)

Úloha 4.2.16. Nájdite všetky homomorfizmy $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Úloha 4.2.17. Zistite, ktoré z nasledujúcich zobrazení sú homomorfizmy medzi okruhom A všetkých matíc typu 2×2 s celočíselnými koeficientami a okruhom \mathbb{Z} .

a) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto a$

b) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto a + d$ (stopa matice)

c) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto ad - bc$ (determinant matice)

Úloha 4.2.18. Zistite, či tieto množiny tvoria ideály v okruhu $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

a) $\{(a, a); a \in \mathbb{Z}\}$

b) $\{(2a, 2b); a, b \in \mathbb{Z}\}$

c) $\{(2a, 0); a \in \mathbb{Z}\}$

d) $\{(a, -a); a \in \mathbb{Z}\}$

Úloha 4.2.19. Zistite, s akými okruhmi sú izomorfné okruhy $\mathbb{Z}_{60}/(15)$, $\mathbb{Z}_{60}/(20)$, $\mathbb{Z}_{60}/(12)$.

Úloha 4.2.20. Ukážte, že $\mathbb{Z} \times \{0\}$ je ideál v okruhu $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (s obvyklým sčítaním a násobením). Ukážte, že je to prvoideál, ktorý nie je maximálny.

Úloha 4.2.21. Zistite, či dané ideály v okruhu $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi; a, b \in \mathbb{Z}\}$ sú maximálne ideály/prvoideály.

a) $(1 + i) = \{(1 + i)z; z \in \mathbb{Z}[i]\}$

b) $(2) = \{2z; z \in \mathbb{Z}[i]\}$

c*) $(2 + i) = \{(2 + i)z; z \in \mathbb{Z}[i]\}$

Úloha 4.2.22. Nech R je komutatívny okruh s jednotkou. Dokážte, že v ňom platí binomická veta

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times a^k b^{n-k}.$$

Úloha 4.2.23*. a) Dokážte, že v okruhu $C(0, 1)$ (príklad 4.1.12) je každý ideál tvaru $M_p = \{f \in C(0, 1); f(p) = 0\}$ pre $p \in \langle 0, 1 \rangle$ maximálny.

b) Dokážte, že všetky maximálne ideály v $C(0, 1)$ majú takýto tvar.

Úloha 4.2.24. Nájdite príklad takých okruhov $(R, +, \cdot)$, $(S, +, \cdot)$ a zobrazenie $f: R \rightarrow S$, že f je grupový homomorfizmus (medzi grupami $(R, +)$ a $(S, +)$), ale nie je to okruhový homomorfizmus.

Úloha 4.2.25⁺. Nech R je okruh, I je ideál v R . Definujeme reláciu E na R ako $aEb \Leftrightarrow a - b \in I$. Dokážte, že E je (okruhová) kongruencia (definícia 4.2.23).

Obrátene ak E je ľubovoľná kongruencia na R , tak trieda ekvivalencie $[0]_E$ je ideál v R .

Úloha 4.2.26⁺. Nech $(R, +, \cdot)$ je okruh.

a) Ak $f: R \rightarrow S$ je homomorfizmus, tak relácia E na množine R daná predpisom $xEy \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ je kongruencia (pozri úlohu 3.1.3).

b) Ak E je kongruencia na R , tak na množine R/E tried ekvivalencie tejto relácie predpis $[a] + [b] = [a + b]$, $[a] \cdot [b] = [ab]$ dobre definuje binárne operácie $+$, \cdot a R/E s týmito binárnymi operáciami tvorí grupu. Navyše, zobrazenie $a \mapsto [a]$ je surjektívny homomorfizmus z R do R/E a jeho jadro je $[0]$.

4.3 Okruhy polynómov – definícia a delenie so zvyškom

Na strednej škole ste strávili veľa času s kvadratickými rovnicami $ax^2 + bx + c = 0$. Venovali ste sa aj všeobecnejším rovnicam vyššieho stupňa. Tieto rovnice súvisia s funkciami $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tvaru

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0.$$

Takéto funkcie budeme volať polynomicke funkcie.

V tejto časti by sme chceli zaviesť podobný pojem pre ľubovoľný komutatívny okruh s jednotkou. V minulom semestri sme pracovali s polynomickými funkciami nad \mathbb{R} ako s prvkami vektorového priestoru $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ všetkých zobrazení z \mathbb{R} do \mathbb{R} . Vtedy sme často používali fakt, že polynomicke funkcia $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ sa rovná nulovej funkcii (t.j. v každom bode nadobúda hodnotu 0) práve vtedy, keď všetky koeficienty sú nulové, t.j.

$$a_n = a_{n-1} = \dots = a_0 = 0.$$

(Ako uvidíme, táto vlastnosť neplatí pre všetky polia, v prípade poľa \mathbb{R} však platí, ukážeme to v tvrdení 4.3.13.)

Práve toto je vlastnosť, ktorú budeme požadovať od pojmu polynómu, ktorý teraz ideme definovať.

4.3.1 Definícia okruhu polynómov

Definícia 4.3.1. Nech R je komutatívny okruh s jednotkou. Potom formálne zápisy tvaru

$$p = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0,$$

kde n je prirodzené číslo a $a_i \in R$ pre $i = 0, \dots, n$ nazývame *polynómy* v premennej x nad okruhom R .

Namiesto zápisu $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ budeme často používať stručnejší zápis

$$p = \sum_{i=0}^n a_i x^i.$$

Prvky $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \in R$ voláme *koeficienty* polynómu p .

Ak navyše $a_n \neq 0$, tak n voláme *stupeň polynómu* p , označujeme $\text{st } p = n$. V prípade nulového polynómu (všetky koeficienty sú nulové) definujeme $\text{st } p = -\infty$. (Všimnite si, že s výnimkou nulového polynómu je možné také n zvoliť, t.j. stupeň je definovaný pre každý polynóm.) Polynómy stupňa menšieho ako 1 voláme *konštantné polynómy*.

Koeficient $a_n \neq 0$ pre $n = \text{st } p$ voláme *vedúci koeficient* polynómu p .

Dva polynómy považujeme za rovnaké, ak majú rovnaké koeficienty, t.j. ak $p = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, $q = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0$ a $n \geq m$, tak $p = q$ práve vtedy, keď

$$a_i = b_i \quad \text{pre } i = 0, 1, \dots, m$$

a $a_i = 0$ pre $i = m + 1, \dots, n$.

V tejto definícii môže byť trochu nejasné, čo je x a prečo sa volá premenná. Ešte sa tohoto problému dotkneme na konci tejto časti, je to však možné jednoducho brať tak, že doplnenie symbolov x^i je len spôsob zápisu – polynóm je jednoznačne určený svojimi koeficientami.

Príklad 4.3.2. Napríklad $0x^3 + 1x^2 + 2x + 1 = 1x^2 + 2x + 1$ chápeme ako dva rôzne zápisy toho istého polynómu z $\mathbb{R}[x]$.

Vidíme teda, že pridanie alebo odobranie nulových koeficientov polynóm tento polynóm nemení.

Ďalej by sme radi rozumným spôsobom zadefinovali sčítovanie a násobenie polynómov. „Rozumný“ spôsob by mal spĺňať prinajmenšom to, že nejakým spôsobom bude rešpektovať násobenie v okruhu R a tiež by bolo vhodné, aby výsledný okruh bol komutatívny.

Pritom polynóm budeme chápať ako súčet výrazov $a_i x^i$. To vlastne jednoznačne určuje sčítovanie, napríklad pre $p = x^2 + 2x + 1$ a $q = 2x + 1$ máme

$$p + q = (x^2 + 2x + 1) + (2x + 1) = x^2 + 2x + 2x + 1 + 1 = x^2 + 4x + 2.$$

(Využili sme iba to, že polynóm vieme rozložiť na jednotlivé členy a distributívnosť.)

Tieto požiadavky (t.j. vlastnosti komutatívneho okruhu a to, že koeficienty sa násobia rovnako ako v R) už takmer určujú násobenie. Ak chceme napríklad vynásobiť polynómy $p = x^2 + 2x + 1$ a $q = 2x + 1$ v $\mathbb{Z}[x]$, tak z distributívnosti dostaneme

$$(x^2 + 2x + 1)(2x + 1) = x^2 \cdot 2x + 2x \cdot 2x + 1 \cdot 2x + x^2 \cdot 1 + 2x \cdot 1 + 1 \cdot 1.$$

Na základe komutatívnosti dostaneme

$$(x^2 + 2x + 1)(2x + 1) = 2x^2 \cdot x + 4x \cdot x + 2 \cdot x + 1x^2 + 2x + 1.$$

Predpokladajme, že násobenie výrazov obsahujúcich iba x^k funguje takým spôsobom, že $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$. Potom predchádzajúci výraz môžeme upraviť na tvar

$$(x^2 + 2x + 1)(2x + 1) = 2x^3 + 4x^2 + 2x + 1x^2 + 2x + 1.$$

Opäť z distributívnosti dostaneme

$$(x^2 + 2x + 1)(2x + 1) = 2x^3 + 5x^2 + 4x + 1.$$

Možno sa tento jednoduchý výpočet zdá rozpísaný zbytočne priveľmi podrobne, cieľom však bolo ukázať, aké vlastnosti potrebujeme, keď chceme niečo podobné definovať nad ľubovoľným komutatívnym okruhom s jednotkou. Zopakovaním rovnakej úvahy pre všeobecný prípad dostaneme:

Definícia 4.3.3. Nech R je komutatívny okruh s jednotkou. Nech $p = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ a $q = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0$ sú ľubovoľné polynómy nad R . (Tým, že u oboch polynómov predpokladáme rovnaký počet koeficientov sme sa nijako neobmedzili – v prípade potreby je možné niektorý polynóm doplniť nulami.)

Potom *súčet polynómov* p a q je

$$p + q = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i.$$

Súčin polynómov p a q je polynóm $r = \sum_{i=0}^{2n} c_i x^i$, kde

$$c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}.$$

Teda obe operácie sme definovali rovnako ako v predchádzajúcom príklade – pri sčítovaní sa jednoducho sčítajú koeficienty a pri násobení sú koeficienty výsledného polynómu práve tie výrazy, ktoré by sme dostali roznásobením (koeficient c_k je súčet všetkých možných $a_s b_l$ pre $s + l = k$, čo sú presne všetky možnosti, ako môžeme dostať $x^k = x^s \cdot x^l$).

Definíciu súčinu by sme mohli ekvivalentne prepísať ako

$$c_k = \sum_{m+n=k} a_m b_n.$$

Z tejto ekvivalentnej definície vidno, že pre násobenie polynómov platí asociatívnosť: pre $p = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $q = \sum_{i=0}^n b_i x^i$, $r = \sum_{i=0}^n c_i x^i$ dostaneme $(pq)r = \sum_{i=0}^{3n} d_i x^i$, kde koeficienty d_k majú hodnoty

$$d_k = \sum_{m+n=k} a_m \sum_{s+t=n} b_s c_t = \sum_{m+s+t=k} a_m b_s c_t.$$

Vďaka tomu dostaneme, že

Tvrdenie 4.3.4. Nech R je komutatívny okruh s jednotkou. Množina všetkých polynómov nad R s násobením a sčítaním definovaným v predchádzajúcej definícii tvorí komutatívny okruh s jednotkou. Tento okruh označujeme $R[x]$ a voláme ho okruh polynómov nad R .

Sčítanie a násobenie polynómov sme vlastne definovali tak, aby akákoľvek rovnosť, ktorá platí pre polynómy platila aj keď namiesto x napíšeme akýkoľvek prvok okruhu R (alebo nejakého nadokruhu, ktorý obsahuje R). To zdôvodňuje použitie názvu *premená* – namiesto x môžeme napísať (dosadiť) hocijaký prvok, čiže sa môže meniť. (Aj dosadzovaniu do polynómov sa budeme ešte venovať.)

Dohoda. V ďalšom budeme polynómy zapisovať ako $p(x)$, $q(x)$ atď., čím označíme o polynóm v akej premennej ide. (Ak budeme niekde hovoriť súčasne o polynómoch aj o funkciách, tak opäť použijeme radšej jednopísmenkové označenie p , q ; aby nemohlo dôjsť k omylu, že máme na mysli nejakú funkciu resp. jej funkčnú hodnotu.)

Poznámka 4.3.5. Všimnime si, že sčítanie a násobenie konštantných polynómov funguje rovnako ako násobenie v okruhu R . To znamená, že keď prvky okruhu R stotožníme s im prislúchajúcimi konštantnými polynómami, môžeme R chápať ako podokruh okruhu $R[x]$. (Formálne by sme tento fakt sformulovali tak, že zobrazenie, ktoré prvku $a \in R$ priradí konštantný polynóm $a \in R[x]$ je okruhový homomorfizmus, ktorý je navyše injektívny.) V ďalšom budeme toto stotožnenie často používať (aj bez toho, že by sme na to výslovne upozornili.) To znamená, že R budeme chápať priamo ako podmnožinu $R[x]$.

Všimnime si ešte, že vlastnosť „byť oborom integrity“ sa prenesie z okruhu R na okruh $R[x]$ polynómov nad týmto okruhom.

Tvrdenie 4.3.6. *Ak R je obor integrity, tak pre ľubovoľné nenulové polynómy $f, g \in R[x]$ platí*

$$\text{st}(fg) = \text{st}(f) + \text{st}(g)$$

a okruh $R[x]$ polynómov nad okruhom R je obor integrity.

Dôkaz. Ak f a g sú nenulové polynómy, môžeme ich zapísať ako

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \\ g(x) &= b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0, \end{aligned}$$

pričom $n = \text{st } f$, $m = \text{st } g$. Vyrátajme, aký bude koeficient c_{n+m} polynómu $f \cdot g$ pri x^{n+m} . Priamo z definície máme, že

$$c_{n+m} = a_n b_m,$$

a pretože R je obor integrity, dostávame $c_{n+m} \neq 0$. To znamená, že polynóm $f \cdot g$ je nenulový (teda $R[x]$ je obor integrity) a tiež, že

$$\text{st}(fg) = m + n = \text{st}(f) + \text{st}(g).$$

□

4.3.2 Delenie so zvyškom

Pre nás bude dôležitý hlavne prípad keď okruh R je pole. Ako sme už ukázali, v tomto prípade platí

$$\text{st}(pq) = \text{st } p + \text{st } q.$$

Neskôr bude pre nás dôležitá nasledujúca veta:

Veta 4.3.7 (Veta o delení so zvyškom). *Nech F je pole, $f(x), g(x) \in F[x]$ a $g(x) \neq 0$. Potom existujú $q(x), r(x) \in F[x]$ také, že*

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$$

a $\text{st } r(x) < \text{st } g(x)$.

Navyše, $q(x)$ a $r(x)$ sú týmito podmienkami jednoznačne určené.

Definícia 4.3.8. Polynómy $q(x)$ a $r(x)$ jednoznačne určené podmienkami z vety 4.3.7 sa nazývajú *podiel* a *zvyšok po delení* polynómu $f(x)$ polynómom $g(x)$. Zvyšok po delení označujeme $f(x) \bmod g(x)$.

Dôkaz. Existencia. Matematickou indukciou vzhľadom na $n = \text{st}(f)$.

1° Ak $\text{st } f(x) < \text{st } g(x)$, stačí položiť $q(x) = 0$ a $r(x) = f(x)$.

2° Nech $n = \text{st } f(x) \geq \text{st } g(x)$ a každý polynóm stupňa menej ako n sa dá vydeliť so zvyškom polynómom $g(x)$ (indukčný predpoklad).

Označme $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, $g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0$ pričom $a_n, b_m \neq 0$. Položme $h(x) = f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x)$. Koefficient pri x^n v polynóme $h(x)$ je $a_n - a_n b_m^{-1} b_m = 0$. Teda $\text{st}(h) < \text{st}(f)$, čiže pre polynóm h (podľa indukčného predpokladu) existujú $s(x), r(x) \in F[x]$ také, že

$$h(x) = s(x)g(x) + r(x)$$

a $\text{st}(r) < \text{st}(g)$. Potom

$$f(x) = (s(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m})g(x) + r(x).$$

Jednoznačnosť. Nech platí

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) = q_2(x)g(x) + r_2(x),$$

pričom $\text{st}(r_1) < \text{st}(g)$, $\text{st}(r_2) < \text{st}(g)$. Potom máme

$$(q_1(x) - q_2(x))g(x) = r_2(x) - r_1(x).$$

Na pravej strane je polynóm stupňa menšieho ako $\text{st}(g)$. Ak by platilo $q_1(x) - q_2(x) \neq 0$, tak na ľavej strane tejto rovnosti dostaneme polynóm stupňa aspoň $\text{st}(g)$, čo je spor. Preto musí platiť $q_1(x) - q_2(x) = 0$ a $q_1(x) = q_2(x)$.

Z toho potom dostávame aj $r_1(x) - r_2(x) = 0$ a $r_1(x) = r_2(x)$. \square

Všimnime si, že dôkaz predchádzajúcej vety nám súčasne dáva návod, ako rátať pre dané polynómy ich podiel a zvyšok.

Príklad 4.3.9. Vydelíme so zvyškom polynóm $f(x) = x^4 + 6x^3 + 12x^2 + 12x + 10$ polynómom $g(x) = x^2 + x + 1$. Podľa návodu z dôkazu by sme sa mali pozrieť najprv na vedúce členy – vidíme, že $x^4 = x^2 \cdot x^2$. Vypočítame teda

$$f(x) - x^2 g(x) = (x^4 + 6x^3 + 12x^2 + 12x + 10) - x^2(x^2 + x + 1) = 5x^3 + 11x^2 + 12x + 10.$$

Výsledok by sme opäť mali deliť polynómom $g(x)$ a postup opakovať, až kým nedostaneme polynóm stupňa menšieho ako $g(x)$.

$$5x^3 + 11x^2 + 12x + 10 - 5x(x^2 + x + 1) = 6x^2 + 7x + 10$$

$$6x^2 + 7x + 10 - 6(x^2 + x + 1) = x + 4$$

Celkovo sme dostali, že $f(x) - (x^2 + 5x + 6)g(x) = x + 4$, čiže

$$f(x) = (x^2 + 5x + 6)g(x) + (x + 4),$$

teda podiel je $x^2 + 5x + 6$ a zvyšok po delení je $x + 4$.

V prípade, že je polynóm $g(x)$ (=stupňa 1) môžeme podiel vyrátať jednoduchším spôsobom, ktorý sa naučíme v časti 4.5.1.

Neskôr bude pre nás užitočný fakt, že analogická veta platí aj v okruhu $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Dala by sa dokazovať podobným spôsobom ako predchádzajúca veta, tu si ukážeme o trochu iný dôkaz.

Veta 4.3.10. *Nech a, b sú celé čísla, $b > 0$. Potom existujú celé čísla q a r také, že*

$$a = q \cdot b + r \quad a \quad 0 \leq r < b.$$

Navyše, q a r sú týmito podmienkami jednoznačne určené.

Definícia 4.3.11. Číslo r z predchádzajúcej vety sa nazýva *zvyšok a po delení b* a označuje sa $a \bmod b$.

Dôkaz. Existencia: Množina $\{k; kb \leq pa\}$ je zhora ohraničená. Preto existuje $q := \max\{k; kb \leq a\}$. Položme $r = a - qb$. Očividne platí $a = qb + r$ a $r \geq 0$.

Tvrdíme, že $r < b$. Nech by to tak nebolo. Z nerovnosti $r \geq b$ dostaneme $a \geq (q+1)b$, čo je spor s definíciou čísla q .

Jednoznačnosť: Predpokladajme, že $a = qb + r = q'b + r'$, kde $0 \leq r, r' < b$. Potom

$$(q - q')b = r' - r.$$

Predpokladajme, že by $|q - q'| > 0$. Potom $|r - r'| \geq b$, čo je spor s tým, že $0 \leq r, r' < b$.

Preto platí

$$(q - q')b = r - r' = 0,$$

a $q = q', r = r'$. □

4.3.3 Polynómy a polynomicke funkcie

V tomto článku budeme polynómy vždy označovať ako p, q, \dots (t.j. jedným písmenom).

Definícia 4.3.12. Nech R je komutatívny okruh s jednotkou. *Polynomickeou funkciou* nad R budeme rozumieť ľubovoľnú funkciu $f: R \rightarrow R$ určenú predpisom

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

pre nejaké $n \in \mathbb{N}$ a $a_1 \dots a_n \in R$.

Množina všetkých polynomickeých funkcií s obvyklým násobením a sčítaním funkcií opäť tvorí okruh (je to podokruh okruhu R^R – úloha 4.3.1), tento okruh budeme označovať $R\langle x \rangle$.

Pri zavedení polynómov sme spomínali polynomicke funkcie nad poľom \mathbb{R} . Zaujímá nás, aký je vo všeobecnosti vzťah medzi okruhmi $F[x]$ a $F\langle x \rangle$, ak F je ľubovoľné pole.

Máme prirodzené priradenie medzi polynómami a polynomickeými funkciami $\varphi: F[x] \rightarrow F\langle x \rangle$, ktoré polynómu $p = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ priradí funkciu danú predpisom $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$. Dá sa overiť, že toto zobrazenie je surjektívny homomorfizmus z okruhu $F[x]$ na okruh $F\langle x \rangle$.

V prípade, že homomorfizmus φ je injektívny, tak je to izomorfizmus. Čiže na to, aby sme zistili, či sú tieto dva okruhy izomorfné, stačí zistiť, ako vyzerá $\text{Ker } \varphi$. Ukážeme, že pre nekonečné polia sú okruhy $F[x]$ a $F\langle x \rangle$ izomorfné, zatiaľčo pre konečné polia to platí nemusí.

Tvrdenie 4.3.13. *Ak F je nekonečné pole tak polynomickeá funkcia $f: F \rightarrow F$*

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

sa rovná nulovej funkcii práve vtedy, keď $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$, t.j. vtedy, keď sú všetky koeficienty nulové.

Náčrt dôkazu. Vyberme $n+1$ navzájom rôznych prvkov x_0, \dots, x_n poľa F . Potom koeficienty a_0, \dots, a_n spĺňajú sústavu $n+1$ lineárnych rovníc

$$\begin{aligned} a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_0 &= 0 \\ a_n x_1^n + a_{n-1} x_1^{n-1} + \dots + a_0 &= 0 \\ &\dots \\ a_n x_n^n + a_{n-1} x_n^{n-1} + \dots + a_0 &= 0 \end{aligned}$$

Z úlohy I-6.5.8 (pozri tiež napríklad [K, Príklad 6.2.17(2)], [KGGs, s.114/7]) vieme, že determinant matice tejto sústavy je

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

čiže ak prvky x_i sú navzájom rôzne, je nenulový. To znamená, že táto matica je regulárna a uvedenej sústave rovníc vyhovuje iba nulové riešenie.

Teda $\text{Ker } f$ v tomto prípade pozostáva iba z nulového polynómu (všetky koeficienty sú nuly). \square

Príklad 4.3.14. Homomorfizmus $\varphi: \mathbb{Z}_2[x] \rightarrow \mathbb{Z}_2\langle x \rangle$, ktorý polynómu priraduje zodpovedajúcu polynomickú funkciu, nie je injektívny.

Stačí si všimnúť, že pre každé $x \in \mathbb{Z}_2$ platí $x^2 + x = 0$, teda polynomická funkcia $x^2 + x$ je nulová a

$$x^2 + x \in \text{Ker } \varphi.$$

Homomorfizmus $\varphi: R[x] \rightarrow R\langle x \rangle$ nám súčasne dáva možnosť „dosadzovať“ do polynómov. Ak totiž máme daný prvok $b \in R$ a nejaký polynóm $f = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in R[x]$, tak mu vieme priradiť funkciu $\varphi(f): R \rightarrow R$. Potom môžeme b dosadiť do tejto funkcie, čiže dostaneme

$$\varphi(f)(b) = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_0.$$

Navyše, zobrazenie $f_b: R[x] \rightarrow R$ určené predpisom

$$f_b: f \mapsto a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_0$$

je okruhový homomorfizmus taký, že $f(x) = b$ (t.j. polynóm x sa zobrazí na prvok b .)

To, že f_b je skutočne homomorfizmus možno vidieť napríklad z toho, že $f_b = g_b \circ \varphi$, kde $g_b: R^R \rightarrow R$ je homomorfizmus daný predpisom $g_b(f) = f(b)$ (úloha 4.2.5).

Definícia 4.3.15. Ak R je komutatívny okruh a $b \in R$, tak homomorfizmus $f_b: R[x] \rightarrow R$ daný predpisom

$$f_b: f \mapsto a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_0$$

voláme *dosadzovací homomorfizmus*.

4.3.4 Iné možnosti, ako definovať okruh polynómov

Keďže považujeme izomorfné okruhy za rovnaké (z toho dôvodu, že sú nerozlišiteľné pomocou pojmov definovaných „v jazyku okruhov“, t.j. nemožno ich odlíšiť žiadnou vlastnosťou sformulovanou len s použitím sčítovania a násobenia v okruhu), je jasné, že akákoľvek iná

definícia okruhov, ktorá by ako výsledok poskytla okruh izomorfný s okruhom $R[x]$, by bola rovnako dobrá.

Pomerne jednoduchá definícia, s ktorou by sa nám dobre pracovalo a ktorej by sme intuitívne celkom dobre rozumeli, by bola definícia okruhu $R[x]$ ako okruhu všetkých polynomických funkcií. Ako sme už videli, takto okruh $R[x]$ nemôžeme definovať, pretože pre konečné polia by sme takto zadefinovali niečo úplne iné než chceme.

Iná možná definícia okruhu polynómov nad okruhom R by bola nasledovná (takto sa definujú okruhy polynómov v [KGGs]):

Definícia 4.3.16. Nech R je komutatívny okruh s jednotkou. Predpokladajme, že R je podokruh nejakého komutatívneho okruhu R' a existuje prvok $x \in R'$ taký, že rovnosť

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

pre $a_1, \dots, a_n \in R$ platí práve vtedy, keď $a_1 = \dots = a_n = 0$. Potom prvok x voláme *transcendentný prvok* nad R .

Podokruh

$$R[x] = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0; n \in \mathbb{N}, a_1, \dots, a_n \in R\}$$

okruhu R' potom voláme *okruhom polynómov* v premennej x nad R .

Overiť, že množina $R[x]$ zadefinovaná v predchádzajúcej definícii je skutočne podokruhom R' je jednoduché – dá sa dokonca ukázať, že je to najmenší podokruh obsahujúci $R \cup \{x\}$. Z toho vyplýva výhoda tejto definície – automaticky vidíme, že $R[x]$ je okruh, z toho, že ide o podokruh okruhu R' . (V našej definícii sme to museli dokazovať.)

Táto definícia si vyžaduje istú prácu navyše – aby sme mohli definovať $R[x]$ pre ľubovoľný komutatívny okruh R s jednotkou, treba dokázať, že pre každý takýto okruh R existuje vhodný nadokruh R' , t.j. existuje nadokruh obsahujúci aspoň jeden transcendentný prvok. O chvíľu sa dozvieme, ako sa dá dokázať takéto niečo.

Ďalej pri použití takejto definície musíme ukázať aj to, že bez ohľadu na voľbu nadokruhu R' a transcendentného prvku $x \in R'$ dostaneme vždy (až na izomorfizmus) to isté.

Skúsme sa ešte na chvíľu pozrieť na našu definíciu 4.3.1. K nej by sme mohli mať jednu vážnu výhradu – kedysi v minulom semestri sme tvrdili, že pre nás bude pojem množiny základným pojmom, ktorý síce nedefinujeme (iba popíšeme niektoré jeho vlastnosti), pomocou množín a operácií s nimi už však budeme schopní vystavať celú potrebnú teóriu, teda všetky ďalšie pojmy budeme schopní preformulovať v jazyku množín.

V tejto definícii sme použili „symbol x “ a „formálne zápisy tvaru“ $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ – čo rozhodne nesedí s našou koncepciou definovať všetko pomocou množín. (Čo je symbol? Čo znamená *formálny zápis*?)

Ukážeme si, ako to môžeme zachrániť – t.j. zadefinujeme okruh polynómov tak, aby naša definícia bola „množinová“. Súčasne nám táto definícia poskytne aj riešenie jedného z problémov s definíciou 4.3.16 – existenciu nadokruhu, ktorý obsahuje transcendentný prvok.

Napriek tomu sa však menej formálna definícia 4.3.1 zdá byť lepšia – pretože pri nej s prvkami okruhu $R[x]$ pracujeme rovnako ako s výrazmi obsahujúcimi nejaké prvky okruhu R . Násobenie, ako sme ho definovali v tejto definícii je teda veľmi prirodzené. V nasledujúcej definícii bude o niečo komplikovanejšie a striktné používanie tejto definície by viedlo k zložitejším zápisom polynómov.

Definícia 4.3.17. Nech R je ľubovoľný komutatívny okruh s jednotkou. Ako $R[x]$ označíme množinu všetkých postupností prvkov z R takých, že iba konečne veľa členov tejto postupnosti je nenulových. Ďalej zadefinujeme sčítovanie dvoch postupností ako

$$(a_n)_{n=1}^{\infty} + (b_n)_{n=1}^{\infty} = (a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$$

a súčin postupností $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ definujeme ako postupnosť $(c_n)_{n=1}^{\infty}$, ktorej členy sú určené predpisom

$$c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = \sum_{m+n=k} a_m b_n.$$

Táto množina postupností s uvedeným sčítaním a násobením tvorí okruh, ktorý voláme *okruh polynómov* nad R .

Táto definícia v istom zmysle presne zodpovedá definícii 4.3.1 – postupnosti sú tiež jednoznačne určené svojimi členmi, takisto ako dva polynómy sme v definícii 4.3.1 prehlásili za rovnaké, ak mali rovnaké koeficienty.

Dôkaz, že takýmto spôsobom dostaneme okruh je takmer totožný s dôkazom tvrdenia 4.3.4.

Polynóm $3x^2 - 1x + 0$ v tejto definícii zodpovedá postupnosti $(0, -1, 3, 0, 0, \dots)$. Prvky z R môžeme stotožniť s postupnosťami tvaru $(a, 0, 0, 0, \dots)$, kde $a \in R$. Všimnime si, že polynóm x zodpovedá postupnosti $(0, 1, 0, 0, \dots)$ a dá sa ukázať, že v okruhu $R[x]$ (chápanom ako postupnosti, čiže ako v poslednej uvedenej definícii) je tento prvok transcendentným prvkom nad R .

Cvičenia

Úloha 4.3.1. Dokážte, že polynomicke funkcie (definícia 4.3.12) tvoria podokruh okruhu F^F .

4.4 Deliteľnosť v okruhoch

V tejto časti sa budeme zaoberať deliteľnosťou v okruhoch. Najdôležitejšími príkladmi budú pre nás okruh $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ celých čísel a okruh $(F[x], +, \cdot)$ polynómov nad poľom F .

V celej podkapitole budeme predpokladať, že okruh, s ktorým pracujeme, je obor integrity. Nasledujúcu vlastnosť oborov integrity budeme často používať, preto ju sformulujeme ako samostatnú lemu. (Vlastne to je špeciálny prípad krátenia nenulovým prvkom v obore integrity – tvrdenie 4.1.14.)

Lema 4.4.1. *Nech R je obor integrity, $a, b \in R$. Ak platí $ab = a$ pre $a \neq 0$, tak $b = 1$.*

Dôkaz. Z rovnosti $ab = a = a1$ vyplýva

$$ab - a1 = a(b - 1) = 0,$$

čiže v obore integrity pre $a \neq 0$ máme $b - 1 = 0$, čiže $b = 1$. □

Definícia 4.4.2. Nech R je obor integrity. Hovoríme, že a *delí* b , označujeme $a \mid b$, ak existuje $c \in R$ také, že $b = ca$.

Lema 4.4.3. *Nech R je obor integrity. Potom pre ľubovoľné $a, b, c, d \in R$, $a_i, r_i \in R$ platí*

- (i) $a \mid a$
- (ii) $a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$
- (iii) $a \mid b \wedge c \mid d \Rightarrow ac \mid bd$
- (iv) $a \mid 0, 1 \mid a$

$$(v) 0 \mid a \Leftrightarrow a = 0$$

$$(vi) ac \mid bc \wedge c \neq 0 \Rightarrow a \mid b$$

$$(vii) a \mid a_i \text{ pre } i = 1, \dots, n \Rightarrow a \mid a_1r_1 + \dots + a_nr_n$$

Dôkaz. Jednoduchý – ponecháme ako cvičenie. \square

Príklad 4.4.4. V prípade okruhu \mathbb{Z} je relácia \mid tá istá relácia deliteľnosti, ktorú poznáte zo strednej školy, t.j. napríklad $3 \mid 12$, lebo $12 = 3 \cdot 4$, zatiaľčo $3 \nmid 7$.

Všimnime si, že $a \mid b$ znamená to isté, ako že zvyšok čísla b po delení číslom a je 0.

Príklad 4.4.5. V okruhoch $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{R}[x]$ platí $x - 1 \mid x^2 - 1$, pretože $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Pritom si môžeme všimnúť, že v $\mathbb{R}[x]$ platí aj $2x - 2 \mid x^2 - 1$ (lebo $x^2 - 1 = (2x - 2)(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})$), ale v okruhu $\mathbb{Z}[x]$ už táto relácia neplatí. Deliteľnosť polynómov, ak ich chápeme ako polynómy nad \mathbb{Z} a nad \mathbb{R} , sú rôzne pojmy, hoci \mathbb{R} je nadpolom \mathbb{Z} .

Všimnime si, že aj v okruhoch $F[x]$ platí $f(x) \mid g(x)$ práve vtedy, keď zvyšok polynómu $g(x)$ po delení $f(x)$ je 0. (Neskôr si to zdôvodníme podrobnejšie vo všeobecnejšom prípade)

Definícia 4.4.6. Ak $a, b \in R$, kde R je obor integrity, hovoríme, že prvky a a b sú *asociované*, označujeme $a \sim b$, ak $a \mid b$ a súčasne $b \mid a$

$$a \mid b \wedge b \mid a \Leftrightarrow a \sim b$$

Lema 4.4.7. *Nech R je obor integrity. Pre ľubovoľné $a, b, c, d \in R$ platí*

$$(i) a \sim b \wedge b \sim c \Rightarrow a \sim c$$

$$(ii) a \sim a$$

$$(iii) a \sim b \Rightarrow b \sim a$$

$$(iv) a \sim b \wedge c \sim d \Rightarrow ac \sim bd$$

Dôkaz lemy 4.4.7 pre jednoduchosť vynechávame. Môžeme si všimnúť, že prvé tri vlastnosti nám hovoria, že relácia „byť asociovaný“ je relácia ekvivalencie. (Podobným spôsobom môžeme dostať z ľubovoľného čiastočného usporiadania reláciu ekvivalencie – úloha 4.4.2.) Posledná podmienka hovorí, že relácia \sim sa správa rozumne vzhľadom na násobenie.

Definícia 4.4.8. Ak okruh R má jednotku a $ab = 1$, hovoríme, že a je *deliteľ jednotky*. Množinu všetkých deliteľov jednotky budeme označovať $U(R)$.

Tvrdenie 4.4.9. *Nech R je obor integrity. Potom*

$$(i) \text{ Delitele jednotky s operáciou násobenia tvoria grupu, t.j. } (U(R), \cdot) \text{ je grupa.}$$

$$(ii) a \sim b \text{ práve vtedy, keď existuje deliteľ jednotky } u \text{ taký, že } a = bu.$$

Dôkaz. (i) Uzavretosť na násobenie: Ak $a, b \in U(R)$, znamená to existenciu $c, d \in R$ takých, že $ac = 1$, $bd = 1$. Potom $acbd = (ab)(cd) = 1$, čiže aj ab je deliteľ jednotky.

Asociatívnosť máme priamo z definície okruhu, neutrálny prvok je 1.

Existencia inverzného prvku: Ak a je deliteľ jednotky, znamená to, že existuje $b \in R$ také, že $ab = 1$. To znamená, že $b \in U(R)$ a tento prvok je inverzný k a vzhľadom na násobenie.

(ii) Lahko vidno, že $a \sim 0$ platí práve vtedy, keď $a = 0$ (z lemy 4.4.3 vieme, že $0 \mid a$ iba pre $a = 0$). Samozrejme, $u0 = 0$ pre ľubovoľné $u \in U(R)$.

Zostáva nám teda dokázať tvrdenie pre prípade $a \neq 0$.

Ak $a \mid b$ a $b \mid a$, tak existujú $c, d \in R$ také, že $ac = b$ a $bd = a$. Potom máme

$$a = bd = (ac)d = a(cd)$$

a z lemy 4.4.1 dostaneme $cd = 1$, čiže c aj d sú delitele jednotky. \square

Príklad 4.4.10. Lahko sa dá overiť, že ± 1 sú delitele jednotky v \mathbb{Z} a všetky nenulové konštantné polynómy sú delitele jednotky v $F[x]$. (Tento fakt vyplýva aj z lemy 4.4.14, ktorú o chvíľu dokážeme.)

Takisto nie je ťažké ukázať, že iné delitele jednotky tam už nie sú. Skutočne, ak $ab = 1$ v \mathbb{Z} , tak $a, b \neq 0$, z čoho máme $|a| \geq 1$, $|ab| = |a||b| \geq 1$. Aby v predchádzajúcej rovnosti nastala rovnosť, musí byť $|a| = 1$, čiže $a = \pm 1$.

Ak $f(x)$ je deliteľ jednotky v $F[x]$, tak máme $f(x)g(x) = 1$. Pritom $g(x) \neq 0$ (lebo potom by sme dostali $f(x)g(x) = 0$), preto $\text{st } g \geq 0$. Potom (tvrdenie 4.3.6) $\text{st}(fg) = \text{st } f + \text{st } g \geq \text{st } f$. Súčasne vieme $\text{st}(fg) = \text{st } 1 = 0$, preto aj $\text{st } f = 0$ a $f(x)$ je konštantný polynóm. (Nemôže platiť $f(x) = 0$; zdôvodniť to môžeme rovnako ako sme to spravili pre polynóm $g(x)$.)

4.4.1 Euklidovské okruhy

Veta 4.3.7 o delení so zvyškom je dôležitou vlastnosťou okruhu $F[x]$ polynómov nad poľom F . Veta 4.3.10 nám hovorí, že analogickú vlastnosť má aj okruh celých čísel $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

Na základe tejto vety môžeme odvodiť mnohé vlastnosti, ktoré sú spoločné pre oba spomínané okruhy – najjednoduchšie bude odvodiť ich všeobecne pre oba spomínané okruhy.

Definícia 4.4.11. Obor integrity R sa nazýva *euklidovský okruh*, ak existuje funkcia $N: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ taká, že pre ľubovoľné $a, b \in R$, $b \neq 0$ existujú $q, r \in R$ také, že $a = qb + r$ a buď $r = 0$ alebo $N(r) < N(b)$.

Funkciu N budeme nazývať *norma*.

Okruh je euklidovský, ak existuje funkcia N s uvedenými vlastnosťami. Samozrejme, ako uvidíme aj v nasledujúcom príklade, pre nejaký euklidovský okruh môže existovať viacero noriem.

V prípade, že sa nám to hodí, môžeme uvažovať o norme aj ako o funkcii definovanej na celom R ; z definície je jasné, že voľba hodnoty $N(0)$ nijako neovplyvní či norma spĺňa dané podmienky.

Poznámka 4.4.12. Niektorí autori v definícii euklidovského okruhu navyše požadujú, aby norma spĺňala podmienku $N(a) \leq N(ab)$. V skutočnosti sú tieto 2 definície ekvivalentné, t.j. ak na obore integrity existuje norma s vlastnosťami z definície 4.4.11, tak existuje aj taká norma, ktorá navyše spĺňa $N(a) \leq N(ab)$ (pozri napríklad [Rog]).

Príklad 4.4.13. Okruh \mathbb{Z} je euklidovský okruh. Ako normu môžeme zvoliť absolútnu hodnotu čísla z , čiže $N(z) = |z|$. Takisto norma $N(z) = |z| + 1$ vyhovuje definícii euklidovského okruhu.

Okruh $F[x]$, kde F je ľubovoľné pole, je euklidovský okruh. Za normu môžeme zvoliť stupeň polynómu (ten je pre každý nenulový polynóm definovaný ako prirodzené číslo).

Lahko si môžeme všimnúť, že

Lema 4.4.14. Ak R je euklidovský okruh, $u \neq 0$ a $N(u) = 0$, tak u je deliteľ jednotky.

Dôkaz. Priamo z definície máme, že $1 = uc + d$, pričom $N(d) < 0$ alebo $d = 0$. Pretože prípad $N(d) < 0$ nemôže nastať, máme $d = 0$. \square

4.4.2 Okruhy hlavných ideálov

Ďalším typom okruhov, ktorý bude pre nás užitočný sú okruhy hlavných ideálov.

Definícia 4.4.15. Ak R je obor integrity, hovoríme, že R je okruh hlavných ideálov, ak každý ideál v R je hlavný, t.j. ak je tvaru

$$I = (a) = \{ax; x \in R\}$$

pre nejaké $a \in R$.

Tvrdenie 4.4.16. Každý euklidovský okruh je okruh hlavných ideálov.

Dôkaz. Nech R je euklidovský okruh, $I \neq \emptyset$ je ideál v R .

Ak $I = \{0\}$, tak $I = (0)$. Môžeme teda predpokladať, že I obsahuje aspoň jeden nenulový prvok.

⁸ Ak v $I \setminus \{0\}$ existuje prvok s nulovou normou, tak tento prvok je deliteľom jednotky (podľa lemy 4.4.14). To by ale znamenalo, že $I = R = (1)$. V ďalšej časti dôkazu teda môžeme predpokladať, že všetky prvky $I \setminus \{0\}$ majú nenulovú normu.

Nech b je nenulový prvok z I s najmenšou normou. (Taký prvok existuje, lebo $\{N(b); b \in I \setminus \{0\}\}$ je neprázdna podmnožina prirodzených čísel. Každá neprázdna podmnožina prirodzených čísel má najmenší prvok – princíp dobrého usporiadania.)

Tvrdíme, že $I = (b)$. Pre každý prvok $a \in I$ máme $a = bc + d$. Pritom $d = bc - a \in I$, čiže opäť nemôže nastať možnosť $N(d) < N(b)$. Teda $d = 0$ a $a = bc$. Tým sme ukázali, že $I \subseteq (b)$. Inklúzia $(b) \subseteq I$ je zrejماً. \square

Obrátené tvrdenie neplatí, ale príklad, ktorý to ukazuje nie je úplne jednoduchý.

Príklad 4.4.17. Z predchádzajúceho tvrdenia špeciálne dostávame, že \mathbb{Z} a $F[x]$ sú okruhy hlavných ideálov, teda v \mathbb{Z} neexistujú iné ideály ako ideály tvaru $(k) = k\mathbb{Z}$ a takisto v $F[x]$ každý ideál pozostáva z násobkov nejakého polynómu $f(x)$.

Príklad 4.4.18. Okruh $\mathbb{Z}[x]$ je príklad oboru integrity, ktorý nie je okruhom hlavných ideálov. Ak uvažujeme ideál

$$(2, x) = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]; a_0 \in 2\mathbb{Z}, a_i \in \mathbb{Z} \text{ pre } i \geq 1\}$$

v okruhu $\mathbb{Z}[x]$ (t.j. ideál generovaný polynómom x a konštantným polynómom 2; pozri poznámku 4.4.20), tak tento ideál nie je hlavný.

Ak by bol totiž generovaný jediným polynómom, musel by to byť polynóm stupňa 0. (V ideále $(f(x))$ generovanom polynómom $f(x)$ majú všetky polynómy stupeň väčší alebo rovný $\text{st } f$ – vyplýva to z tvrdenia 4.3.6.) Generátorom by teda musel byť nejaký konštantný polynóm c . Potom však c musí byť párne (lebo iné konštantné polynómy v ideále $(2, x)$ nie sú.) V hlavnom ideále (c) generovanom nejakou párnou konštantou však nevyhnutne musia mať všetky polynómy iba párne koeficienty, čiže nedostali by sme tak všetky polynómy patriace do $(2, x)$.

Špeciálne, keďže sme ukázali, že $\mathbb{Z}[x]$ nie je okruh hlavných ideálov, vyplýva z tvrdenia 4.4.16, že to nie ani euklidovský okruh.

⁸Toto bolo chybné:

Ak by všetky nenulové prvky v I mali nulovú normu, tak sú deliteľmi jednotky (podľa lemy 4.4.14). To by ale znamenalo, že $I = R = (1)$. V ďalšej časti dôkazu teda môžeme predpokladať, že v I existuje nenulový prvok s nenulovou normou.

V dôsledku 4.2.21 sme ukázali, že každý maximálny ideál je prvoideál. V okruhu hlavných ideálov platí aj obrátená implikácia:

Tvrdenie 4.4.19. *Ak $I = (m)$, $I \neq \{0\}$, je prvoideál v OHI R , tak I je maximálny.*

Dôkaz. Nech $I \subseteq J \subseteq R$. Pretože R je OHI existuje prvok $a \in R$ taký, že $J = (a)$. Zrejme $a \neq 0$ (inak by platilo $I \subseteq (0)$, teda I by bol nulový ideál). Máme teda $(m) \subseteq (a)$, čiže $m = ac$ pre nejaké $c \in R$. Potom buď $a \in I$ a $I = (a)$ alebo $c \in I$, čiže $c = md$ a $m = ac = m(ad)$. Z toho máme $ad = 1$ (pretože R je OI), čiže a je deliteľ jednotky a $(a) = R$. \square

Deliteľnosť v okruhoch hlavných ideálov

Všimnime si, že v OHI platí nasledovný vzťah medzi deliteľnosťou v okruhu a hlavnými ideálmi:

$$a \mid b \Leftrightarrow b \in (a) \Leftrightarrow (b) \subseteq (a). \quad (4.2)$$

(Vyplýva to priamo z definície deliteľnosti a z definície hlavného ideálu.)

V súvislosti s hlavnými ideálmi si tiež môžeme všimnúť, že $(a) = R$ práve vtedy, keď a je deliteľ jednotky. (Pozri lemu 4.2.9.)

Poznámka 4.4.20. Podobne, ako (a) označuje ideál generovaný prvkom a , znakom (a_1, \dots, a_n) budeme označovať najmenší ideál obsahujúci všetky prvky a_1, \dots, a_n . Lahko sa dá overiť, že v komutatívnom okruhu s jednotkou

$$(a_1, \dots, a_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i a_i; x_i \in R \right\}$$

(Je zjavné, že táto množina obsahuje prvky a_1, \dots, a_n . Stačí teda overiť, že to je ideál – to ide ľahko z definície ideálu.)

Špeciálne máme

$$(a, b) = \{ax + by; x, y \in R\}.$$

Podobne ako pre celé čísla, aj v oboroch integrity vieme definovať pojem najväčší spoločný deliteľ.

Definícia 4.4.21. *Najväčší spoločný deliteľ* prvkov $a, b \in R$ je taký prvok $c \in R$, že

$$(i) \quad c \mid a, c \mid b,$$

$$(ii) \quad \text{pre ľubovoľný prvok } d \in R \text{ taký, že } d \mid a \text{ a } d \mid b \text{ platí aj } d \mid c.$$

Označujeme ho $\gcd(a, b)$.

Inak povedané, $\gcd(a, b)$ je najväčší (vzhľadom na usporiadanie \mid) prvok z množiny čísel, ktoré súčasne delia a aj b (=spoločné delitele čísel a, b).

Priamo z definície vidno, že najväčší spoločný deliteľ (ak existuje) je určený jednoznačne až na asociovanosť.⁹

⁹Pretože najväčší spoločný deliteľ nie je jednoznačne určený, nemal by som používať označenie $c = \gcd(a, b)$; znamienko rovnosti typicky používame keď na oboch stranách máme jednoznačne určený objekt. Na druhej strane napríklad pri okruhoch \mathbb{Z} a $F[x]$ sme z viacerých možností schopný vybrať „pekného“ reprezentanta. V \mathbb{Z} vyberieme nezáporné číslo, v $F[x]$ vyberieme polynóm kde vedúci koeficient je jednotka. Čiže v týchto prípadoch ste asi zvyknutí na takýto výber najväčšieho spoločného deliteľa. Používam v tomto texte zápis s rovnosťou – ale upozornil som na to, že nie je úplne korektný.

Tvrdenie 4.4.22. [Bézoutova identita] Ak R je okruh hlavných ideálov, tak pre ľubovoľné $a, b \in R$ existuje v R najväčší spoločný deliteľ $c = \gcd(a, b)$.

Navyše, existujú také $x, y \in R$, že

$$c = xa + yb.$$

Dôkaz. Vieme, že $(a, b) = \{ax + by; x, y \in R\}$ je ideál v R . Pretože R je okruh hlavných ideálov, existuje $c \in R$ také, že $(c) = (a, b)$. Z toho špeciálne máme $a, b \in (c)$, čiže $c \mid a$, $c \mid b$.

Navyše, pretože $c \in (a, b)$, máme zaručenú existenciu $x, y \in R$ s vlastnosťou $ax + by = c$.

Z toho potom dostávame, že pre ľubovoľné $d \in R$ také, že $d \mid a$, $d \mid b$, platí

$$d \mid ax + by = c.$$

□

Z predchádzajúceho tvrdenia dostávame nasledujúci dôsledok, ktorý je často užitočný.

Dôsledok 4.4.23. Nech R je okruh hlavných ideálov, $a, b, c \in R$, $a, b \neq 0$. Ak $\gcd(a, b) = 1$ a $a \mid bc$, tak $a \mid c$.

$$\gcd(a, b) = 1 \quad \wedge \quad a \mid bc \quad \Rightarrow \quad a \mid c$$

Dôkaz. Z tvrdenia 4.4.22 máme existenciu $x, y \in R$ takých, že

$$ax + by = 1.$$

Potom

$$a \mid ac \cdot x + bc \cdot y = (ax + by)c = c.$$

□

Tvrdenie 4.4.22 hovorí o existencii najväčšieho spoločného deliteľa čísel a, b a o existencii $x, y \in R$ s vlastnosťou $\gcd(a, b) = xa + yb$, nehovorí však, ako by sme $\gcd(a, b)$, x a y vedeli vyrátať.

V prípade, že vieme v našom obore integrity (algoritmicke) deliť so zvyškom, dá sa to urobiť pomocou *Euklidovho algoritmu*.

Základom Euklidovho algoritmu je nasledujúca lema:

Lema 4.4.24. Ak R je obor integrity a $a, b \in R$, tak

$$\gcd(a, b) = \gcd(a + bx, b)$$

pre ľubovoľné $x \in R$.

Dôkaz. Keďže najväčší spoločný deliteľ je generátor ideálu (a, b) , stačí dokazovať rovnosť ideálov $(a, b) = (a + bx, b)$.

Priamo z definície ideálu máme $bx \in (a, b)$, teda aj $a + bx \in (a, b)$ a $(a + bx, b) \subseteq (a, b)$.

Podobne sa ukáže $a = (a + bx) - bx \in (a + bx, b)$ a $(a, b) \subseteq (a + bx, b)$. □

Ak postupne počítame zvyšky po delení, vieme ich vyjadriť ako kombináciu čísel a, b .

$$\begin{array}{lll} a = q_1 \cdot b + r_1 & N(r_1) < N(b) & r_1 = a - q_1 \cdot b \\ b = q_2 \cdot r_1 + r_2 & N(r_2) < N(r_1) & r_2 = b - q_2 \cdot r_1 = (1 + q_1 q_2)b - q_2 a \\ r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3 & N(r_3) < N(r_2) & r_3 = r_1 - q_3 \cdot r_2 = \dots = x_3 a + y_3 b \\ & \vdots & \vdots \\ r_{l-2} = q_l \cdot r_{l-1} + r_l & N(r_l) < N(r_{l-1}) & r_l = r_{l-2} - q_l \cdot r_{l-1} = \dots = x_l a + y_l b \\ r_{l-1} = q_{l+1} \cdot r_l & \text{zvyšok } 0 & \end{array}$$

Pretože v každom kroku norma zvyšku klesá, po istom čase sa algoritmus musí zastaviť a dostaneme nulový zvyšok. Navyše, z predchádzajúcej lemy vidíme, že v každom kroku platí $\gcd(r_k, r_{k-1}) = \gcd(a, b)$, preto na konci platí $\gcd(a, b) = \gcd(r_{l-1}, r_l) = \gcd(q_{l+1}r_l, r_l) = r_l$. Ďalej každý zvyšok sme vedeli vyjadriť v tvare $r_k = x_k a + y_k b$, kde $x_k, y_k \in R$, čiže týmto algoritmom vieme získať takéto vyjadrenie pre $\gcd(a, b)$.

Ukážeme si tento postup na konkrétnych príkladoch – najprv v \mathbb{Z} . (Najväčší spoločný deliteľ v \mathbb{Z} viete zo strednej školy rátať pomocou rozkladu na prvočísla – niečo podobné platí všeobecne, ako uvidíme v tvrdení 4.4.39. Takýto postup nám však neposkytuje najväčší spoločný deliteľ ako kombináciu daných čísel – v príklade 4.4.26 uvidíme, že takéto vyjadrenie pre n.s.d. môže byť užitočné. Navyše to predpokladá, že poznáme rozklad na ireducibilné prvky – čo zatiaľ v $F[x]$ nevieme robiť vôbec, v \mathbb{Z} to vieme robiť pre malé čísla. Pre veľké čísla je výpočtovo efektívnejší Euklidov algoritmus.)

Príklad 4.4.25. Chceme vyrátať $d = \gcd(89, 16)$ a vyjadriť ho v tvare $89u + 16v$.

Keď použijeme viackrát vetu o delení so zvyškom, tak dostaneme:

$$\begin{array}{ll} 89 = 5 \cdot 16 + 9 & 9 = 89 - 5 \cdot 16 \\ 16 = 1 \cdot 9 + 7 & 7 = 16 - 9 = 6 \cdot 16 - 89 \\ 9 = 1 \cdot 7 + 2 & 2 = 9 - 7 = 2 \cdot 89 - 11 \cdot 16 \\ 7 = 3 \cdot 2 + 1 & 1 = 7 - 3 \cdot 2 = 39 \cdot 16 - 7 \cdot 89 \\ 2 = 2 \cdot 1 + 0 & \end{array}$$

Z lemy 4.4.24 potom vidíme, že $\gcd(89, 16) = \gcd(16, 9) = \gcd(9, 7) = \gcd(7, 2) = \gcd(2, 1) = 1$. V pravom stĺpci sme dostali hľadané vyjadrenie

$$1 = 39 \cdot 16 - 7 \cdot 89.$$

Tento postup môžeme prehľadne zapísať aj do tabuľky.

89	1	0	
16	0	1	
9	1	-5	$1r-5*2r$
7	-1	6	$2r-3r$
2	2	-11	$3r-4r$
1	-7	39	$4r-3*5r$

Tento postup do istej miery pripomína riadkové úpravy na matici. V každom riadku máme koeficienty, pomocou ktorých vieme číslo z prvého stĺpca vyjadriť ako celočíselnú kombináciu čísel 89 a 16.

Posledný stĺpec tabuľky sme doplnili len na to, aby bolo vidno, aké úpravy sme robili. Môže to byť užitočné pri hľadaní prípadnej chyby – tento stĺpec ale v podstate nie je nutný. Postupovali sme presne podľa vety o delení so zvyškom. Ak rátate niečo takéto ručne, pri malých číslach si občas môžete všimnúť aj nejaké veci, ktoré vám trochu urýchlia výpočet. Napríklad ak si všimnete, že $2 = 2 \cdot 9 - 16$, ušetríte jeden riadok. (Treba si ale dávať pozor, či zrýchlený postup je správny – v podstate si stačí pamätať lemu 4.4.24 a postupovať podľa nej.)

89	1	0	
16	0	1	
9	1	-5	$1r-5*2r$
2	2	-11	$2*4r-3r$
1	-7	39	$3r-4*4r$

V predošlom príklade sme našli jednu dvojicu (u, v) takú, že $89u + 16v = 1$. Je to jediná možnosť? Vedeli by ste nájsť všetky ostatné také dvojice?

Príklad 4.4.26. Inverzné prvky v poli \mathbb{Z}_p (kde p je prvočíslo) sme zatiaľ vedeli počítat iba takým spôsobom, že sme postupne skúšali všetky prvky poľa. Euklidov algoritmus, ktorý sme sa teraz naučili, môžeme využiť na ten istý účel.

Pokusme sa vypočítať 5^{-1} v \mathbb{Z}_{13} . Pretože 13 je prvočíslo platí $\gcd(5, 13) = 1$, čiže vieme nájsť čísla $x, y \in \mathbb{Z}$ také, že $1 = 5x + 13y$.

Postupným delením dostaneme

$$\begin{array}{rcl} 13 & = & 2 \cdot 5 + 3 & & 3 & = & 1 \cdot 13 - 2 \cdot 5 \\ 5 & = & 1 \cdot 3 + 2 & & 2 & = & 5 - 3 = 3 \cdot 5 - 1 \cdot 13 \\ 3 & = & 1 \cdot 2 + 1 & & 1 & = & 3 - 2 = 2 \cdot 13 - 5 \cdot 5 \end{array}$$

Ak pre všetky čísla v rovnosti $1 = 2 \cdot 13 - 5 \cdot 5$ urobíme zvyšok po delení 13, dostaneme rovnosť

$$1 = -5 \odot 5 = 8 \odot 5,$$

ktorá platí v \mathbb{Z}_{13} . Teda v \mathbb{Z}_{13} platí $5^{-1} = 8$.

Opäť ten istý postup by sme mohli zapísať tabuľkou:

13	1	0	
5	0	1	
3	1	-2	$1r-2*2r$
2	-1	3	$2r-3r$
1	2	-5	$3r-4r$

Vyskúšajme si aspoň jeden konkrétny príklad v $\mathbb{Q}[x]$. Vieme, že najväčší spoločný deliteľ je určený jednoznačne až na asociovanosť – čiže v tomto prípade až na vynásobenie konštantou. Dohodnime sa, že si vyberieme ten, ktorý má vedúci koeficient 1 (tzv. normovaný polynóm) – potom už je najväčší spoločný deliteľ určený jednoznačne.

Príklad 4.4.27. Vypočítajte $d(x) = \gcd(f(x), g(x))$ a vyjadrite ho v tvare $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ pre polynómy $f(x) = 3x^5 + 5x^4 - 16x^3 - 6x^2 - 5x - 6$, $g(x) = 3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2$.

Podobne ako v predchádzajúcom príklade, budeme polynómy postupne deliť so zvyškom a zvyšok si v každom kroku vyjadríme ako kombináciu $f(x)$ a $g(x)$.

Kvôli prehľadnosti som zapísal zvlášť delenie polynómov a zvlášť vyjadrenie zvyšku v tvare kombinácie $f(x)$ a $g(x)$.

$$\begin{aligned} 3x^5 + 5x^4 - 16x^3 - 6x^2 - 5x - 6 &= (x + 3)(3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2) - 3x^3 - 2x^2 \\ 3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2 &= (-3x^3 - 2x^2)(-x + 2) + 3x^2 - x - 2 \\ -3x^3 - 2x^2 &= (3x^2 - x - 2)(-x - 1) + (-3x - 2) \end{aligned}$$

Vieme, že posledný nenulový zvyšok $-3x - 2$ v Euklidovom algoritme je hľadaný najväčší spoločný deliteľ. Pretože chceme dostať normovaný polynóm, vydělíme ho ešte vedúcim koeficientom -3 .

$$\gcd(f(x), g(x)) = x + \frac{2}{3}$$

Zvyšky v jednotlivých deleniach vyjadríme pomocou $f(x)$ a $g(x)$ takto

$$-3x^3 - 2x^2 = f(x) - g(x)(x + 3)$$

$$\begin{aligned}
3x^2 - x - 2 &= g(x) - (-3x^3 - 2x^2)(-x + 2) = \\
&= g(x) - (f(x) - g(x)(x + 3))(-x + 2) = \\
&= f(x)(x - 2) + [1 - (x - 2)(x + 3)g(x)] = \\
&= (x - 2)f(x) - (x^2 + x - 7)g(x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-3x - 2 &= -3x^3 - 2x^2 - (3x^2 - x - 2)(-x - 1) = \\
&= f(x) - g(x)(x + 3) + [(x - 2)f(x) - (x^2 + x - 7)g(x)](x + 1) = \\
&= f(x)[1 + (x - 2)(x + 1)] - g(x)[(x + 3) + (x + 1)(x^2 + x - 7)] = \\
&= f(x)(x^2 - x - 1) - g(x)(x^3 + 2x^2 - 5x - 4)
\end{aligned}$$

Po vydelení poslednej rovnosti číslom -3 dostávame

$$\gcd(f(x), g(x)) = x + \frac{2}{3} = -f(x)\frac{x^2 - x - 1}{3} + g(x)\frac{x^3 + 2x^2 - 5x - 4}{3}.$$

Opäť, pokiaľ by Vám to lepšie vyhovovalo, celý postup si môžete zapísať do tabuľky.

$f(x) = 3x^5 + 5x^4 - 16x^3 - 6x^2 - 5x - 6$	1	0
$g(x) = 3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2$	0	1
$h_1(x) = f(x) - (x + 3)g(x) = -3x^3 - 2x^2$	1	$-(x + 3)$
$h_2(x) = g(x) + (x - 2)h_1(x) = 3x^2 - x - 2$	$x - 2$	$-(x^2 + x - 7)$
$h_3(x) = h_1(x) + (x + 1)h_2(x) = -3x - 2$	$x^2 - x - 1$	$-(x^3 + 2x^2 - 5x - 4)$
$h_2(x) + (x - 1)h_3(x) = 0$		

V predposlednom riadku sa naposledy vyskytol nenulový zvyšok, čiže ide o $\gcd(f(x), g(x))$. Z tohoto riadku vieme aj jeho vyčítať vyjadrenie – také isté, ako sme dostali v predchádzajúcom postupe. (Presnejšie povedané, dostali sme rovnaké vyjadrenie až na pre násobenie konštantou – vynormovanie.)

Pri výpočtoch takého typu ako sme robili v predchádzajúcom príklade sa celkom ľahko dá pomýliť – preto je užitočné občas (povedzme po každom kroku) vyskúšať, či rovnosti, ktoré sme dostali pre polynómy skutočne platí aj po dosadení nejakých čísel. (Je rozumné skúšať malé, čísla, napríklad $0, \pm 1$ – aby sa nám ľahko počítali hodnoty polynómu v týchto číslach.) Pri takejto čiastočnej skúške správnosti máme veľkú šancu prípadnú chybu odhaliť. (Samozrejme, dá sa urobiť skúška aj tak, že kombináciu $f(x)$ a $g(x)$, ktorú sme dostali, skutočne poroznásobujeme a zistíme, či vyjde rovnaký polynóm ako na druhej strane rovnosti – čo je však o dosť prácnejšie.)

Podobne ako pri počítaní racionálnych koreňov, ak v priebehu výpočtu nám vyjde ako jeden zo zvyškov polynóm, v ktorom všetky koeficienty sú násobkom toho istého celého čísla, môžeme polynóm týmto číslom vydeliť – dostaneme opäť polynóm s celočíselnými koeficientami (teda sa nám s ním bude dobre počítat) a neovplyvníme hodnotu najväčšieho spoločného deliteľa (v okruhu $F[x]$ sme tento polynóm zmenili len o deliteľ jednotky). Je ale dôležité pri vyjadrovaní najväčšieho spoločného deliteľa pomocou $f(x)$ a $g(x)$ nezabudnúť zarátať aj toto vydelenie.

4.4.3 Gaussove okruhy

Pojem analogický k pojmu prvočísla je v okruhu pojem ireducibilného prvku.

Definícia 4.4.28. Prvok $a \neq 0$ okruhu R sa nazýva *ireducibilný*, ak a je nenulový, nie je to deliteľ jednotky a ak z rovnosti $a = bc$ vyplýva, že niektorý z prvkov b, c je deliteľ jednotky v R .

Inými slovami, ireducibilný prvok sa (až na asociovanosť a výmenu poradia) nedá zapísať ako súčin dvoch prvkov z R inak ako $1 \cdot a$.

Príklad 4.4.29. Vieme, že prvočísla boli definované tak, že ich rozklad na súčin $p = a \cdot b$ je možný iba vtedy, ak niektoré z čísel a, b je rovné 1. Z toho vidno, že ireducibilné prvky v \mathbb{Z} sú práve čísla tvaru $\pm p$, kde p je prvočíslo.

Ireducibilnými prvkami v okruhu $F[x]$ (volajú sa ireducibilné polynómy) sa budeme zaoberať neskôr.

Naším najbližším cieľom je dokázať, že v okruhoch hlavných ideálov platí tvrdenie zodpovedajúce rozkladu prirodzených (celých) čísel na súčin prvočísel.

Definícia 4.4.30. Okruh s jednoznačným rozkladom (alebo tiež *Gaussov okruh*) je obor integrity, v ktorom pre každý prvok $x \in R$, ktorý je nenulový a nie je deliteľom jednotky, existuje rozklad

$$x = p_1 \dots p_k$$

na súčin ireducibilných prvkov a navyše je tento rozklad jednoznačný až na asociovanosť a poradie.

Tvrdenie 4.4.31. Ak ideál (p) v obore integrity R je vlastný prvoideál a $p \neq 0$, tak p je ireducibilný v R .

Dôkaz. Ak (p) je prvoideál a $ab = p$, tak jeden prvok z dvojice a, b musí byť násobkom p (pretože patrí do (p)). Bez ujmy na všeobecnosti, nech $a = kp$. Potom $p = ab = (kp)b$, z čoho $kb = 1$ (lema 4.4.1), čiže b je deliteľ jednotky.

Keďže ideál p je vlastný, p nie je deliteľ jednotky. \square

V OHI platí aj obrátená implikácia.

Tvrdenie 4.4.32. Ak p je ireducibilný prvok v OHI R , tak (p) je prvoideál.

Dôkaz. Nech p je ireducibilný. Ukážeme, že ideál p je maximálny (a teda je to prvoideál). Nech by $(p) \subseteq (m)$. Z toho vyplýva $p = mc$. Potom buď m je asociovaný s p a $(p) = (m)$, alebo m je invertibilný a $(m) = R$. \square

Z toho dostávame (pomocou (4.2)) nasledujúci veľmi dôležitý vzťah.

Dôsledok 4.4.33. V OHI pre ľubovoľný ireducibilný prvok p platí implikácia

$$p \mid ab \quad \Rightarrow \quad p \mid a \vee p \mid b.$$

Teraz už sme schopní vysloviť a dokázať tvrdenie o rozklade na súčin ireducibilných prvkov.

Tvrdenie 4.4.34. Každý okruh hlavných ideálov je okruhom s jednoznačným rozkladom.

Dôkaz. Chceme dokázať existenciu a jednoznačnosť rozkladu na súčin ireducibilných prvkov. Jednoznačnosť vyplýva z dôsledku 4.4.33.

Existencia. Sporom. Nech by x bol taký prvok, ktorý sa nedá v R rozložiť na súčin ireducibilných prvkov (pričom $x \neq 0$, x nie je deliteľ jednotky). Pretože x nie je ireducibilný, vieme ho zapísať ako $x = r_1 \cdot q_1$. Keby obidva prvky r_1 aj q_1 boli ireducibilné, máme rozklad x . Teda jeden z nich nie je ireducibilný, bez ujmy na všeobecnosti nech je to q_1 . Potom $q_1 = r_2 \cdot q_2$ pre nejaké $r_2, q_2 \in R$. Takýmto spôsobom indukciou zostrojíme nekonečnú postupnosť prvkov $r_n \in R$ takú, že nasledujúci vždy delí predchádzajúci, teda $r_{n+1} \mid r_n$. To je ekvivalentné s tým,

že $(r_n) \subseteq (r_{n+1})$ a takto dostávame nekonečnú postupnosť ideálov $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots \subsetneq I_n \subsetneq \dots$, kde I_k označuje ideál (r_k) . Ukážeme, že v OHI takáto postupnosť nemôže existovať, čím dostaneme požadovaný spor.

Skutočne, ak by sme mali takéto rastúci reťazec ideálov. Potom aj $I = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ je ideál. Pretože R je OHI, existuje $a \in R$ také, že $(a) = I$. Lenže z toho, že $a \in \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ vyplýva existencia čísla n_0 s vlastnosťou $a \in I_{n_0}$. Potom pre všetky $n > n_0$ máme $(a) \subseteq I_{n_0} \subseteq I_n \subseteq I$, čiže od n_0 počnúc sa už všetky ideály I_n rovnajú. \square

Poznamenajme, že okruhy, ktoré spĺňajú podmienku, že v nich neexistuje nekonečný rastúci reťazec ideálov, sa nazývajú *noetherovské*.

Z predchádzajúceho tvrdenia špeciálne dostávame, že každé prirodzené číslo vieme napísať ako súčin prvočísel jednoznačne až na poradie. (A po pridaní deliteľov jednotky ± 1 dostaneme všetky prvé čísla.)

Analogickému tvrdeniu pre okruh polynómov $F[x]$ sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole.

Skúsme nájsť príklad oboru integrity, ktorý nie je okruh s jednoznačným rozkladom.

Príklad 4.4.35. Budeme pracovať v okruhu $\mathbb{Z}[2i] = \{a + 2bi; a, b \in \mathbb{Z}\}$. Zrejme ide o obor integrity (je to podokruh poľa \mathbb{C}). Jediné delitele jednotky v tomto okruhu sú ± 1 . Pozrime sa na rozklad $4 = 2 \cdot 2 = (2i)(-2i)$.

Prvky 2 aj $\pm 2i$ sú ireducibilné. Ak totiž máme $2 = ab$, tak platí aj $2 = |a| \cdot |b|$, pričom $|a| = |b|$ sú celé čísla. Potom pre niektoré z čísel a, b musí platiť, že má veľkosť 1. Takéto prvky v $\mathbb{Z}[i]$ sú však iba ± 1 , zistili sme teda, že niektoré z čísel a, b je deliteľ jednotky. Tým sme overili, že 2 je ireducibilný prvok, zdôvodnenie pre $\pm 2i$ je presne rovnaké, opäť využijeme, že $|\pm 2i| = 2$.

Súčasne 2 je asociovaný iba s prvkami ± 2 . Našli sme teda dva rozklady čísla 4 na súčin ireducibilných prvkov, ktoré sa nelíšia iba asociovanosťou. Teda $\mathbb{Z}[2i]$ nie je okruh s jednoznačným rozkladom.

Príklad 4.4.36. Ďalším takýmto príkladom je $\mathbb{Z}[\sqrt{5}i] = \{a + b\sqrt{5}i; a, b \in \mathbb{Z}\}$. V tomto okruhu máme rozklady

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{5}i)(1 - \sqrt{5}i).$$

Vidno, že 2 nedelí žiaden z činiteľov na pravej strane. Ak ukážeme, že 2 je ireducibilný prvok, tak z dôsledku 4.4.33 vyplýva, že to nie je okruh s jednoznačným rozkladom.

Nech $2 = x \cdot y$, kde $x, y \in \mathbb{Z}[\sqrt{5}i]$. Potom $|x| \leq 2$ aj $|y| \leq 2$, lebo všetky prvky tohoto okruhu majú vlastnosť $|x| \geq 1$. Ak $x = a + \sqrt{5}i$, tak sme dostali

$$|x|^2 = a^2 + 5b^2 \leq 4,$$

čo je možné jedine v prípade $b = 0$. Rozklad $2 = x \cdot y$ je teda v skutočnosti rozklad na súčin dvoch celých čísel. V takomto rozklade musí byť nevyhnutne niektorý z činiteľov rovný ± 1 .

Poznamenajme, že podobný spôsobom sa dá ukázať, že aj 3 a $1 \pm \sqrt{5}i$ sú ireducibilné.

Príklad 4.4.37. Dá sa dokázať, že ak R je okruh s jednoznačným rozkladom, tak aj okruh polynómov $R[x]$ je okruh s jednoznačným rozkladom. (Pozri napríklad [KGGs, Lema 7.4.1], [DF, Corollary 9.6]). Ak sme ochotní uveriť tomuto tvrdeniu, tak máme $\mathbb{Z}[x]$ ako príklad Gaussovho okruhu, ktorý nie je okruh hlavných ideálov. (Pozri príklad 4.4.18.)

V prípade, že máme rozklad prvkov a, b Gaussovho okruhu R , môžeme z neho zistiť, či $a \mid b$ ako aj určiť rozklad ich najväčšieho spoločného deliteľa $\gcd(a, b)$.

Lema 4.4.38. *Nech R je Gaussov okruh a $a, b \in R$. Ak $a = p_1 \dots p_n$ a $b = q_1 \dots q_m$ sú rozklady týchto prvkov na súčin ireducibilných činiteľov, tak $a \mid b$ práve vtedy, keď existuje injekcia $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$ s vlastnosťou $q_{f(m)} \sim p_m$.*

(Toto tvrdenie je len formálny zápis faktu, že všetky ireducibilné prvky z rozkladu a sa musia vyskytnúť aj v rozklade b , pričom ak sa tam vyskytuje viackrát prvok z tej istej triedy asociovanosti, tak sa toľkokrát musí vyskytnúť aj v rozklade b .)

Dôkaz. □

Tvrdenie 4.4.39. *Nech R je Gaussov okruh, $a, b \in R \setminus \{0\}$. Majme tieto prvky vyjadrené v tvare $a = up_1^{k_1} \dots p_n^{k_n}$ a $b = u'p_1^{l_1} \dots p_n^{l_n}$, kde $u, u' \in U(R)$ a p_1, \dots, p_n sú po dvoch neasociované ireducibilné prvky v R . Potom*

$$d = p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n},$$

kde $m_i = \min\{k_i, l_i\}$ pre $i = 1, \dots, n$ je ich najväčší spoločný deliteľ.

Dôkaz. □

Cvičenia

Úloha 4.4.1. Ak u je deliteľ jednotky v okruhu R , tak aj $-u$ je deliteľ jednotky.

Úloha 4.4.2.

Úloha 4.4.3. Nech R je euklidovský okruh a S je jeho podokruh, ktorý obsahuje jednotku. Musí byť aj S euklidovský okruh?

Úloha 4.4.4. Dokážte, že okruhy polynómov $\mathbb{Z}[x]$ a $\mathbb{Q}[x]$ nie sú izomorfné.

4.5 Okruhy polynómov II

V tejto časti sa budeme zaoberať polynómami, pričom často budeme využívať niektoré fakty, ktoré sme dokázali v predchádzajúcej podkapitole pre euklidovské okruhy, resp. pre okruhy s jednoznačným rozkladom. (Vieme, že $R[x]$ je euklidovský okruh, ak R je pole. Bez dôkazu sme si spomenuli, že ak R je Gaussov okruh, tak aj $R[x]$ je Gaussov okruh.)

4.5.1 Korene polynómov

Do polynómu $f(x) \in F[x]$ môžeme dosadiť ľubovoľný prvok c poľa F a vypočítať hodnotu polynómu v tomto prvku. (Zobrazenie, ktoré polynómu priradilo jeho hodnotu v c sme nazvali dosadzovací homomorfizmus – definícia 4.3.15.)

Definícia 4.5.1. Nech F je pole a F' je jeho nadpole. Prvok $c \in F'$ nazývame *koreňom* polynómu $f(x) \in F[x] \subset F'[x]$, ak $f(c) = 0$ (t.j. po dosadení c do polynómu F dostaneme 0).

V predchádzajúcej definícii dosadzujeme do polynómu z $F[x]$ prvok z nadpoľa F' . To však nie je problém – keďže koeficienty polynómu $f(x)$ sú z $F \subseteq F'[x]$, tento polynóm súčasne patrí do $F'[x]$.

Príklad 4.5.2. Číslo i je koreňom polynómu $x^2 + 1$, lebo $i^2 + 1 = 0$.

Všimnime si, aký je vzťah medzi koreňmi polynómu a deliteľnosťou lineárnymi polynómami.

Lema 4.5.3. Ak $f(x) \in F[x]$, kde F je pole, a $c \in F$, tak zvyšok polynómu $f(x)$ po delení polynómom $x - c$ je rovný $f(c)$, t.j. existuje polynóm $g(x) \in F[x]$ taký, že

$$f(x) = (x - c)g(x) + f(c). \quad (4.3)$$

Dôkaz. Z vety o delení so zvyškom vieme

$$f(x) = g(x)(x - c) + r,$$

pričom zvyšok je polynóm stupňa menšieho ako 1, preto je to nejaká konštanta $r \in F$.

Ak do predošlej rovnosti dosadíme c za x , tak máme

$$f(c) = g(c)(c - c) + r = r,$$

čiže táto konštanta musí byť rovná práve $f(c)$, t.j. hodnote polynómu f v bode c . \square

Z predchádzajúcej lemy už ľahko dostaneme

Lema 4.5.4. Nech F je pole a F' je jeho nadpole. Nech $f(x) \in F[x]$. Potom $c \in F'$ je koreňom $f(x)$ práve vtedy, keď $x - c \mid f(x)$ v $F'[x]$, t.j. existuje polynóm $g(x) \in F'[x]$ taký, že $f(x) = g(x)(x - c)$.

Dôkaz. Podľa (4.5.3) máme $f(x) = (x - c)g(x) + f(c)$, čiže ak $f(c) = 0$, tak $f(x) = (x - c)g(x)$, čiže $x - c \mid f(x)$.

Obrátene, ak $x - c \mid f(x)$, tak zvyšok po delení polynómu $f(x)$ polynómom $x - c$ je 0, čiže (opäť z lemy 4.5.3) $f(c) = 0$ a c je koreň polynómu f . \square

Definícia 4.5.5. Nech F' je nadpole poľa F , $f(x) \in F[x]$ a c je koreň $f(x)$. Hovoríme, že násobnosť koreňa c je k (alebo tiež, že c je k -násobný koreň $f(x)$), ak $(x - c)^k \mid f(x)$ (t.j. ak existuje polynóm $g(x) \in F'[x]$ taký, že $f(x) = g(x)(x - c)^k$) a súčasne $(x - c)^{k+1} \nmid f(x)$.

Pre $k = 1$ voláme k -násobný koreň *jednoduchý koreň* polynómu $f(x)$, ak $k > 1$ tak hovoríme o násobnom koreni.

Príklad 4.5.6. Čísla ± 1 sú dvojnásobné korene polynómu $x^4 - 2x^2 + 1$, lebo $x^4 - 2x^2 + 1 = (x^2 - 1)^2 = (x - 1)^2(x + 1)^2$

Jednoduchý spôsob ako ručne spočítať hodnotu polynómu v danom čísle (a tým zistiť, či toto číslo je koreňom polynómu) je použitie Hornerovej schémy.

Základná idea Hornerovej schémy je, že hodnotu polynómu môžeme vyjadriť ako

$$\begin{aligned} a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0 &= (a_n c^{n-1} + \dots + a_1) c + a_0 = \\ &= ((\dots (a_n c + a_{n-1}) c + \dots) c + a_1) c + a_0 \end{aligned}$$

Stačí nám teda postupne počítat čísla a_n , $a_n c + a_{n-1}$, $(a_n c + a_{n-1}) c + a_{n-2}$ atď., t.j. predchádzajúci výsledok vždy vynásobíme číslom c a pripočítame k nemu nasledujúci koeficient.

Príklad 4.5.7. Vypočítajte hodnotu polynómu $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 1$ nad poľom \mathbb{R} v bode $c = 2$.

Do tabuľky si zapíšeme koeficienty polynómu (dôležité je nezabudnúť na nulový koeficient pochádzajúci z člena $0x^2$) a postupujeme postupom, ktorý sme naznačili.

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -3 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & & 2 & -2 & -4 & -4 \\ \hline & 1 & -1 & -2 & -2 & \boxed{-5} \end{array}$$

Všimnime sme, že súčasne sme vypočítali, že

$$x^4 - 3x^3 + 2x - 1 = (x^3 - x^2 - 2x - 2)(x - 2) - 5.$$

(Stačí si uvedomiť, že pri Hornerovej schéme vlastne robíme to isté, čo pri algoritme na delenie polynómov.)

Aby sme si uvedomili, čo vlastne v Hornerovej schéme počítame, pokúsme sa ju zapísať o čosi všeobecnejšie (kvôli šírke rozdelené na 2 tabuľky)

$$\begin{array}{c|cccc} & a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots \\ c & & a_n c & (a_n c + a_{n-1})c & \dots \\ \hline & a_n & a_n c + a_{n-1} & a_n c^2 + a_{n-1}c + a_{n-2} & \dots \\ \dots & & a_1 & & a_0 \\ \dots & & \dots & & (a_n c^{n-1} + a_{n-1}c^{n-2} + \dots + a_1)c \\ \dots & a_n c^{n-1} + a_{n-1}c^{n-2} + \dots + a_1 & a_n c^n + a_{n-1}c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0 = f(c) & & \end{array}$$

Príklad 4.5.8. Overte, že 1 je koreňom polynómu $f(x) = x^4 - 3x^3 + 3x - 1 \in \mathbb{R}[x]$. Zistite násobnosť tohoto koreňa.

Budeme postupovať pomocou Hornerovej schémy – pri vypočítaní hodnoty $f(1)$ súčasne nájdeme polynóm $g(x)$ taký, že $f(x) = g(x)(x - 1) + f(1)$. Ak $f(1) = 0$, na zistenie, či ide násobnosť tohoto koreňa je aspoň 2, stačí overiť, či aj $g(1) = 0$. Analogicky postupujeme ďalej, až kým nedostaneme nenulový zvyšok.

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & & 1 & -2 & -2 & 1 \\ \hline & 1 & -2 & -2 & 1 & \boxed{0} \\ 1 & & 1 & -1 & -3 & \\ \hline & 1 & -1 & -3 & \boxed{-2} & \end{array}$$

Zistili sme, že 1 je jednoduchým (jednonásobným) koreňom polynómu $f(x)$ a že

$$f(x) = (x - 1)(x^3 - 2x^2 - 2x + 1),$$

pričom $x - 1 \nmid x^3 - 2x^2 - 2x + 1$.

Rátať korene polynómov je vo všeobecnosti ťažká úloha. Zo strednej školy poznáte vzorec na hľadanie koreňov polynómov druhého stupňa – kvadratických polynómov. (Podobné vzorce, aj keď zložitejšie, sa dajú nájsť aj pre rovnice tretieho a štvrtého stupňa. Vo všeobecnosti však také vzorce neexistujú.) Okrem nich vieme ešte v komplexných číslach riešiť binomické rovnice, t.j. rovnice tvaru $x^n = a$, kde $a \in \mathbb{C}$ (pozri I-B.3.2 alebo [KGGs, kapitola 6.1]).

Povieme si, ako pre polynóm s celočíselnými koeficientami vieme nájsť všetky korene, ktoré sú racionálnymi číslami (t.j. všetky korene daného polynómu ležiace v poli \mathbb{Q}).

4.5.2 Racionálne korene polynómu s celočíselnými koeficientami

Tvrdenie 4.5.9. Ak $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ je polynóm s celočíselnými koeficientami a racionálne číslo $c = \frac{p}{q}$ je koreň $f(x)$ (pričom $\gcd(p, q) = 1$, t.j. racionálne číslo c je zapísané v základnom tvare), tak

$$p \mid a_0 \quad a \quad q \mid a_n.$$

Dôkaz. Ak $c = \frac{p}{q}$ je koreň $f(x)$, tak máme rovnosť

$$f(c) = a_n \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0.$$

Ak túto rovnosť vynásobíme q^n , dostaneme

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

(Všimnime si, že v predchádzajúcej rovnosti vystupujú iba celé čísla.)

Túto rovnosť môžeme upraviť ako

$$-a_n p^n = (a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p q^{n-2} + a_0 q^{n-1}) q,$$

čo znamená, že $q \mid a_n p^n$. Pretože $\gcd(p, q) = 1$ (p a q sú nesúdeliteľné), vyplýva z toho $q \mid a_n$ (dôsledok 4.4.23).

Pri dôkaze toho, že $p \mid a_0$ postupujeme takmer rovnako. Máme

$$-a_0 q^n = (a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} q + \dots + a_1 q^{n-1}) p,$$

čiže $p \mid a_0 q^n$, a teda (na základe nesúdeliteľnosti) $p \mid a_0$. □

Predchádzajúce tvrdenie môžeme použiť na nájdenie všetkých racionálnych koreňov daného polynómu zo $\mathbb{Z}[x]$. Predchádzajúce tvrdenie nám poskytuje obmedzenie na všetkých možných kandidátoch na korene v množine racionálnych čísel. Postupným vyskúšaním nájde všetky korene, ktoré patria do \mathbb{Q} .

Ďalšie obmedzenie, ktoré nám môže pomôcť pri skúšaní jednotlivých možností, nám poskytne nasledujúce pozorovanie (ktorého špeciálnym prípadom je tvrdenie 4.5.9).

Tvrdenie 4.5.10. Nech $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ je polynóm s celočíselnými koeficientami a racionálne číslo $c = \frac{p}{q}$ je koreň $f(x)$ (pričom $\gcd(p, q) = 1$, t.j. racionálne číslo c je zapísané v základnom tvare). Nech $g(x) = b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0$ je polynóm z $\mathbb{Q}[x]$ taký, že

$$f(x) = g(x) \left(x - \frac{p}{q} \right). \quad (4.4)$$

Potom aj $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$, t.j. koeficienty polynómu $g(x)$ sú celočíselné.

Budeme sa snažiť dokázať toto tvrdenie indukciou. Ale začnime tým, že sa pozrieme aspoň na prvé dva prípady - z toho azda budeme vedieť vymyslieť, čo vlastne chceme indukciou dokazovať (čo všetko potrebujeme, aby prešiel indukčný krok).

Dôkaz. V dôkaze budeme samozrejme využívať rovnosť (4.4), ktorá nám vlastne dáva vzťah medzi koeficientami polynómu $f(x)$ a koeficientami polynómu $g(x)$.

Okrem toho budeme často používať to, že vieme

$$a_n \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0. \quad (4.5)$$

Pre najvyšší koeficient polynómu $g(x)$ platí $b_{n-1} = a_n$.

Všimnime si tiež, že z rovnosti (4.5) máme

$$b_{n-1} \frac{p^n}{q^n} = -a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} - \cdots - a_1 \frac{p}{q} - a_0.$$

Ak túto rovnosť prenásobíme q^n , tak máme

$$b_{n-1} p^n = -(a_{n-1} p^{n-1} + a_{n-2} p^{n-2} q \cdots + a_1 p q^{n-2} + a_0 q^{n-1}) q.$$

Pretože výraz v zátvorke je celé číslo, máme $q \mid b_{n-1} p^n$. Z toho, že p a q sú nesúdeliteľné, dostávame $q \mid b_{n-1}$. (Vlastne sme zatiaľ iba zopakovali úvahu z dôkazu tvrdenia 4.5.9. Ale asi sa ju oplatí zopakovať, keďže podobnú úvahu budeme používať aj ďalej.)

Pozrime sa na ďalší koeficient. Tento koeficient môžeme vyjadriť ako

$$b_{n-2} = b_{n-1} \frac{p}{q} + a_{n-1} = a_n \frac{p}{q} + a_{n-1}.$$

(Prvú rovnosť dostaneme z Hornerovej schémy. Alebo tiež z porovnania koeficientov pri x^{n-1} v polynómoch $f(x)$ a $g(x) \left(x - \frac{p}{q}\right)$ vidíme, že $a_{n-1} = b_{n-2} - b_{n-1} \frac{p}{q}$.)

Pozrime sa na výraz

$$b_{n-2} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} = a_n \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}},$$

ktorý môžeme použitím (4.5) prepísať do tvaru

$$b_{n-2} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} = -a_{n-2} \frac{p^{n-2}}{q^{n-2}} - \cdots - a_1 \frac{p}{q} - a_0.$$

Opäť stačí túto rovnosť vynásobiť q^{n-1} a dostaneme

$$b_{n-2} p^{n-1} = -(a_{n-2} p^{n-2} + a_{n-3} p^{n-3} q \cdots + a_1 p q^{n-3} + a_0 q^{n-2}) q.$$

A podobne ako pri predošlom koeficiente, z toho, že p a q sú nesúdeliteľné máme $q \mid b_{n-2}$.

Teraz sa už dá uhádnuť, že sa zrejme budeme snažiť indukciou dokázať tieto dve veci pre $k = 1, \dots, n-1$: Platí rovnosť

$$b_{n-k} = a_n \frac{p^{k-1}}{q^{k-1}} + a_{n-1} \frac{p^{k-2}}{q^{k-2}} + \cdots + a_{n-k+1} \tag{4.6}$$

a navyše platí, že b_{n-k} je celé číslo, ktoré je deliteľné číslom q .

Indukčný krok bude vyzeráť takto: Predpokladáme, že uvedené tvrdenie platí pre k , pričom $k < n-1$. Chceme dokázať, že platí aj pre $k+1$. Máme rovnosť

$$b_{n-(k+1)} = b_{n-k} \frac{p}{q} + a_{n-k}.$$

Ak za b_{n-k} dosadíme výraz, ktorý máme z indukčného predpokladu, tak dostaneme

$$\begin{aligned} b_{n-(k+1)} &= \left(a_n \frac{p^{k-1}}{q^{k-1}} + a_{n-1} \frac{p^{k-2}}{q^{k-2}} + \cdots + a_{n-k+1} \right) \frac{p}{q} + a_{n-k} \\ &= a_n \frac{p^k}{q^k} + a_{n-1} \frac{p^{k-1}}{q^{k-1}} + \cdots + a_{n-k+1} \frac{p}{q} + a_{n-k} \end{aligned}$$

Teda aj pre $k + 1$ platí rovnosť (4.6).

Po vynásobení predošlej rovnosti číslom $\frac{p^{n-k}}{q^{n-k}}$ máme

$$b_{n-(k+1)} \frac{p^{n-k}}{q^{n-k}} = a_n \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \cdots + a_{n-k+1} \frac{p^{n-k+1}}{q^{n-k+1}} + a_{n-k} \frac{p^{n-k}}{q^{n-k}}.$$

z čoho použitím (4.5) dostaneme

$$b_{n-(k+1)} \frac{p^{n-k}}{q^{n-k}} = -a_{n-k-1} \frac{p^{n-k-1}}{q^{n-k-1}} - a_{n-k-2} \frac{p^{n-k-2}}{q^{n-k-2}} - \cdots - a_1 \frac{p}{q} - a_0.$$

Opäť stačí túto rovnosť vynásobiť číslom q^{n-k} a máme

$$b_{n-(k+1)} p^{n-k} = (-a_{n-k-1} p^{n-k-1} - a_{n-k-2} p^{n-k-2} q - \cdots - a_1 p q^{n-k-2} - a_0 q^{n-k-1}) q.$$

A znovu si stačí všimnúť, že číslo v zátvorke na pravej strane rovnosti je celé, čiže pravá strana je násobok q . Na základe toho, že p a q sú nesúdeliteľné, dostaneme $q \mid b_{n-(k+1)}$. \square

Z predchádzajúceho tvrdenia vyplýva, že ak overujeme, či nejaké racionálne číslo je koreňom polynómu s celočíselnými koeficientami, v okamihu, keď nám v priebehu výpočtu vyjde v spodnom riadku zlomok, už nemusíme rátať ďalej. (Vieme totiž, že čísla v spodnom riadku Hornerovej schémy sú presne koeficienty polynómu $g(x)$, teda ak je dané racionálne číslo koreňom, musia všetky tieto koeficienty podľa predchádzajúceho tvrdenia byť celé čísla.)

Ukážme si teda hľadanie racionálnych koreňov daného polynómu zo $\mathbb{Z}[x]$ na konkrétnom príklade.

Príklad 4.5.11. Nájdite racionálne korene polynómu $f(x) = 24x^5 + 10x^4 - x^3 - 19x^2 - 5x + 6$ (aj s násobnosťami).

Podľa tvrdenia 4.5.9 má platiť $p \mid 6$, $q \mid 24$. Dostávame teda možnosti:

$$p \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$$

$$q \in \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

$$\frac{p}{q} \in \{\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \dots\}$$

(Pre q nám stačí skúšať kladné hodnoty, pretože voľba znamienok pre číslo p nám zabezpečí obidve možnosti – kladné aj záporné korene.)

Začnime najprv skúšať tých kandidátov na korene, kde čitateľ je ± 1 .

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 24 & 10 & -1 & -19 & -5 & 6 \\ & & 24 & 34 & 33 & 14 & 9 \\ \hline & 24 & 34 & 33 & 14 & 9 & \boxed{15} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -1 & 24 & 10 & -1 & -19 & -5 & 6 \\ & & -24 & 14 & -13 & 32 & -27 \\ \hline & 24 & -14 & 13 & -32 & 27 & \boxed{-21} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} \frac{1}{2} & 24 & 10 & -1 & -19 & -5 & 6 \\ & & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ \hline & 24 & 22 & 10 & -14 & -12 & \boxed{0} \\ \frac{1}{2} & & 12 & 17 & \frac{27}{2} & & \\ \hline & 24 & 34 & 27 & -\frac{1}{2} & \neq 0 & \end{array}$$

Zistili sme, že $\frac{1}{2}$ je jednoduchý koreň polynómu $f(x)$. (V poslednom výpočte sme nerátali do konca – zastavili sme sa pri zlomku $-\frac{1}{2}$.)

Mohli by sme pokračovať v skúšaní možností ďalej, trochu nám však zjednoduší prácu, ak si uvedomíme, že všetky ďalšie korene musia byť koreňmi polynómu $g(x) = 24x^4 + 22x^3 + 10x^2 - 14x - 12$. (Tento polynóm je podiel polynómu $f(x)$ a polynómu $x - \frac{1}{2}$, jeho koeficienty vieme vyčítať z predchádzajúcej Hornerovej schémy.)

Každý koeficient tohoto polynómu je párny – môžeme teda celý polynóm vydeliť číslom 2 a dostaneme polynóm $12x^4 + 11x^3 + 5x^2 - 7x - 6$, ktorý má tiež celočíselné koeficienty a má rovnaké korene ako $g(x)$. Keď hľadáme racionálne korene tohoto polynómu, dostávame pre čitateľ a menovateľ podmienky $p \mid 6$, $q \mid 12$, čiže

$$p \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$$

$$q \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

$$\frac{p}{q} \in \{\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{4}, \dots\}$$

Pritom samozrejme čísla, ktoré sme už vyskúšali pre $f(x)$, pre polynóm $g(x)$ skúšať nemusíme. Získali sme teda dve zjednodušenia – budeme pracovať s polynómom nižšieho stupňa a máme menej možností, ktoré treba vyskúšať.

$$\begin{array}{r|rrrrr} -\frac{1}{2} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & -6 & -\frac{5}{2} & & \\ \hline & 12 & 5 & \frac{5}{2} & & \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} \frac{1}{3} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & 4 & 5 & \frac{10}{3} & \\ \hline & 12 & 15 & 10 & -\frac{11}{3} & \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} -\frac{1}{3} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & -4 & -\frac{7}{3} & & \\ \hline & 12 & 7 & -\frac{28}{3} & & \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} \frac{1}{4} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & 3 & \frac{14}{4} & & \\ \hline & 12 & 14 & & & \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} -\frac{1}{4} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & -2 & \frac{9}{4} & & \\ \hline & 12 & 9 & & & \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} \frac{1}{6} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & 2 & \frac{13}{6} & & \\ \hline & 12 & 13 & & & \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} -\frac{1}{6} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & -2 & \frac{9}{6} & & \\ \hline & 12 & 9 & & & \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & 24 & 70 & 150 & 286 \\ \hline & 12 & 35 & 75 & 143 & \boxed{280} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\ & & -24 & 26 & -62 & 138 \\ \hline & 12 & -13 & 31 & -69 & \boxed{132} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 \frac{2}{3} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\
 & & 8 & \frac{38}{3} & & \\
 \hline
 & 12 & 19 & & & \neq 0 \\
 \\
 \frac{-2}{3} & 12 & 11 & 5 & -7 & -6 \\
 & & -8 & -2 & -2 & 6 \\
 \hline
 & 12 & 3 & 3 & -9 & \boxed{0} \\
 \frac{-2}{3} & & -8 & \frac{10}{3} & & \\
 \hline
 & 12 & -5 & & & \neq 0
 \end{array}$$

Dostali sme ďalší jednoduchý koreň $-\frac{2}{3}$. Nový polynóm, s ktorým budeme pracovať, je $h(x) = 12x^3 + 3x^2 + 3x - 9$. Po vydelení koeficientov číslom 3 dostaneme jednoduchší polynóm $4x^3 + x^2 + x - 3$ a podmienky pre korene $p \mid 3, q \mid 4$, čiže

$$p \in \{\pm 1, \pm 3\}$$

$$q \in \{1, 2, 4\}$$

$$\frac{p}{q} \in \{\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm 3, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{3}{4}\}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 3 & 4 & 1 & 1 & -3 \\
 & & 12 & 39 & 120 \\
 \hline
 & 4 & 13 & 40 & \boxed{117}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 -3 & 4 & 1 & 1 & -3 \\
 & & -12 & 33 & -102 \\
 \hline
 & 4 & -11 & 34 & \boxed{-105}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 \frac{3}{2} & 4 & 1 & 1 & -3 \\
 & & 6 & \frac{21}{2} & \\
 \hline
 & 4 & 7 & & \neq 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 -\frac{3}{2} & 4 & 1 & 1 & -3 \\
 & & -6 & -\frac{15}{2} & \\
 \hline
 & 4 & -5 & & \neq 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 \frac{3}{4} & 4 & 1 & 1 & -3 \\
 & & 3 & 3 & 3 \\
 \hline
 & 4 & 4 & 4 & \boxed{0} \\
 \frac{3}{4} & & 3 & \frac{21}{4} & \\
 \hline
 & 4 & 7 & & \neq 0
 \end{array}$$

Našli sme ďalší jednoduchý koreň $\frac{3}{4}$

Ďalej môžeme pracovať s polynómom $x^2 + x + 1$. Tu sú však jediní možní kandidáti na korene čísla ± 1 a tie sme už vyskúšali.

Záver: Daný polynóm má tieto 3 racionálne korene: $\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}$; násobnosť každého z nich je 1.

Všimnime si, že sme vlastne súčasne dostali, že

$$f(x) = 24x^5 + 10x^4 - x^3 - 19x^2 - 5x + 6 = 24(x - \frac{1}{2})(x + \frac{2}{3})(x - \frac{3}{4})(x^2 + x + 1).$$

(Pri poslednom delení nám vyšiel podiel $4(x^2 + x + 1)$ a v priebehu výpočtu sme polynóm vydělili raz číslom 2 a raz číslom 3.) Predchádzajúcu rovnosť môžeme tiež prepísať ako

$$f(x) = (2x - 1)(3x + 2)(4x - 3)(x^2 + x + 1).$$

Pozrime sa na to, ako z tvrdenia 4.5.9 vyplýva, že $\sqrt{2}$ nie je racionálne číslo.

Príklad 4.5.12. Číslo $\sqrt{2}$ je očividne koreňom polynómu $p(x) = x^2 - 2$.

Ak by tento polynóm mal racionálny koreň, tak na základe tvrdenia 4.5.9 to môže byť jedine niektoré z čísel $\pm 1, \pm 2$. Lahko skontrolujeme, že čísla ± 1 ani ± 2 nevyhovujú danej rovnici.

Teda polynóm $p(x)$ nemá racionálne korene a číslo $\sqrt{2}$ je iracionálne.

Môžete si všimnúť, že zdôvodnenie z tohoto príkladu prejde bez zmeny ak číslo 2 nahradíme ľubovoľným prvočíslom.

4.5.3 Algebraicky uzavreté polia

Definícia 4.5.13. Pole F sa nazýva *algebraicky uzavreté*, ak každý polynóm $f(x) \in F[x]$ stupňa aspoň jedna má v poli F aspoň jeden koreň.

V prípade, že $f(x)$ má koreň c , môžeme ho vydeliť koreňovým činiteľom $x - c$ a dostaneme jeho deliteľ nižšieho stupňa. Ten opäť musí mať nejaký koreň (ak nie je konštantný), preto takýmto spôsobom postupne dostaneme rozklad polynómu $f(x)$ na koreňové činitele. Dostávame:

Tvrdenie 4.5.14. *Ak F je algebraicky uzavreté pole, tak každý polynóm $f(x)$ je v $F[x]$ rozložiteľný na koreňové činitele.*

Z toho ďalej vidno, že ak F je algebraicky uzavreté pole, tak súčet násobností koreňov polynómu $f(x)$ je rovný jeho stupňu. (Toto tvrdenie sa zvyčajne formuluje tak, že polynóm stupňa n má práve n koreňov, ak zarátame aj ich násobnosti.)

Vieme, že pole komplexných čísel \mathbb{C} má túto vlastnosť (aj keď dôkaz tejto vety nie je jednoduchý).

Veta 4.5.15 (Základná veta algebr). *Pole komplexných čísel \mathbb{C} je algebraicky uzavreté.*

Spomeňme (opäť bez dôkazu), že ku každému polu sa dá zostrojiť nadpole, v ktorom už každý polynóm z $F[x]$ bude mať koreň. Dokonca platí:

Veta 4.5.16 (Steinitz). *Pre každé pole F existuje algebraicky uzavreté nadpole F' .*

Všimnime si ešte jednu užitočnú vlastnosť komplexných koreňov polynómov s reálnymi koeficientami.

Tvrdenie 4.5.17. *Ak $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ je polynóm s reálnymi koeficientami a $z = a + bi \in \mathbb{C}$ je koreň polynómu $f(x)$, tak aj komplexne združené číslo $\bar{z} = a - bi$ je koreňom polynómu $f(x)$. Pritom násobnosť koreňa \bar{z} je rovnaká ako násobnosť z .*

Dôkaz. Stačí si všimnúť, že zobrazenie $z \mapsto \bar{z}$ je homomorfizmus (súčet/súčin komplexne združených čísel je komplexne združené číslo k súčtu/súčinu) a že pre $z \in \mathbb{R}$ platí $\bar{z} = z$. Z toho potom dostávame rovnosť

$$\overline{f(z)} = \overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0} = a_n (\bar{z})^n + a_{n-1} (\bar{z})^{n-1} + \dots + a_0 = f(\bar{z})$$

pre ľubovoľné $z \in \mathbb{C}$.

Z tejto rovnosti špeciálne vyplýva, že ak $f(z) = 0$, tak aj $f(\bar{z}) = 0$.

Druhá časť vyplýva z prvej použitej pre polynóm zapísaný v tvare $f(x) = g(x)(x - z)^k$, kde k je násobnosť koreňa z . \square

Veľmi prirodzeným zovšeobecnením tohoto výsledku je tvrdenie sformulované v úlohe 4.5.1.

Dôsledok 4.5.18. Každý polynóm $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ nepárneho stupňa má aspoň 1 reálny koreň.

Dôkaz. Ak by polynóm mal iba komplexné korene, tak môžeme popárovať dvojice komplexne združených koreňov. Komplexne združené korene majú podľa predchádzajúceho tvrdenia rovnakú násobnosť. Preto súčet násobností všetkých komplexných koreňov je párne číslo. Súčet násobností sa však rovná stupňu polynómu $f(x)$ (pretože \mathbb{C} je algebraicky uzavreté pole). \square

4.5.4 Ireducibilné polynómy

Definícia 4.5.19. Polynóm $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ sa nazýva *normovaný* (alebo tiež *monický*), ak $a_n = 1$ (vedúci koeficient sa rovná 1).

Definícia 4.5.20. Ak R je obor integrity, tak ireducibilné prvky okruhu $R[x]$ nazývame *ireducibilné polynómy* v $R[x]$.

V prípade, že ide o pole, tak z predchádzajúcej kapitoly vieme, že $F[x]$ je euklidovský okruh (a teda je to aj okruh hlavných ideálov a okruh s jednoznačným rozkladom). Tento fakt nám umožní používať všetky výsledky z predchádzajúcej kapitoly aj pre polynómy nad nejakým poľom.

Veta 4.5.21 (Rozklad na ireducibilné polynómy). Ak F je pole, tak každý polynóm $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ možno vyjadriť v tvare

$$f(x) = a_n p_1(x) \dots p_n(x),$$

kde p_1, \dots, p_n sú ireducibilné normované polynómy. Navyše, tento rozklad je (až na poradie činiteľov) jednoznačne určený.

Dôkaz. Pretože $F[x]$ je okruh s jednoznačným rozkladom, vieme, že každý polynóm sa dá rozložiť na súčin ireducibilných polynómov a ten rozklad je jednoznačný až na asociovanosť. V okruhu $F[x]$ sú dva prvky asociované práve vtedy, keď sa líšia iba konštantným násobkom. Tým, že vo vete požadujeme normované polynómy, sú teda už jednoznačne určené (z ľubovoľného polynómu dostaneme normovaný, keď ho vynásobíme b_m^{-1} , kde b_m je jeho vedúci koeficient; súčin vedúcich koeficientov sme dali pred súčin normovaných činiteľov – tento súčin sa rovná a_n). \square

Zatiaľ však o ireducibilných polynómoch vieme iba to, že existujú – nevieme, ako overiť, či je daný polynóm ireducibilný ani ako rozklad na súčin ireducibilných polynómov hľadať.

Je zrejmé, že každý polynóm stupňa 1 je ireducibilný – nedá sa rozložiť na súčin polynómov nižších stupňov. Teda ak c je k -násobný koreň, v rozklade polynómu $f(x)$ sa musí vyskytnúť $(x - c)^k$. V prípade, že súčet násobností koreňov je rovný stupňu polynómu vieme teda ten polynóm rozložiť ako

$$f(x) = a_n (x - c_1)^{k_1} (x - c_2)^{k_2} \dots (x - c_m)^{k_m},$$

kde c_1, \dots, c_m sú všetky korene $f(x)$ a k_1, \dots, k_m sú ich násobnosti. Takýto rozklad (ak existuje) voláme rozklad na súčin *koreňových činiteľov*.

V niektorých prípadoch vieme o ireducibilite rozhodnúť, ak poznáme korene polynómu.

Tvrdenie 4.5.22. Ak F je pole a $f(x) \in F[x]$ je polynóm stupňa 2 alebo 3, tak polynóm $f(x)$ je ireducibilný v F práve vtedy, keď $f(x)$ nemá koreň v F .

Dôkaz. Stačí si všimnúť, že ak chceme polynóm stupňa 2 alebo 3 rozložiť ako súčin polynómov nižších stupňov, nevyhnutne sa tam musí vyskytnúť polynóm stupňa 1. Z lemy 4.5.4 vieme, ako súvisia lineárne delitele polynómu a jeho korene. \square

Všimnime si, že ireducibilita polynómu závisí od toho, nad akým poľom ho uvažujeme (pretože polynóm nad poľom F môžeme súčasne chápať aj ako polynóm nad ľubovoľným nadpoľom $F' \supseteq F$).

Príklad 4.5.23. Uvažujme polynóm $f(x) = x^4 + 1$. Tento polynóm má celočíselné koeficienty, môžeme sa teda skúmať jeho ireducibilitu v okruhoch polynómov $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]$ aj $\mathbb{C}[x]$.

V poli \mathbb{C} má tento polynóm 4 korene $\frac{\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i}{2}$ (vieme ich nájsť riešením binomickej rovnice $x^4 = -1$). Teda v \mathbb{C} máme rozklad

$$x^4 + 1 = \left(x - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}i}{2}\right) \left(x - \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}i}{2}\right) \left(x + \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}i}{2}\right) \left(x + \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}i}{2}\right)$$

Nad poľom \mathbb{R} máme rozklad

$$x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1).$$

(Polynómy v rozklade môžeme získať napríklad ako súčin koreňových činiteľov pre komplexne združené korene. Alebo tento rozklad môžeme dostať tak, že si všimneme rovnosť $x^4 + 1 = (x^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}x)^2$.) Pritom oba polynómy $x^2 \pm \sqrt{2}x + 1$ sú už nad \mathbb{R} nerozložiteľné – pretože nemajú reálne korene.

Nad poľom \mathbb{Q} je tento polynóm ireducibilný. Ak by sa totiž dal rozložiť na súčin nejakých polynómov, bol by súčasne aj súčinom týchto polynómov v $\mathbb{R}[x]$. Ako sme však videli, jediný (až na poradie a asociovanosť) rozklad na súčin polynómov nižšieho stupňa v $\mathbb{R}[x]$ je $x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$ a polynómy, ktoré vystupujú v tomto rozklade, nepatria do $\mathbb{Q}[x]$.

4.5.5 Ireducibilné polynómy nad \mathbb{Q} a \mathbb{R}

Z toho, čo doteraz vieme, sme schopní aspoň v niektorých konkrétnych prípadoch nájsť rozklad daného polynómu na súčin ireducibilných polynómov.

Postupovať môžeme tak, že hľadáme korene polynómu – pomocou hľadania racionálnych koreňov, riešením kvadratickej alebo binomickej rovnice (prípadne iných typov rovníc, ktoré vieme riešiť, ako sú recipročné rovnice, bikvadratické rovnice, kubické rovnice, rovnice štvrtého stupňa). Po nájdení koreňov môžeme polynóm vydeliť koreňovými činiteľmi (a znovu sa pokúsiť riešiť novú rovnicu nižšieho stupňa než bola pôvodná). V prípade, že by polynóm mal násobné korene, dá sa znížiť jeho stupeň použitím derivácie – o tom si ešte v tejto kapitole povieme.

V prípade, že po vydelení dostaneme polynóm dostatočne nízkeho stupňa, ktorý nemá korene, vieme už, že je ireducibilný.

Príklad 4.5.24. V príklade 4.5.11 sme zistili, že

$$f(x) = 24x^5 + 10x^4 - x^3 - 19x^2 - 5x + 6 = 24 \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x + \frac{2}{3}\right) \left(x - \frac{3}{4}\right) (x^2 + x + 1).$$

Pretože polynóm $x^2 + x + 1$ nemá reálne korene (a je to polynóm druhého stupňa), je to rozklad na ireducibilné polynómy nad \mathbb{R} (a tým pádom aj nad \mathbb{Q}). Rozklad nad \mathbb{C} by sme získali, keby sme ešte $x^2 + x + 1$ rozložili na ireducibilné činitele.

Všimnime si, že sme vlastne dostali aj rozklad

$$f(x) = (2x - 1)(3x + 2)(4x - 3)(x^2 + x + 1)$$

v $\mathbb{Z}[x]$.

Viac o rozklade polynómov na ireducibilné činitele (a o algoritmoch používaných na jeho výpočet) sa môžete dozvedieť na predmete počítačová algebra, pozri napríklad [G1, G2].

4.5.6 Derivácia a Taylorov rozvoj polynómov

Definícia 4.5.25. Formálna derivácia polynómu $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ je polynóm $Df(x) = \sum_{k=1}^n k \times a_k x^{k-1}$.

V prípade, že pracujeme nad ľubovoľným poľom, môže sa stať, že nenulový polynóm má nulovú deriváciu.

Príklad 4.5.26. Pre $f(x) = x^p$ v $\mathbb{Z}_p[x]$ dostávame $Df(x) = p \times x^{p-1} = 0$.

Priamo z definície sa dá overiť, že takto definovaná formálna derivácia má podobné vlastnosti, na aké sme zvyknutí z analýzy.

Tvrdenie 4.5.27. Nech F je pole. Pre ľubovoľné $c \in F$, $f(x), g(x) \in F[x]$ platí

$$\begin{aligned} D(f(x) + g(x)) &= Df(x) + Dg(x) \\ D(cf(x)) &= cDf(x) \\ D(f(x)g(x)) &= Df(x).g(x) + f(x).Dg(x) \end{aligned}$$

Dôkaz. Overme iba tretiu rovnosť (prvé dve sú skutočne jednoduché). Koeficient pri x^n v polynóme na ľavej strane tejto rovnosti je $(n+1)$ -násobok koeficientu polynómu $f(x).g(x)$ pri x^n .

Označme koeficienty polynómu $f(x)$ ako a_k , koeficienty polynómu $g(x)$ ako b_k . Pre koeficienty polynómu na ľavej strane rovnosti potom máme

$$l_n = (n+1) \times \sum_{k=0}^{n+1} a_k b_{n+1-k}$$

Na pravej strane rovnosti dostávame

$$p_n = \sum_{k=0}^n (k+1) \times a_{k+1} b_{n-k} + \sum_{k=0}^n (n+1-k) \times a_k b_{n+1-k}.$$

Zmenou sumačného indexu v prvej sume dostaneme vyjadrenie

$$p_n = \sum_{k=1}^{n+1} k \times a_k b_{n+1-k} + \sum_{k=0}^n (n+1-k) \times a_k b_{n+1-k} = \sum_{k=0}^{n+1} (n+1) \times a_k b_{n+1-k} = l_n$$

(aby sme uvedené členy mohli zlúčiť do jednej sumy, pridali sme dva nulové členy – v prvej sume pre $k=0$ člen $0 \times a_0 b_{n+1}$ a v druhej sume pre $k=n+1$ člen $0 \times a_{n+1} b_0$). \square

Uvedieme si dve tvrdenia, ktoré ukazujú, prečo je tento pojem užitočný – prvé z nich je vyjadrenie Taylorovho polynómu v nejakom $c \in F$; druhé z nich hovorí o tom, či nejaký polynóm má násobné korene.

Tvrdenie 4.5.28. *Nech F je pole, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in F[x]$. Potom existujú jednoznačne určené $b_0, b_1, \dots, b_n \in F$ také, že*

$$f(x) = b_n(x-c)^n + \dots + b_1(x-c) + b_0. \quad (4.7)$$

Dôkaz. Indukciou vzhľadom na n . Ak $n = 0$, tak stačí položiť $a_0 = b_0$ (a inú možnosť očividne nemáme).

Predpokladajme, že uvedené tvrdenie platí pre polynómy stupňa najviac $n-1$. Podľa lemy 4.5.3

$$f(x) = g(x)(x-c) + f(c). \quad (4.8)$$

Polynóm $g(x)$ je stupňa najviac $n-1$. Podľa indukčného predpokladu existujú $b_1, \dots, b_n \in F$ také, že $g(x) = b_n(x-c)^{n-1} + \dots + b_2(x-c) + b_1$. Položme $b_0 = f(c)$. Potom pre $f(x)$ platí

$$f(x) = (b_n(x-c)^{n-1} + \dots + b_2(x-c) + b_1)(x-c) + b_0 = b_n(x-c)^n + \dots + b_1(x-c) + b_0.$$

Tým máme dokázanú existenciu.

Ak dosadíme do rovnosti (4.7) $x = c$, tak vidíme, že $b_0 = f(c)$. Ďalej polynóm $g(x)$ z (4.8) je podľa vety o delení so zvyškom jednoznačne určený. K tomuto polynómu sú podľa indukčného predpokladu jednoznačne určené $b_1, b_2, \dots, b_n \in F$. \square

Tvrdenie 4.5.29. *Ak F je pole charakteristiky ∞ , tak koeficienty b_0, \dots, b_n z tvrdenia 4.5.28 možno vyjadriť ako*

$$b_n = \frac{D^{(n)}f(c)}{n!},$$

kde znak $D^{(n)}$ znamená, že polynóm $f(x)$ zderivujeme n -krát.

Dôkaz. Toto tvrdenie dostaneme priamo z rovnosti (4.7) viacnásobným zderivovaním (resp. ho môžeme ukázať pomocou indukcie). \square

Rozvoj v tvare (4.7) môžeme dostať aj pomocou Hornerovej schémy – teda Hornerova schéma nám poskytuje možnosť vypočítať hodnoty $D^{(n)}f(c)$ pre daný polynóm $f(x)$ a $c \in F$.

Pred dôkazom nasledujúceho tvrdenia si všimnime jednu dôležitú vlastnosť najväčšieho spoločného deliteľa – konkrétne fakt, že zostane taký istý, aj keď prejdeme k nejakému nadpoľu.

Poznámka 4.5.30. Už sme spomínali, že ak $f(x), g(x) \in F[x]$ a $F' \supseteq F$ je nadpole poľa F , tak polynómy $f(x)$ a $g(x)$ sú súčasne aj prvkami $F'[x]$. To znamená, že sa môžeme pýtať na najväčší spoločný deliteľ týchto 2 polynómov v okruhu $F[x]$ i v okruhu $F'[x]$. V oboch prípadoch je tento polynóm rovnaký.

Vyplýva to z toho, že podiel a zvyšok pri delení dvoch polynómov z $F[x]$ vyjde rovnako, bez ohľadu na to, či delíme so zvyškom v $F[x]$ alebo v $F'[x]$. (V $F[x]$ sa dajú vydeliť tak, aby podiel i zvyšok mali koeficienty z F , podiel v $F'[x]$ je rovnaký, pretože vo vete o delení so zvyškom máme jednoznačnosť.)

Z toho vyplýva aj to, že relácia „delí“ nezávisí od toho, či sa na polynómy $f(x), g(x)$ pozeráme ako na prvky $F[x]$ alebo ako na prvky $F'[x]$.

Tvrdenie 4.5.31. *Nech F je pole, $F' \supseteq F$ je jeho nadpole. Nech $f(x) \in F[x]$ je polynóm nad poľom F . Ak v nadpoľi F' existuje násobný koreň polynómu $f(x)$, tak polynómy $f(x)$ a $Df(x)$ sú súdeliteľné, t.j.*

$$\text{st}(\text{gcd}(f(x), D(f(x)))) \geq 1.$$

Dôkaz. Ak c je násobný koreň $f(x)$, tak podľa definície 4.5.5 $f(x) = g(x)(x-c)^k$, kde $k > 1$. Potom

$$Df(x) = Dg(x)(x-c)^k + k \times g(x)(x-c)^{k-1} = (x-c)^{k-1}(Dg(x)(x-c) + k \times g(x)),$$

teda $x-c \mid Df(x)$. Keďže súčasne $x-c \mid f(x)$, máme

$$x-c \mid \gcd(f(x), Df(x))$$

a $\text{st}(\gcd(f(x), Df(x))) \geq 1$. (Predchádzajúcu nerovnosť sme dokázali pre najväčší spoločný deliteľ v $F[x]$. Na základe poznámky 4.5.30 je však najväčší spoločný deliteľ v $F[x]$ rovnaký.) \square

Predchádzajúce tvrdenie nám umožní nájsť polynóm, ktorý má rovnaké korene ako daný polynóm, ale každý koreň má násobnosť 1. Pred uvedením tohoto výsledku však potrebujeme zaviesť pojem charakteristiky poľa.

Definícia 4.5.32. *Charakteristika poľa F je najmenšie prirodzené číslo $k > 0$ s vlastnosťou $k \times 1 = 0$. Označujeme ju $\text{char}(F)$. Ak neexistuje k s uvedenou vlastnosťou, tak definujeme $\text{char}(F) = \infty$.*

Ak $\text{char}(F) = k$, tak pre každé $c \in F$ platí $k \times c = c.(k \times 1) = c.0 = 0$.

Tvrdenie 4.5.33. *Nech F je pole s nekonečnou charakteristikou. Nech $f(x) \in F[x]$ a $h(x)$ je najväčší spoločný deliteľ $f(x)$ a $Df(x)$. Potom existuje polynóm $g(x)$ s vlastnosťami*

- (i) $f(x) = g(x).h(x)$,
- (ii) $g(x)$ má v každom nadpoli poľa F tie isté korene ako $f(x)$,
- (iii) násobnosť každého koreňa $g(x)$ je 1.

Dôkaz. Pretože $\text{char}(F) = \infty$, máme $Df(x) \neq 0$. (Vedúci koeficient $Df(x)$ je $n \times a_n$, kde a_n je vedúci koeficient $f(x)$. V poli s nekonečnou charakteristikou z $a \neq 0$ vyplýva $n \times a \neq 0$.)

Potom aj $h(x)$ je nenulový polynóm. Navyše $h(x) \mid f(x)$, takže pri delení so zvyškom dostaneme

$$f(x) = g(x)h(x) + 0.$$

Ak c je násobný koreň $f(x)$ s násobnosťou k , tak platí $f(x) = (x-c)^k f_1(x)$, pričom c nie je koreňom $f_1(x)$. Z predchádzajúcej rovnosti dostaneme

$$Df(x) = Df_1(x)(x-c)^k + k \times f_1(x)(x-c)^{k-1} = (x-c)^{k-1}(Df_1(x)(x-c) + k \times f_1(x)).$$

Potom

$$h(x) = \gcd(f(x), Df(x)) = (x-c)^{k-1} \gcd((x-c)f_1(x), Df_1(x)(x-c) + k \times f_1(x)).$$

Pritom $x-c \nmid f_1(x)$, z čoho vyplýva $x-c \nmid Df_1(x)(x-c) + k \times f_1(x)$ a

$$x-c \nmid \gcd((x-c)f_1(x), Df_1(x)(x-c) + k \times f_1(x)).$$

Teda

$$(x-c)^k \nmid h(x)$$

(c je len $k - 1$ -násobným koreňom $h(x)$). T.j., ak vyjadríme $h(x)$ v tvare $h(x) = (x - c)^{k-1}h_1(x)$, tak $x - c \nmid h(x)$. Potom máme

$$\begin{aligned} (x - c)^k \mid g(x)h(x) &= g(x)h_1(x)(x - c)^{k-1} \\ x - c \mid g(x)h_1(x) \end{aligned}$$

Pretože $x - c$ je ireducibilný a $x - c \nmid h_1(x)$, vyplýva z toho už $x - c \mid g(x)$, čiže c je koreňom $g(x)$.

Navyše, c je iba jednoduchý koreň $g(x)$, v opačnom prípade by sme mali $(x - c)^2 \mid g(x)$, a teda

$$(x - c)^{k+1} \mid g(x)h_1(x - c)^{k-1} = g(x)h(x) = f(x).$$

To je spor s tým, že násobnosť koreňa c je k . □

Príklad 4.5.34. Majme polynóm $f(x) = x^4 + 2x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Potom $Df(x) = 4x^3 + 4x$ a ich normovaný najväčší spoločný deliteľ je

$$h(x) = \gcd(f(x), Df(x)) = x^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - \frac{x}{4}(4x^3 + 4x).$$

Po vydelení $f(x)$ polynómom $h(x)$ dostaneme $g(x) = x^2 + 1$.

Skutočne, polynómy $f(x) = (x^2 + 1)^2$ a $g(x) = x^2 + 1$ majú v \mathbb{C} tie isté korene $\pm i$, v prípade polynómu $g(x)$ sú to jednoduché korene.

Cvičenia

Úloha 4.5.1. Nech F je pole, F' je jeho nadpole a $\varphi: F' \rightarrow F'$ je homomorfizmus taký, že $\varphi(x) = x$ pre každé $x \in F'$ (nemení prvky pola F'). Potom pre každý koreň c polynómu $f(x)$ je aj $\varphi(c)$ koreňom $f(x)$.

Úloha 4.5.2. Vedeli by ste dokázať dôsledok 4.5.18 na základe poznatkov, ktoré máte z analýzy?

Úloha 4.5.3. Vydelte dané polynómy so zvyškom v $\mathbb{C}[x]$.

- $f(x) = x^4 + 3x^3 - 4x + 2$, $g(x) = x^2 + x - 2$
- $f(x) = x^5 + 2x^3 + 3x + 4$, $g(x) = x^3 + x + 1$
- $f(x) = x^3 + (2 + 2i)x^2 + 3ix + 1$, $g(x) = x^2 + (2 + i)x + i$

Úloha 4.5.4. Použitím Hornerovej schémy zistíte, či c je koreň polynómu $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ a vyjadríte tento polynóm v tvare $f(x) = g(x)(x - c) + f(c)$.

- $f(x) = x^4 + 3x^3 - 4x + 2$, $c = -2$
- $f(x) = x^5 + 2x^3 + 3x + 4$, $c = -1$
- $f(x) = x^3 + (2 + 2i)x^2 + 3ix + 1$, $c = -i$

Úloha 4.5.5. Pomocou Hornerovej schémy vyjadriť:

- $f(x + 3)$ pre $f(x) = x^4 - x^3 + 1$
- $(x - 2)^4 + 4(x - 2)^3 + 6(x - 2)^2 + 10(x - 2) + 20$

Úloha 4.5.6. Nájdite všetky racionálne korene daných polynómov a zistite ich násobnosť. Aká je ich násobnosť?

- $f(x) = 4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$
- $f(x) = 24x^5 + 10x^4 - x^3 - 19x^2 - 5x + 6$
- $f(x) = 6x^4 + 19x^3 - 7x^2 - 26x + 12$
- $f(x) = 6x^4 - 7x^3 + 8x^2 - 7x + 2$
- $f(x) = 4x^4 + x^2 - 3x + 1$

Úloha 4.5.7. Ukážte, že reálny polynóm $f(x) = (x-4)(x-1)(x+1)(x+4) - 1$ nemá racionálne korene.

Úloha 4.5.8. Vypočítajte $d(x) = \gcd(f(x), g(x))$ a vyjadrite ho v tvare $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.

a) $f(x) = 3x^5 + 5x^4 - 16x^3 - 6x^2 - 5x - 6$, $g(x) = 3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2$;

b) $f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9$, $g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$;

c) $f(x) = x^4 + 6x^3 + 9x^2 - 2x - 9$, $g(x) = x^3 + 4x^2 + 2x - 7$;

d) $f(x) = x^8 - 1$, $g(x) = x^5 - 1$;

e) $f(x) = x^{10} - 1$, $g(x) = x^4 - 1$.

(Výsledky: a) $u(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$, $v(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^2 - \frac{5}{3}x - \frac{4}{3}$, $d(x) = x + \frac{2}{3}$

b) $u(x) = -\frac{x-1}{3}$, $v(x) = \frac{2x^2-2x-3}{3}$, $d(x) = x - 1$

c) $d(x) = 1$, $u(x) = 1/30(2x^2 + 5x - 1)$, $v(x) = -1/30(2x^3 + 9x^2 + 7x + 3)$)

Úloha 4.5.9. Vypočítajte $d(x) = \gcd(f(x), g(x))$ a vyjadrite ho v tvare $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.

a) $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 - x + 5$, $g(x) = x^2 + x - 2$;

b) $f(x) = x^5 - 6x + 5$, $g(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$;

c) $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3x - 2$, $g(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 1$

Úloha 4.5.10*. Nech $m, n > 1$ sú prirodzené čísla. Ukážte, že $\gcd(x^m - 1, x^n - 1) = x^d - 1$, kde $d = \gcd(m, n)$.

Úloha 4.5.11. Dokážte, že $x^2 + x + 1 \mid x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}$ (v $F[x]$ pre ľubovoľné pole F).

Úloha 4.5.12. Dokážte, že $x^2 + x + 1 \mid x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}$ v $\mathbb{C}[x]$. (Využite to, čo viete o koreňoch týchto polynómov.)

Úloha 4.5.13. Rozložiť na koreňové činitele (nad \mathbb{C}):

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

b) $x^4 + 4$,

c) $x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 1$,

d*) $x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 1$,

e) $x^4 - 10x^2 + 1$,

f) $x^4 - 4x^3 + 4x - 1$.

Úloha 4.5.14. Rozložiť na súčin ireducibilných polynómov nad \mathbb{R} :

a) $x^4 + 4$

b) $x^6 + 27$

c) $x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 1$

d) $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

e*) $x^{2n} - 2x^n + 2$

f*) $x^4 - ax^2 + 1$ pre $a \in (-2, 2)$

g*) $x^{2n} + x^n + 1$.

Úloha 4.5.15. Dokážte: Ak $a + bi$ je koreň polynómu $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ a $b \neq 0$, tak $x^2 - 2ax + a^2 + b^2 \mid f(x)$.

Úloha 4.5.16. Nájdite všetky ireducibilné polynómy nad \mathbb{Z}_2 stupňov 2,3,4.

Úloha 4.5.17. Nájdite rozklad $f(x)$ na ireducibilné polynómy v $F[x]$.

a) $f(x) = 4x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 4x + 6$, $F = \mathbb{Z}_7$

b) $f(x) = x^4 - 1$, $F = \mathbb{Z}_{11}$

c) $f(x) = x^4 - 1$, $F = \mathbb{Z}_{13}$

Úloha 4.5.18. Zistite, či dané ideály sú maximálne v $\mathbb{R}[x]$:

a) $I_1 = (x^2 - 1)$;

b) $I_2 = (x^2 + 1)$.

Úloha 4.5.19*. Nech $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ je polynóm s celočíselnými koeficientami. Dokážte, že ak $a + b\sqrt{3}$ je koreň $f(x)$, tak aj $a - b\sqrt{3}$ je koreň $f(x)$. Dokážte, že podobné tvrdenie platí, ak c nahradíme ľubovoľným prirodzeným číslom, ktoré nie je druhou mocninou prirodzeného čísla.

Úloha 4.5.20. Dokážte, že polynóm $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ nemá viacnásobný koreň (nad \mathbb{R} resp. nad \mathbb{C}).

Kapitola 5

Polia

5.1 Podielové pole

*Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.
(Celé čísla dal ľuďom dobrotivý Boh, všetko ostatné už je ľudským dielom.)*
Leopold Kronecker

V tejto časti zodpovieme otázku, ktoré okruhy môžu byť podokruhmi polí. Je zrejmé, že podokruh poľa musí byť komutatívny okruh. Takisto nemôže obsahovať delitele nuly – boli by deliteľmi nuly aj v jeho nadpoli.

Táto otázka má teda zmysel hlavne pre obory integrity. V nasledujúcej vete dokážeme, že každý obor integrity je podokruhom nejakého poľa.

Definícia 5.1.1. Hovoríme, že okruh R je *vnorený* do okruhu R' ak existuje injektívny homomorfizmus $f: R \rightarrow R'$. Injektívny homomorfizmus $f: R \rightarrow R'$ nazývame *vnorenie*.

Vnorenie je vlastne izomorfizmus na podokruh $\text{Im } f$, to znamená, že okruh R môžeme chápať priamo ako podokruh R' .

Veta 5.1.2. *Pre každý obor integrity D existuje pole $Q(D)$ a vnorenie $f: D \rightarrow Q(D)$ s nasledujúcou vlastnosťou: Pre každé vnorenie $g: D \rightarrow F$ do poľa F existuje práve jedno vnorenie $\bar{g}: Q(D) \rightarrow F$ také, že $\bar{g} \circ f = g$.*

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{f} & Q(D) \\ & \searrow g & \downarrow \bar{g} \\ & & F \end{array}$$

Význam podmienky v predchádzajúcej vete je o trochu jasnejší, keď si uvedomíme, že injektívne zobrazenie f nám hovorí, že obor integrity D môžeme chápať ako podokruh $Q(D)$. V prípade, že stotožníme prvky z D s ich obrazmi nám teda táto podmienka vlastne hovorí, že každé vloženie $g: D \rightarrow F$ do nejakého poľa F možno rozšíriť na vloženie celého $Q(D)$. (Teda $Q(D)$ je v istom zmysle najmenšie pole obsahujúce D .)

Dôkaz vety 5.1.2 urobíme vo viacerých krokoch – najprv zadefinujeme, ako vyzerá pre daný obor integrity pole $Q(D)$, postupne overíme, že spĺňa vlastnosti z definície poľa aj vlastnosť uvedenú vo vete.

Lema 5.1.3. *Nech D je obor integrity. Na množine $D \times (D \setminus \{0\})$ definujeme reláciu \equiv predpisom*

$$(a, b) \equiv (c, d) \quad \stackrel{\text{def}}{\iff} \quad ad = bc.$$

Potom táto relácia je reláciou ekvivalencie a jej triedy $[(a, b)]$ nazývame zlomkami nad oborom integrity D .

Všimnite si, že relácia ekvivalencie je definovaná rovnako ako rovnosť zlomkov predstavujúcich racionálne čísla – ako uvidíme, celá konštrukcia podielového poľa $Q(D)$, ktorá bude nasledovať, pripomína spôsob, ktorým z okruhu celých čísel \mathbb{Z} dostaneme pole racionálnych čísel \mathbb{Q} . (Väčšina dôkazov je skoro rovnaká, ako keby sme overovali, že \mathbb{Q} je pole a spĺňa vlastnosť uvedenú vo vete 5.1.2.) V mnohých učebniciach, aby sa zdôraznila podobnosť s konštrukciou racionálnych čísel, sa pre zlomky nad D používa priamo označenie $\frac{a}{b}$ namiesto nášho označenia $[(a, b)]$.

Dôkaz. Dôkaz, že relácia \equiv je reflexívna a symetrická je úplne priamočiary – cvičenie.

Tranzitivnosť: Nech $(a, b) \equiv (c, d)$ a $(c, d) \equiv (e, f)$. To znamená, že $ad = bc$ a $cf = de$.

Ak prvú rovnosť vynásobíme prvkom f a druhú prvkom b , dostaneme $adf = bcf = bde$, čiže $d(af - be) = 0$. Pretože D je obor integrity a $d \neq 0$, máme $af - be = 0$, teda

$$af = be$$

a $(a, b) \equiv (e, f)$. □

Lema 5.1.4. *Označme $Q(D)$ množinu všetkých tried ekvivalencie \equiv na množine $D \times (D \setminus \{0\})$ (čiže množinu všetkých zlomkov nad D). Na tejto množine definujeme operácie $+$ a \cdot predpismi*

$$\begin{aligned} [(a, b)] + [(c, d)] &= [(ad + bc, bd)], \\ [(a, b)] \cdot [(c, d)] &= [(ac, bd)]. \end{aligned}$$

Potom $+$ a \cdot sú dobre definované a $(Q(D), +, \cdot)$ je pole.

Dôkaz. Najprv ukážeme, že obe operácie sú dobre definované, čiže nezávisia od výberu reprezentantov. Nech teda $(a, b) \equiv (a', b')$, čiže

$$ab' = a'b.$$

Potom máme

$$\begin{aligned} (ad + bc)b'd &= ab'd^2 + bb'cd = a'bd^2 + bb'cd = (a'd + b'c)bd \\ acb'd &= ab'cd = a'bcd = a'cbd \end{aligned}$$

čo znamená

$$\begin{aligned} [(ad + bc, bd)] &= [(a'd + b'c, b'd)] \\ [(ac, bd)] &= [(a'c, b'd)] \end{aligned}$$

čiže $[(a, b)] + [(c, d)] = [(a', b')] + [(c, d)]$ a $[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(a', b')] \cdot [(c, d)]$.

$(Q(D), +)$ je komutatívna grupa. Komutatívnosť je zrejmá. Asociatívnosť overíme priamym výpočtom.

$$\begin{aligned} (([a, b)] + [(c, d)]) + [(e, f)] &= [(ad + bc, bd)] + [(e, f)] = [(adf + bcf + bde, bdf)] \\ [a, b] + (([c, d)] + [(e, f)]) &= [(a, b)] + [(cf + ed, df)] = [(adf + bcf + bed, bdf)] \end{aligned}$$

Neutrálny prvok pre sčítovanie je $[(0, 1)]$, opačný prvok k triede $[(a, b)]$ je $[(-a, b)]$.

$(Q(D) \setminus \{0\}, \cdot)$ je komutatívna grupa. Komutatívnosť je zrejmá, asociatívnosť sa ľahko overí priamym výpočtom. Neutrálny prvok vzhľadom na násobenie je $[(1, 1)]$. Všimnime si, že $[(a, b)] \neq [(0, 1)]$ práve vtedy, keď $a \neq 0$. Preto každý nenulový prvok $[(a, b)]$ má inverzný prvok $[(b, a)]$.

Distributívnosť. Keďže ide o komutatívny okruh, stačí overovať iba jednu z podmienok distributívnosti. Distributívnosť sa overí priamočiarym prepísaním z definície.

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot ([[(c, d)] + [(e, f)])] &= [(a, b)] \cdot [(cf + de, df)] = [(a(cf + de), bdf)] = \\ &= [(acf, bdf)] + [(ade, bdf)] = [(ac, bd)] + [(ae, bf)] = [(a, b)] \cdot [(c, d)] + [(a, b)] \cdot [(e, f)] \end{aligned}$$

□

Lema 5.1.5. Zobrazenie $f: D \rightarrow Q(D)$

$$f: a \mapsto [(a, 1)]$$

je injektívny homomorfizmus okruhov.

Dalej pre ľubovoľný injektívny homomorfizmus $g: D \rightarrow F$, kde F je pole existuje práve jeden injektívny homomorfizmus $\bar{g}: Q(D) \rightarrow F$ s vlastnosťou $\bar{g} \circ f = g$.

Dôkaz. Zobrazenie f je homomorfizmus:

$$\begin{aligned} a + b &\mapsto [(a + b, 1)] = [(a, 1)] + [(b, 1)] \\ ab &\mapsto [(ab, 1)] = [(a, 1)] \cdot [(b, 1)] \end{aligned}$$

Zobrazenie f je injektívne: rovnosť $[(a, 1)] = [(b, 1)]$ znamená, že $a \cdot 1 = b \cdot 1$, čiže $a = b$.

Ak $g: D \rightarrow F$ je injektívny homomorfizmus z D do nejakého poľa F , definujme $\bar{g}: Q(D) \rightarrow F$ predpisom

$$\bar{g}: [(a, b)] \mapsto g(a)g(b)^{-1}.$$

(Pretože g je injektívny homomorfizmus, máme $\text{Ker } g = \{0\}$, čiže $g(b) \neq 0$ pre každé $b \in D \setminus \{0\}$. Uvedený predpis teda skutočne má zmysel. Navyše je jasné, že toto je jediná možnosť ako definovať \bar{g} , pretože toto zobrazenie musí spĺňať $\bar{g}([(a, 1)]) = g(a)$ a $\bar{g}([(1, b)]) = g(b)^{-1}$.)

Zobrazenie \bar{g} je dobre definované. Zobrazenie \bar{g} sme definovali pomocou nejakého reprezentanta triedy $[(a, b)]$ – chceme ukázať, že výsledok zobrazenia nezávisí od výberu reprezentanta. Nech teda $(c, d) \equiv (a, b)$, čiže $ad = bc$. Potom dostávame (z toho, že g je homomorfizmus)

$$g(a)g(d) = g(b)g(c)$$

Po vynásobení tejto rovnosti $g(b)^{-1}g(d)^{-1}$ máme

$$g(a)g(b)^{-1} = g(c)g(d)^{-1}.$$

Čiže hodnota \bar{g} skutočne nezávisí od výberu reprezentanta.

Zobrazenie \bar{g} je homomorfizmus. Zachováva sčítovanie:

$$\begin{aligned} [(a, b)] + [(c, d)] &= [(ad + bc, bd)] \mapsto g(ad + bc)g(bd)^{-1} = (g(ad) + g(bc))g(bd)^{-1} = \\ &= g(a)g(d)g(b)^{-1}g(d)^{-1} + g(b)g(c)g(b)^{-1}g(d)^{-1} = \\ &= g(a)g(b)^{-1} + g(c)g(d)^{-1} = \bar{g}([(a, b)]) + \bar{g}([(c, d)]) \end{aligned}$$

Zachováva násobenie:

$$\begin{aligned} [(a, b) \cdot (c, d)] &= [(ac, bd)] \mapsto g(ac)g(bd)^{-1} = \\ &= g(a)g(b)^{-1}g(c)g(d)^{-1} = \bar{g}([(a, b)]) \cdot \bar{g}([(c, d)]) \end{aligned}$$

Homomorfizmus \bar{g} je injektívny. Stačí overiť, že $\text{Ker } \bar{g} = \{0\}$. Ak $g(a)g(b)^{-1} = 0$, znamená to, že $g(a) = 0$ (lebo prvok $g(b)^{-1} \in F \setminus \{0\}$ je nenulový). Potom (keďže homomorfizmus g je injektívny) máme $a = 0$, čiže $[(a, b)] = [(0, b)] = [(0, 1)]$ je nulový prvok poľa $Q(D)$. \square

Predchádzajúce tri lemy už spolu dokazujú vetu 5.1.2.

Poznámka 5.1.6. Existuje o niečo všeobecnejšia konštrukcia, ktorá sa nazýva *okruh zlomkov* alebo *lokalizácia* (napríklad [DF, Section 15.4], [AM, Chapter 3]). V tomto prípade sa pracuje s komutatívnym okruhom R s jednotkou, vyberie sa nejaká podmnožina $U \subseteq R$, ktorej prvky budú predstavovať menovatele zlomkov. (Inak povedané, U sú tie prvky, ktoré budú po urobení tejto konštrukcie mať inverzy vzhľadom na násobenie. Treba vyžadovať, aby množina U bola uzavretá vzhľadom na násobenie. V prípade konštrukcie podielového poľa sme mali $U = D \setminus \{0\}$.) Konštrukcia okruhu zlomkov je veľmi podobná konštrukcii podielového poľa, má aj podobné vlastnosti. Dôležitý rozdiel je, že v tomto prípade už zobrazenia spomínané vo vete 5.1.2 nemusia byť (vo všeobecnosti) injektívne. (Od zobrazenia g sa požaduje, aby zobrazovalo všetky prvky z U na delitele jednotky.) Táto konštrukcia je dôležitá napríklad v algebraickej geometrii a komutatívnej algebre.

Poznámka 5.1.7. Veľmi podobná konštrukcia ako vytvorenie podielového poľa z oboru integrity sa dá urobiť pre ľubovoľnú pologrupu s krátením (=pologrupa, v ktorej platia zákony o krátení). Dokážeme tak, že každú pologrupu s krátením možno vložiť do nejakej podgrupy (je podgrupou nejakej grupy.) Pozri úlohu 5.1.3.

Poznámka 5.1.8. Citát na začiatku tejto podkapitoly sa spája s konštrukciou reálnych čísel z celých čísel. My sme si ukázali, ako z celých čísel vytvoriť racionálne. Ďalším krokom by bolo pomocou racionálnych čísel nejakým spôsobom zaviesť reálne čísla. Existuje veľa ekvivalentných spôsobov ako to dosiahnuť (zúplnenie, Dedekinov rezy, reťazové zlomky, desatinné rozvoje...), viac sa o nich môžete dozvedieť napríklad v [Š]. Azda najčastejšie vyučovaným spôsobom je konštrukcia pomocou tried ekvivalencie cauchyovských postupností – zúplnenie racionálnych čísel – s ktorou by ste sa mohli stretnúť v niektorom pokročilejšom kurze analýzy. (Každý zo spomínaných spôsobov konštrukcie reálnych čísel nejakým spôsobom využíva pojem spojitosti.)

Cvičenia

Úloha 5.1.1. Dokážte, že každý komutatívny okruh možno vložiť do komutatívneho okruhu s jednotkou.

Úloha 5.1.2. Dokážte, že podielové pole je vlastnosťami uvedenými vo vete 5.1.2 určené jednoznačne až na izomorfizmus.

Úloha 5.1.3*. Dokážte, že každú komutatívnu pologrupu s krátením možno vložiť do grupy. (Teda ak S je komutatívna pologrupa, v ktorej platia zákony o krátení, tak existuje grupa G a prostý homomorfizmus $f: S \rightarrow G$; pričom pod homomorfizmom pologrúp sa zobrazenie zachováva operáciu, podobne ako pri grupách.)

5.2 Charakteristika poľa

S charakteristikou poľa sme sa už stretli v tvrdení 4.5.33. Pripomenieme si jej definíciu a dokážeme si niektoré fakty o charakteristike poľa, ktoré budú pre nás v nasledujúcich častiach prednášky užitočné.

Definícia 5.2.1. *Charakteristika poľa F je najmenšie prirodzené číslo $k > 0$ s vlastnosťou $k \times 1 = 0$. Označujeme ju $\text{char}(F)$. Ak neexistuje k s uvedenou vlastnosťou, tak definujeme $\text{char}(F) = \infty$.*

Predchádzajúcu definíciu môžeme preformulovať aj nasledovne

$$\text{char } F = \min\{k \in \mathbb{N}, k > 0; k \times 1 = 0\},$$

pričom minimum z prázdnej množiny chápeme ako nekonečno.

Charakteristiku možno definovať aj všeobecnejšie – pre ľubovoľný okruh, pozri napríklad [KGGG, Kapitola 4.4]. V prípade okruhu s jednotkou je táto všeobecnejšia definícia ekvivalentná s definíciou, ktorú sme tu uviedli pre polia. (My budeme charakteristiku potrebovať iba pre polia.)

Príklad 5.2.2. $\text{char}(\mathbb{Z}_p) = p$, pretože $p \times 1 = 0$ (počítame modulo p) pre $0 < k < p$ platí v \mathbb{Z}_p $k \times 1 = k \neq 0$.

$\text{char}(\mathbb{Q}) = \infty$, pretože žiadny násobok jednotky $k \times 1$, pre kladné celé čísla k , nie je 0.

Lema 5.2.3. *Každé konečné pole F má konečnú charakteristiku.*

Dôkaz. Vyplýva z Dirichletovho princípu.

Uvažujme množinu $\{k \times 1; k \in \mathbb{N}, k > 0\}$. Táto množina je konečná (je to podmnožina konečnej množiny F). Preto (na základe Dirichletovho princípu) existujú rôzne prirodzené čísla $m, n > 0$ také, že

$$m \times 1 = n \times 1.$$

Bez ujmy na všeobecnosti, nech $m > n$. Potom pre $k = m - n$ máme

$$k \times 1 = (m - n) \times 1 = m \times 1 - n \times 1 = 0,$$

čiže množina $\{k \in \mathbb{N}, k > 0; k \times 1 = 0\}$ je neprázdna, teda charakteristika (najmenší prvok tejto množiny) je konečná. \square

Poznámka 5.2.4. Existujú aj nekonečné polia s konečnou charakteristikou.

Tvrdenie 5.2.5. *Charakteristika ľubovoľného poľa F je prvočíslo alebo ∞ .*

Dôkaz. Stačí ukázať, že v prípade, že ak je charakteristika konečná, nemôže byť zložené číslo.

Sporom. Predpokladajme, že charakteristika poľa F je zložené číslo m , teda $m = nk$ pre nejaké prirodzené čísla $1 < n, k < m$. Potom platí

$$m \times 1 = (nk) \times 1 = (n \times 1)(k \times 1) = 0.$$

Každé pole je okruh bez deliteľov nuly, preto jeden z prvkov $n \times 1, k \times 1$ poľa F musí byť 0. Pritom $n, k < m$, čo je spor s tým, že m je (podľa definície charakteristiky) najmenšie kladné celé číslo s touto vlastnosťou. \square

Nasledujúce tvrdenie budeme v ďalších kapitolách často využívať.

Tvrdenie 5.2.6. *Nech F, F' sú polia a zobrazenie $\varphi: F \rightarrow F'$ je okruhový homomorfizmus. Potom buď $\varphi[F] = \{0\}$, alebo $\varphi[F]$ je podpole F' , ktoré je izomorfné s F . (Inými slovami: zobrazenie φ je buď nulové alebo injektívne; čiže vnorenie – izomorfizmus na svoj obraz.)*

Dôkaz. Vieme, že $\text{Ker } \varphi$ je ideál v F . Jediné ideály v poli sú však $\{0\}$ a F . V prvom prípade je homomorfizmus φ injektívny, v druhom prípade sa každý prvok zobrazí na nulu. \square

Pomocou predchádzajúceho tvrdenia môžeme ukázať, že (v závislosti od charakteristiky) každé pole obsahuje podpole (izomorfné s) \mathbb{Q} alebo \mathbb{Z}_p .

Tvrdenie 5.2.7. *Ak $\text{char } F = \infty$, tak existuje injektívny homomorfizmus z \mathbb{Q} do F .*

Ak $\text{char } F = p$ pre nejaké prvočíslo p , tak existuje injektívny homomorfizmus zo \mathbb{Z}_p do F .

Dôkaz. Zobrazenie $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow F$

$$\varphi: z \mapsto z \times 1$$

je okruhový homomorfizmus, pričom $\text{Ker } \varphi$ obsahuje práve tie celé čísla, ktoré sú násobky $\text{char}(F)$ (a v prípade, že $\text{char } F = \infty$ je $\text{Ker } \varphi = \{0\}$).

Ak $\text{char } F = p$, tak máme (na základe vety o faktorovom izomorfizme) izomorfizmus z $\mathbb{Z}/\text{Ker } \varphi = \mathbb{Z}/(\text{char}(F)) = \mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{Z}_p$ na $\text{Im } \varphi$. Tým dostávame hľadaný injektívny homomorfizmus zo \mathbb{Z}_p do F .

Ak $\text{char } F = \infty$, tak $\text{Ker } F = (0)$ a φ je injektívny homomorfizmus zo \mathbb{Z} do F . Ten sa podľa vety 5.1.2 dá rozšíriť na injektívny homomorfizmus $\bar{\varphi}: Q(\mathbb{Z}) \rightarrow F$ z podielového poľa oboru integrity \mathbb{Z} do F . Podielové pole \mathbb{Z} je však práve pole racionálnych čísel. \square

Nasledujúce tvrdenie má síce veľmi jednoduchý dôkaz, podarí sa nám však z neho odvodiť veľmi zaujímavé dôsledky.

Tvrdenie 5.2.8. *Nech K, F sú polia a K je nadpole poľa F (t.j. $K \supseteq F$ a operácie na F sú zúžením operácií na K). Potom K je vektorový priestor nad polom F (so sčítaním a násobením skalárom rovnakým ako je sčítanie a násobenie v K).*

Dôkaz. Jednoduchý – jednotlivé vlastnosti z definície vektorového priestoru po prepísaní na tento konkrétny príklad sú vlastne známe vlastnosti poľa ako distributívnosť, asociatívnosť násobenia atď. (Dôkaz je skoro identický s postupom použitým v úlohách I-4.1.10 a I-4.1.5) \square

Ako sme už spomenuli, napriek jednoduchému dôkazu bude mať pohľad na nadpole ako na vektorový priestor nad daným polom mnohé zaujímavé dôsledky. Ako prvý z nich si ukážeme, aký počet prvkov môže mať konečné pole.

Dôsledok 5.2.9. *Konečné pole charakteristiky p má p^n prvkov pre nejaké $n \in \mathbb{N}$.*

Dôkaz. Podľa tvrdenia 5.2.7 každé konečné pole F s $\text{char}(F) = p$ obsahuje podpole (izomorfné so) \mathbb{Z}_p . Teda ho môžeme chápať ako vektorový priestor nad \mathbb{Z}_p . Keďže množina F je konečná, ide o konečnorozmerný vektorový priestor, teda F je (ako vektorový priestor) izomorfný s priestorom $(\mathbb{Z}_p)^n$ pre nejaké n (veta I-5.5.15). \square

Z toho vyplýva, že počet prvkov konečného poľa musí byť mocnina prvočísla. Napríklad dostávame, že nemôže existovať 6-prvkové pole. (Platí aj obrátené tvrdenie, pre každú mocninu prvočísla $k = p^n$ existuje k -prvkové pole.)

Môžeme si všimnúť ešte jeden užitočný fakt súvisiaci s charakteristikou poľa.

Tvrdenie 5.2.10. *Nech $\text{char}(F) = p$ (p je prvočíslo). Potom pre ľubovoľné $a, b \in F$ platí*

$$\begin{aligned}(a + b)^p &= a^p + b^p \\ (ab)^p &= a^p b^p\end{aligned}$$

čiže zobrazenie $f: F \rightarrow F$, $f(x) = x^p$, je homomorfizmus (endomorfizmus poľa F).

Ďalej pre ľubovoľné $n \in \mathbb{N}$ a $q = p^n$ máme

$$\begin{aligned}(a + b)^q &= a^q + b^q \\ (ab)^q &= a^q b^q\end{aligned}$$

Dôkaz. Jediná netriviálna časť je rovnosť $(a + b)^p = a^p + b^p$. Použitím binomickej vety (ktorá platí v každom komutatívnom okruhu s jednotkou, úloha 4.2.22) máme

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k}.$$

Chceme ukázať, že všetky sčítance s výnimkou prvého a posledného (t.j. $k = 0$ a $k = p$) sú nulové.

Na to nám stačí ukázať, že $p \mid \binom{p}{k}$ v \mathbb{Z} , keďže p je charakteristika poľa, s ktorým pracujeme. (Vieme, že binomický koeficient je vždy celé číslo.) Ak však p je prvočíslo, tak p delí čitateľ zlomku

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$$

pričom v menovateli sa (pre $k \neq 0, p$) vyskytnú len čísla ostro menšie ako p , t.j. žiadne z nich nie je deliteľné p . Z toho už vyplýva, že p delí toto číslo.

Posledná časť tvrdenia, ktorá hovorí o $q = p^n$, sa ľahko odvodí z prvej časti indukciou vzhľadom na n . \square

Cvičenia

Úloha 5.2.1. Nech F je pole, $a \in F$, $a \neq 0$. Dokážte, že ak $k \times a = 0$, tak platí $k = 0$ alebo F má konečnú charakteristiku a

$$\text{char}(F) \mid k,$$

t.j. k je celočíselný násobok charakteristiky.

5.3 Rozšírenia polí

Prezentácia výsledkov v tejto kapitole i v nasledujúcich kapitolách je podobná ako v [KGGS, Kapitola 8], [DF, Chapter 13].

Na začiatok začneme s definíciou pojmu rozšírenia poľa.

Definícia 5.3.1. Ak K, F sú polia a súčasne F je podokruhom K , tak hovoríme, že K je *rozšírením* poľa F .

Vidíme, že rozšírenie poľa je vlastne len iné pomenovanie pre dvojicu pozostávajúcu z poľa F a jeho nadpoľa K (čiže vždy, keď hovoríme o rozšírení poľa, máme na mysli dve polia).

Ak K je rozšírenie poľa F , tak K môžeme chápať ako vektorový priestor nad F (tvrdenie 5.2.8). Pre nás bude zaujímavý hlavne ten prípad, keď je to konečnorozmerný vektorový priestor.

Definícia 5.3.2. Ak K je rozšírenie poľa F také, že K je konečnorozmerný vektorový priestor nad F , tak K nazývame *konečné rozšírenie* poľa F .

Dimenziu $d_F(K)$ poľa K ako vektorového priestoru nad F nazývame *stupeň rozšírenia* a označujeme $[K : F]$.

$$[K : F] = d_F(K)$$

Príklad 5.3.3. Pole \mathbb{C} je rozšírením poľa \mathbb{R} . Všimnime si, že $\mathbb{C} = \{a + bi; a, b \in \mathbb{R}\}$, a teda $1, i$ tvoria bázu \mathbb{C} ako vektorového priestoru nad \mathbb{R} . Preto $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

Na \mathbb{C} sa môžeme pozeráť tak, že k poľu \mathbb{R} sme pridali koreň polynómu $x^2 + 1$ (a aj všetky ďalšie prvky, ktoré si pridanie tohoto koreňa vynútilo, aby novovytvorená štruktúra bola opäť poľom). V poli \mathbb{R} polynóm $x^2 + 1$ nemá koreň.

Príklad 5.3.4. Vieme, že $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Q}\}$ je pole (úloha I-3.3.2). Je to rozšírenie poľa \mathbb{Q} . Ak sa na $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ pozrieme ako na vektorový priestor nad \mathbb{Q} , tak jeho bázu tvoria $1, \sqrt{2}$. (Rozmyslite si, prečo sú lineárne nezávislé nad \mathbb{Q} .) Teda $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 2$.

Aj v tomto prípade môžeme toto rozšírenie chápať tak, že k poľu \mathbb{Q} sme pridali koreň polynómu $x^2 - 2$. (V poli \mathbb{Q} tento polynóm nemá koreň.)

V predchádzajúcich dvoch príkladoch sme videli, že k ireducibilným polynómom $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ existujú konečné rozšírenia, v ktorých už tieto polynómy majú koreň. Ukážeme, že podobné tvrdenie platí pre ľubovoľný ireducibilný polynóm.

Veta 5.3.5. *Nech F je pole a $p(x)$ je ireducibilný polynóm v $F[x]$. Potom existuje rozšírenie poľa F , v ktorom $p(x)$ má koreň.*

Dôkaz. Keďže $p(x)$ je ireducibilný, $(p(x))$ je maximálny ideál v $F[x]$ (tvrdenia 4.4.19 a 4.4.32). Teda faktorový okruh $K = F[x]/(p(x))$ je pole. O tomto poli K ukážeme, že má požadované vlastnosti.

Máme kanonický homomorfizmus $\varphi: F[x] \rightarrow K$ taký, že $\text{Ker } \varphi = (p(x))$. Súčasne F je podmnožinou $F[x]$, teda máme aj homomorfizmus $\varphi|_F: F \rightarrow K$ (zúženie homomorfizmu φ na podmnožinu F). Tento homomorfizmus je nenulový, keďže na nulu sa zobrazia iba prvky z $\text{Ker } \varphi = (p(x))$, kam patria iba 0 a polynómy stupňa aspoň $\text{st } p(x) \geq 1$ (čiže žiadny nenulový konštantný polynóm – žiadny nenulový prvok poľa F). Podľa tvrdenia 5.2.6 je to teda injektívny homomorfizmus (vnorenie) a F môžeme chápať ako podpole K . Ide teda skutočne o rozšírenie poľa F .

Treba ešte dokázať, že $p(x)$ má v tomto poli koreň. Ukážeme, že koreňom je prvok $\varphi(x) = x + (p(x))$. Kvôli zjednodušeniu zápisu budeme používať označenie $\varphi(x) = \bar{x}$, resp. $\varphi(f(x)) = \bar{f(x)}$ pre ľubovoľné $f(x) \in F[x]$.

Máme rovnosť

$$p(\bar{x}) \stackrel{(*)}{=} \overline{p(x)} = p(x) + (p(x)) = 0 + (p(x)),$$

ktorá znamená, že \bar{x} je skutočne koreňom polynómu $p(x)$. (V predchádzajúcom odvodení bola najdôležitejším krokom rovnosť označená (*), ktorá je založená na tom, že φ je homomorfizmus medzi komutatívnymi okruhmi, teda zachováva súčet, súčin a teda aj všetky polynomicke výrazy).¹ \square

¹O niečo podrobnejšie zdôvodnenie rovnosti (*): Ak $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, tak

$$\begin{aligned} \overline{p(x)} &= \overline{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0} \\ &= \overline{a_n x^n} + \overline{a_{n-1} x^{n-1}} + \dots + \overline{a_1 x} + \overline{a_0} \\ &= \overline{a_n} \cdot \overline{x^n} + \overline{a_{n-1}} \cdot \overline{x^{n-1}} + \dots + \overline{a_1} \cdot \overline{x} + \overline{a_0} \\ &\stackrel{(\Delta)}{=} a_n \bar{x}^n + a_{n-1} \bar{x}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{x} + a_0 \\ &= p(\bar{x}) \end{aligned}$$

Teraz ukážeme, že rozšírenie K poľa F zostrojené v predchádzajúcej vete je konečným rozšírením.

Veta 5.3.6. *Nech $p(x) \in F[x]$ je ireducibilný polynóm a $K = F[x]/(p(x))$. Nech $n = \text{st } p$. Označme $u = x + (p(x)) = \varphi(x)$ (kde $\varphi: F[x] \rightarrow K$ označuje kanonický homomorfizmus). Potom $1, u, \dots, u^{n-1}$ je báza K ako vektorového priestoru nad F , čiže*

$$K = \{a_{n-1}u^{n-1} + \dots + a_1u + a_0; a_0, \dots, a_{n-1} \in F\}.$$

Dôkaz. Máme surjektívny homomorfizmus $\varphi: F[x] \rightarrow K$, ktorý polynóm $f(x)$ zobrazí na triedu $f(x) + (p(x)) = f(u)$. (Teda každý prvok K možno vyjadriť ako $f(u)$ pre nejaké $f \in F[x]$.)

Ak $f(x)$ je ľubovoľný polynóm z $F[x]$, tak podľa vety o delení so zvyškom existujú $q(x)$ a $r(x)$ také, že

$$f(x) = q(x)p(x) + r(x),$$

pričom $\text{st } r \leq \text{st } p = n$. Potom máme

$$f(u) = f(x) + (p(x)) = r(x) + (p(x)) = r(u) = a_{n-1}u^{n-1} + \dots + a_1u + a_0.$$

Čiže každý prvok z K sa skutočne vyjadriť ako lineárna kombinácia $1, u, \dots, u^{n-1}$ (s koeficientami z F), t.j. vektory $1, u, \dots, u^{n-1}$ generujú vektorový priestor K .

Ešte zostáva ukázať, že $1, u, \dots, u^{n-1}$ sú lineárne nezávislé nad F . Predpokladajme, že pre nejaké b_0, \dots, b_{n-1} by platilo v $K = F[x]/(p(x))$

$$b_{n-1}u^{n-1} + \dots + b_1u + b_0 = 0.$$

Táto rovnosť vo faktorovom okruhu $F[x]/(p(x))$ znamená, že v okruhu $F[x]$ platí

$$b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0 \in (p(x)).$$

Jediný polynóm v $(p(x))$, ktorý má stupeň menej ako n , je však nulový polynóm, preto $b_0 = b_1 = \dots = b_{n-1} = 0$, čiže $1, u, \dots, u^{n-1}$ sú skutočne lineárne nezávislé. \square

Dôsledok 5.3.7. *Ak $p(x) \in F[x]$ je ireducibilný polynóm stupňa n , tak $K = F[x]/(p(x))$ je konečné rozšírenie F a stupeň rozšírenia $[K : F]$ je tiež rovný n .*

$$[K : F] = \text{st } p(x)$$

Predchádzajúca veta nám hovorí, že každý prvok poľa $F[x]/(p(x))$ môžeme vyjadriť ako $a_{n-1}u^{n-1} + \dots + a_1u + a_0$ pre nejaké $a_0, \dots, a_{n-1} \in F$. V poli $F[x]/(p(x))$ vieme jednoduchým spôsobom sčítovať a násobiť – ide jednoducho o sčítovanie a násobenie modulo $p(x)$. Presnejšie ak máme 2 prvky vyjadrené ako $f(u)$ a $g(u)$ pre nejaké polynómy $f(x), g(x) \in F[x]$ stupňa menšieho ako n , tak ich súčet zodpovedá priamo súčtu polynómov $f(x) + g(x)$. Ich súčin dostaneme tak, že vypočítame súčin $f(x)g(x)$ a zistíme jeho zvyšok po delení $p(x)$. (Fakt, že sčítovanie a násobenie v poli $F[x]/(p(x))$ sa správa takýmto spôsobom, vyplýva priamo z definície faktorového okruhu.)

Príklad 5.3.8. Uvažujme polynóm $p(x) = x^2 + x + 1$ nad poľom \mathbb{Z}_2 . Tento polynóm je ireducibilný, lebo ide o polynóm druhého stupňa, ktorý nemá v danom poli koreň (tvrdenie 4.5.22). Ak označíme ako u triedu polynómu x vo faktorovom okruhu $GF_4 = \mathbb{Z}_2[x]/(p(x))$,

Všetky rovnosti sú vlastne založené iba na definícii homomorfizmu, jedine zdôvodnenie rovnosti (Δ) je iné. Tu využívame, že sme stotožnili (cez kanonický homomorfizmus) prvok a z poľa F s jeho triedou \bar{a} v $F[x]/(p(x))$.

tak prvky poľa GF_4 sú $\{0, 1, u, u + 1\}$. Na základe predchádzajúcich úvah vieme vyplniť tabuľku násobenia a sčítovania v tomto poli:

$$(au + b) + (cu + d) = (a + b)u + (b + d)$$

$$(au + b)(cu + d) = acu^2 + (bc + ad)u + bd = ac(u + 1) + (bc + ad)u + bd = (ac + bc + ad)u + (ac + bd)$$

+	0	1	u	$u + 1$
0	0	1	u	$u + 1$
1	1	0	$u + 1$	u
u	u	$u + 1$	0	1
$u + 1$	$u + 1$	u	1	0

·	0	1	u	$u + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	u	$u + 1$
u	0	u	$u + 1$	1
$u + 1$	0	$u + 1$	1	u

Samozrejme, keďže polynóm $x^2 + x + 1$ je polynóm druhého stupňa a má v poli GF_4 koreň, musí sa dať rozložiť na lineárne činitele. Skutočne v GF_4 platí $x^2 + x + 1 = (x + u)(x + u + 1)$.

Príklad 5.3.9. Polynóm $p(x) = x^2 + 1$ je ireducibilný nad \mathbb{R} . Uvažujme pole $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$. Pokúsme sa zistiť, čomu sa v tomto poli rovná súčin $(au + b)(cu + d)$. V $\mathbb{R}[x]$ máme rovnosť

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (cb + ad)x + bc = ac(x^2 + 1) + (cb + ad)x + (bd - ac).$$

Z toho dostávame rovnosť v poli $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$

$$(ax + b)(cx + d) + (p(x)) = (cb + ad)x + (bd - ac) + (p(x)),$$

$$(au + b)(cu + d) = (cb + ad)u + (bd - ac).$$

Vidíme, že predpis pre sčítovanie násobenie je rovnaký ako pre komplexné čísla, čiže sme takto (až na izomorfizmus) získali pole \mathbb{C} t.j. $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$

Podobne dostaneme $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \cong \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$.

Definícia 5.3.10. Ak K je rozšírenie F a $u_1, \dots, u_n \in K$, tak symbolom $F(u_1, \dots, u_n)$ označujeme podpole generované množinou $F \cup \{u_1, \dots, u_n\}$. (T.j. najmenšie podpole, ktoré obsahuje túto množinu, čiže prienik všetkých podpolí, ktoré ju obsahujú.)²

V prípade, že existuje $u \in K$ také, že $K = F(u)$ hovoríme o *jednoduchom rozšírení*.

Vo vete 5.3.5 sme ukázali, že pre ireducibilný polynóm $p(x)$ existuje rozšírenie, v ktorom tento polynóm má koreň. Teraz ukážeme, že toto pole je jednoznačne určené až na izomorfizmus.

Veta 5.3.11. *Nech F je pole, $p(x) \in F[x]$ je ireducibilný polynóm nad F a K je rozšírenie F , ktoré obsahuje koreň u polynómu $p(x)$. Potom*

$$F(u) \cong F[x]/(p(x)).$$

Dôkaz. Máme dosadzovací homomorfizmus (definícia 4.3.15) $\varphi_u: F[x] \rightarrow F(u)$

$$\varphi_u: a(x) \mapsto a(u).$$

Keďže u je koreň $p(x)$, platí $p(x) \in \text{Ker } \varphi_u$. Vďaka tomu je homomorfizmus $\overline{\varphi}_u: F[x]/(p(x)) \rightarrow F(u)$ určený ako

$$\overline{\varphi}_u: a(x) + (p(x)) \mapsto a(u)$$

²Takéto podpole vždy existuje, stačí ukázať, že prienik podpolí je opäť podpole; úloha 5.3.1. (Pripomeniem, že už vieme, že prienik podokruhov je podokruh; úloha 4.2.3.)

dobře definovaný. (Ak $a(x)$ a $b(x)$ patria do tej istej triedy, tak $b(x) - a(x) = g(x)p(x)$, čiže $b(u) - a(u) = g(u)p(u) = 0$ a $b(u) = a(u)$. Teda definícia zobrazenia $\overline{\varphi}_u$ nezávisí od výberu reprezentanta.)

Zobrazenie $\overline{\varphi}_u$ je homomorfizmus polí. Je to nenulový homomorfizmus, lebo $\overline{\varphi}_u(1) = 1$. Z toho vyplýva, že tento homomorfizmus je injektívny (tvrdenie 5.2.6).

Navyše v tomto zobrazení sa každý prvok F zobrazí sám na seba a x sa zobrazí na u . Keďže $\text{Im } \overline{\varphi}_u$ je podpole K a obsahuje F aj u , musí obsahovať celé $F(u)$. Teda homomorfizmus $\overline{\varphi}_u$ je i surjektívny.

Ukázali sme, že $\overline{\varphi}_u$ je izomorfizmus a teda polia $F(u)$ a $F[x]/(p(x))$ sú skutočne izomorfné. \square

Z predchádzajúcej vety vyplýva, že dva korene ireducibilného polynómu sú algebraicky nerozlíšiteľné v tom zmysle, že po ich pridaní k polu F dostaneme izomorfné polia. Tento fakt o čosi zovšeobecníme v nasledujúcej vete, kde nebudeme vychádzať z toho istého polu ale z dvoch izomorfných polí.

Najprv si všimnime ako sa izomorfizmus medzi polami dá rozšíriť na izomorfizmus medzi ich okruhmi polynómov.

Poznámka 5.3.12. Nech $\varphi: F \rightarrow F'$ je izomorfizmus, F aj F' sú polia. Potom môžeme definovať zobrazenie $\hat{\varphi}: F[x] \rightarrow F'[x]$, ktoré polynómu z $F[x]$ priradí polynóm rovnakého stupňa, ktorého koeficienty dostaneme ako obrazy koeficientov pôvodného polynómu v homomorfizme φ .

$$\hat{\varphi}: \sum_{i=0}^n a_i x^i \mapsto \sum_{i=0}^n \varphi(a_i) x^i$$

Pomerne jednoducho sa overí, že ide opäť o izomorfizmus. Keďže ide o izomorfizmus, toto zobrazenie musí zachovávať maximálne ideály, prvoideály, ireducibilné prvky (=ireducibilné polynómy) a mnohé ďalšie vlastnosti.

Všimnime si tiež, že tento izomorfizmus navyše zachováva aj stupne polynómov.

Veta 5.3.13. Nech $\varphi: F \rightarrow F'$ je izomorfizmus polí. Nech $p(x)$ je ireducibilný polynóm nad F a $p'(x) \in F'[x]$ je polynóm $\hat{\varphi}(p)$ (čiže polynóm, ktorý získame použitím izomorfizmu $\varphi: F \rightarrow F'$ na všetky koeficienty polynómu $f(x)$). Potom $p'(x)$ je tiež ireducibilný polynóm (nad F').

Nech u je koreň $p(x)$ (v nejakom nadpoli F) a v je koreň $p'(x)$ (v nejakom nadpoli F'). Potom existuje izomorfizmus

$$\sigma: F(u) \rightarrow F'(v),$$

ktorý zobrazí u na v a rozširuje φ , t.j. $\sigma(u) = v$ a $\sigma|_F = \varphi$.

Dôkaz. Fakt, že $p'(x)$ je ireducibilný vyplýva priamo z existencie izomorfizmu $\hat{\varphi}: F[x] \rightarrow F'[x]$.

Podľa vety 5.3.11 je $F(u) \cong F[x]/(p(x))$ a $F'(v) \cong F'[x]/(p'(x))$ (pričom izomorfizmy medzi uvedenými poliami nemenia prvky z F , resp. prvky z F'). V skutočnosti nám teda stačí hľadať izomorfizmus (s požadovanými vlastnosťami) medzi $F[x]/(p(x))$ a $F'[x]/(p'(x))$.

Máme zobrazenie $\hat{\varphi}: F[x] \rightarrow F'[x]$. Definujme $\psi: F[x]/(p(x)) \rightarrow F'[x]/(p'(x))$ predpisom

$$\psi: f(x) + (p(x)) \mapsto \hat{\varphi}(f(x)) + (p'(x)).$$

Ukážeme, že toto zobrazenie je dobre definované a je to izomorfizmus s požadovanými vlastnosťami.

Ak $f(x) = g(x)p(x) + r(x)$, tak

$$\hat{\varphi}(f(x)) = \hat{\varphi}(g(x))p'(x) + \hat{\varphi}(r(x)).$$

(V ďalšom budeme namiesto $\hat{\varphi}(r(x))$ používať stručnejšie označenie $r'(x)$.) Keďže zobrazenie $\hat{\varphi}$ zachováva stupne polynómov, predchádzajúca rovnosť nám hovorí, že zachováva aj zvyšky po delení $p(x)$ a $p'(x)$. (T.j. zvyšok polynómu $f(x)$ po delení $p(x)$ sa zobrazí na zvyšok polynómu $\hat{\varphi}(f(x))$ po delení $p'(x)$.)

To špeciálne znamená, že ak dva polynómy $f_1(x), f_2(x) \in F[x]$ majú rovnaký zvyšok po delení $p(x)$ (=sú reprezentantmi tej istej triedy rozkladu v $F[x]/(p(x))$), tak aj ich obrazy budú mať rovnaký zvyšok po delení $p'(x)$. Z toho vidíme, že zobrazenie ψ je dobre definované.

Z predchádzajúcej úvahy vyplýva aj to, že ψ je homomorfizmus – zachováva operácie $+$ a \cdot . S operáciou $+$ nemáme žiadne problémy, pretože sčítovanie v $F[x]/(p(x))$ pracuje rovnako ako sčítovanie polynómov a vieme, že $\hat{\varphi}$ zachováva sčítovanie. Násobenie funguje ako násobenie v $F[x]$ (resp. v $F'[x]$) s tým rozdielom, že musíme ešte urobiť zvyšok po delení $p(x)$ (v druhom prípade $p'(x)$). Práve sme si ozrejmlili, že $\hat{\varphi}$ zachováva zvyšky po delení.

Zobrazenie $\hat{\varphi}$ zobrazí polynóm x na polynóm x (lebo $\varphi(1) = 1$ pre ľubovoľný izomorfizmus polí). Z toho vyplýva, že koreň $x + (p(x))$ polynómu $p(x)$ sa zobrazí na koreň $x + (p'(x))$ polynómu $p'(x)$.

Zatiaľ teda vieme, že ψ je homomorfizmus polí a je nenulový (prvok $x + (p(x))$ sa zobrazí na $x + (p'(x))$, ktorý je nenulový). Podľa tvrdenia 5.2.6 je tento homomorfizmus injektívny. Navyše, pretože $\hat{\varphi}$ je surjektívne zobrazenie, priamo z definície ψ vyplýva, že aj zobrazenie ψ je surjektívne. Je to teda izomorfizmus.

Už sme videli, že $\hat{\varphi}$ zobrazí koreň $p(x)$ na koreň $p'(x)$. Z toho, že $\hat{\varphi}$ nemení prvky poľa F vyplýva, že rovnakú vlastnosť má aj ψ . \square

Cvičenia

Úloha 5.3.1. Nech K je pole a $\{F_i, i \in I\}$ je systém podpolí poľa K . Dokážte, že aj prienik $\bigcap_{i \in I} F_i$ je podpoľom poľa K .

5.4 Algebraické rozšírenia

Definícia 5.4.1. Nech K je rozšírenie poľa F . Nech $u \in K$. Hovoríme, že prvok u je *algebraický* nad F , ak existuje nenulový polynóm $f(x) \in F[x]$, ktorého koreňom je u .

Ak každý prvok rozšírenia K je algebraický, hovoríme, že K je *algebraické rozšírenie*.

Príklad 5.4.2. Napríklad $\sqrt{3}$ je algebraický prvok na \mathbb{Q} , lebo je to koreň polynómu $x^2 - 3 \in \mathbb{Q}[x]$.

Nájsť konkrétny príklad prvku, ktorý nie je algebraický nad \mathbb{Q} , je ťažšie. (Také prvky sa zvyknú nazývať aj *transcendentné*.) Platí napríklad, že čísla π , e sú transcendentné nad \mathbb{Q} . Dôkaz však nie je jednoduchý. Na základe kardinality sa však dá zdôvodniť, že takéto čísla existujú – úloha 5.4.8. (Je to však iba existenčný dôkaz; nenašli sme konkrétny príklad takého čísla.)

Pomerne ľahko sa dá ukázať, že každé komplexné číslo je algebraické nad \mathbb{R} . Konkrétne $z = a + bi$ je koreňom polynómu $(x - a - bi)(x - a + bi) = x^2 - 2ax + a^2 + b^2$.

Ak u je algebraický nad F , znamená to, že množina všetkých polynómov, ktorých koreňom je u , je neprázdna. Ľahko sa overí, že táto množina

$$\{f(x) \in F[x]; f(u) = 0\}$$

je ideál v $F[x]$. Keďže $F[x]$ je okruh hlavných ideálov, existuje polynóm, ktorý generuje tento ideál.

Definícia 5.4.3. Ak u je algebraický prvok nad F , tak *minimálny polynóm* prvku u je normovaný polynóm, ktorý generuje ideál $\{f(x) \in F[x]; f(u) = 0\}$. Označujeme ho $m_u(x)$.

Stupeň algebraického prvku definujeme ako stupeň jeho minimálneho polynómu. Označujeme ho $[u : F]$.

$$[u : F] = \text{st } m_u(x)$$

Pretože v definícii máme požiadavku normovanosti, minimálny polynóm je určený jednoznačne. Je to nenulový normovaný polynóm najnižšieho možného stupňa, ktorý patrí do ideálu $\{f(x) \in F[x]; f(u) = 0\}$.

Algebraický prvok môže patriť do rôznych rozšírení poľa F (napríklad $\sqrt{3}$ je prvkom \mathbb{R} i \mathbb{C} , obe sú rozšírenia \mathbb{Q}). Pretože jeho definícia používa len ideál v $F[x]$, minimálny polynóm nezávisí od toho, aké rozšírenie obsahujúce u uvažujeme.

Príklad 5.4.4. Polynóm $x^2 - 3$ je minimálny polynóm čísla $\sqrt{3}$ nad \mathbb{Q} . (Nad \mathbb{R} by mal tento prvok minimálny polynóm $x - \sqrt{3}$.)

Polynóm $x^2 + 1$ je minimálny polynóm čísla i nad \mathbb{R} . (Nad \mathbb{C} by mal tento prvok minimálny polynóm $x - i$. Všeobecne, ak $u \in F$, tak $m_u(x) = x - u$.)

Veta 5.4.5. Ak u je algebraický prvok nad F a $m_u(x) \in F[x]$ je jeho minimálny polynóm. Potom $m_u(x)$ je ireducibilný polynóm nad F ,

$$F(u) \cong F[x]/(m_u(x))$$

$$a [u : F] = [F(u) : F].$$

Dôkaz. Ak by bol polynóm $m_u(x)$ reducibilný, t.j. $m_u(x) = f(x)g(x)$ pre nejaké nekonštantné polynómy $f(x), g(x) \in F[x]$, tak z rovnosti $m_u(u) = f(u)g(u) = 0$ vyplýva $f(u) = 0$ alebo $g(u) = 0$. To znamená, že jeden z polynómov $f(x), g(x)$ by patril do ideálu $(m_u(x))$ a súčasne by mal nižší stupeň ako $m_u(x)$, čo je spor.

Z vety 5.3.11 potom vyplýva $F(u) \cong F[x]/(m_u(x))$ a z dôsledku 5.3.7 máme $[F(u) : F] = \text{st } m_u = [u : F]$. \square

Veta 5.4.6. Nech K je rozšírenie F a $u \in K$. Prvok u je algebraický nad F práve vtedy, keď $F(u)$ je konečné rozšírenie F .

Dôkaz. Ak u je algebraický, tak $F(u) \cong F[x]/(m_u(x))$ podľa vety 5.4.5, čo je konečné rozšírenie podľa dôsledku 5.3.7.

Obrátene, nech $F(u)$ je konečné rozšírenie F . Označme jeho stupeň n . Nech ďalej $a \in F(u)$. Potom $1, u, \dots, u^n$ sú lineárne závislé v $F(u)$ (chápanom ako vektorový priestor nad F). Vyplýva to z toho, že máme $(n+1)$ vektorov vo vektorovom priestore dimenzie n .

Teda existujú c_0, c_1, \dots, c_n (nie všetky nulové) tak, že $c_n u^n + \dots + c_1 u + c_0 = 0$. Čiže $c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0 \in F[x]$ je nenulový polynóm, ktorého koreňom je u . Teda u je algebraický prvok nad F . \square

Dôsledok 5.4.7. Nech K je rozšírenie F a $u \in K$. Ak $u \neq 0$ a u je algebraický prvok nad poľom F , tak aj u^{-1} je algebraický nad F .

Dôkaz. Stačí si uvedomiť, že $F(u) = F(u^{-1})$. \square

Dôkaz by sme vedeli urobiť aj priamo z definície – úloha 5.4.1.

Dôsledok 5.4.8. Každé konečné rozšírenie je algebraické.

Dôkaz. Ak $u \in K$, kde K je konečné rozšírenie F , tak $F(u)$ je vektorový podpriestor priestoru K . Teda $F(u)$ je tiež konečnorozmerný priestor (konečné rozšírenie) a u je, na základe predchádzajúcej vety, algebraický prvok nad F . \square

Tvrdenie 5.4.9. Nech K je konečné rozšírenie poľa L a prvky x_1, \dots, x_n tvoria bázu K ako vektorového priestoru nad L . Nech L je konečné rozšírenie poľa F a prvky y_1, \dots, y_s tvoria bázu L ako vektorového priestoru nad F . Potom množina $\{x_i y_j; i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, s\}$ tvorí bázu K ako vektorového priestoru nad F .

Dôkaz. Podľa predpokladov každý prvok $k \in K$ možno vyjadriť ako

$$k = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

pre vhodné $c_1, \dots, c_n \in L$. Ďalej každé $c_i \in L$ sa dá vyjadriť v tvare

$$c_i = \sum_{j=1}^s d_{ij} y_j,$$

kde $d_{ij} \in F$. Z týchto dvoch rovností dostávame vyjadrenie prvku x

$$x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^s d_{ij} x_i y_j$$

ako lineárnej kombinácie prvkov $x_i y_j$ s koeficientami z F .

Tým sme ukázali, že množina $\{x_i y_j; i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, s\}$ generuje K ako vektorový priestor nad F . Aby sme ukázali, že ide o bázu, stačí nám už len overiť jej lineárnu nezávislosť.

Predpokladajme teda, že

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^s a_{ij} x_i y_j = 0$$

pre nejaké koeficienty $a_{ij} \in F$.

Túto rovnosť môžeme prepísať do tvaru

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^s a_{ij} y_j \right) x_i = 0.$$

Dostali sme, že lineárna kombinácia prvkov x_1, \dots, x_n (s koeficientami z L) je rovná 0, pretože x_1, \dots, x_n je báza, každý koeficient musí byť nulový, teda pre každé $i = 1, \dots, n$ máme

$$\sum_{j=1}^s a_{ij} y_j = 0.$$

Použitím rovnakého argumentu, tentoraz pre bázu y_1, \dots, y_s priestoru L nad F , máme, že všetky koeficienty a_{ij} sú nulové. Teda uvedené vektory sú skutočne lineárne nezávislé (ako prvky vektorového priestoru K nad poľom F). \square

Dôsledok 5.4.10. Ak K je konečné rozšírenie poľa L a L je konečné rozšírenie poľa F , tak aj K je konečné rozšírenie poľa F a pre stupne rozšírení platí

$$[K : F] = [K : L] \cdot [L : F].$$

Iný dôkaz tejto rovnosti pre prípad, keď F je konečné pole, je naznačený v úlohe 5.4.2.

Dôsledok 5.4.11. Ak $u \in L$, kde L je konečné rozšírenie poľa F , tak

$$[u : F] \mid [L : F].$$

Dôsledok 5.4.12. Ak u, v sú algebraické prvky nad F , tak aj ich súčet $u + v$ a súčin $u \cdot v$ sú algebraické prvky.

Dôkaz. Vieme, že v je algebraický prvok nad F , teda je to aj algebraický prvok nad $F(u)$. (Je koreňom polynómu s koeficientami z F , tieto koeficienty súčasne patria do $F(u)$.)

To znamená, že $F(v)$ je konečné rozšírenie $F(u)$. Súčasne $F(u)$ je konečné rozšírenie F , čiže z dôsledku 5.4.10 máme, že $F(u)(v)$ je konečné rozšírenie poľa F .

Preto každý prvok poľa $F(u)(v)$ je algebraický nad F , špeciálne to platí aj pre prvky $u + v, u \cdot v$. \square

Poznámka 5.4.13. Ak sa v nadpoli K pozeráme na všetky algebraické prvky, tak táto množina je uzavretá na súčin a súčet. Už skôr sme ukázali, že je uzavretá aj na inverzné prvky (dôsledok 5.4.7). Teda množina všetkých algebraických prvkov nad F (ležiacych v rozšírení K) opäť tvorí pole.

Príklad 5.4.14. Uvažujme rozšírenie $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ poľa \mathbb{Q} , t.j. najmenšie podpole \mathbb{C} obsahujúce $\mathbb{Q} \cup \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}$.

Vieme, že $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Q}\}$ a $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3}; a, b \in \mathbb{Q}\}$, čiže $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ aj $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2$.

Pole $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ môžeme chápať ako rozšírenie poľa $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, konkrétne platí

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3}).$$

(Na oboch stranách rovnosti je najmenšie pole obsahujúce $\mathbb{Q} \cup \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}$.)

Vypočítajme stupeň $[\sqrt{3} : \mathbb{Q}(\sqrt{2})]$. Pretože $\sqrt{3}$ je koreň polynómu $x^2 - 3$ (s koeficientami z $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$), jeho stupeň je najviac 2. Stupeň 1 by tento prvok mal iba ak by patril do $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Z predpokladu $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ pre nejaké $a, b \in \mathbb{Q}$ však dostaneme

$$3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}$$

a z tejto rovnosti:

- a) pre $ab \neq 0$ vyplýva $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, čo je spor;
- b) pre $b = 0$ vyplýva $\sqrt{3} = a \in \mathbb{Q}$, spor;
- c) pre $a = 0$ vyplýva $\sqrt{3} = b\sqrt{2}$, čiže $\sqrt{6} = 2b \in \mathbb{Q}$, spor.

Teda platí $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = [\sqrt{3} : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$, z čoho dostaneme na základe predchádzajúcej vety

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 4$$

a z bázy $1, \sqrt{2}$ pre $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ nad \mathbb{Q} a $1, \sqrt{3}$ pre $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ nad $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ vieme vytvoriť bázu $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ pre $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ nad \mathbb{Q} , teda platí

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}; a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}.$$

Všimnime si, že

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}),$$

lebo každé nadpole \mathbb{Q} , ktoré obsahuje $u = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, musí obsahovať aj

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \sqrt{3} - \sqrt{2},$$

a teda obsahuje aj prvky

$$\begin{aligned}\sqrt{3} &= \frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) + \frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2}), \\ \sqrt{2} &= \frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) - \frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2}).\end{aligned}$$

Dá sa dokázať, že niečo podobné platí všeobecne – každé konečné rozšírenie \mathbb{Q} je jednoduché. (Podobne pre ľubovoľné pole nekonečnej charakteristiky.)

Všimnime si, že mocniny prvku $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ vieme vyjadriť ako lineárne kombinácie $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$, konkrétne

$$\begin{aligned}(\sqrt{2} + \sqrt{3})^0 &= 1 \\ (\sqrt{2} + \sqrt{3})^1 &= \sqrt{2} + \sqrt{3} \\ (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 &= 5 + 2\sqrt{6} \\ (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3 &= 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3} \\ (\sqrt{2} + \sqrt{3})^4 &= 49 + 20\sqrt{6}\end{aligned}$$

Máme teda 5 vektorov $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (5, 0, 0, 2), (0, 11, 9, 0), (49, 0, 0, 20)$ v priestore dimenzie 4 – sú teda lineárne závislé a riešením sústavy lineárnych rovníc vieme nájsť nenulové koeficienty také, že príslušná lineárna kombinácia týchto vektorov je nulový vektor.

Dostaneme tak $1 - 10u^2 + u^4 = 0$, čo znamená, že

$$x^4 - 10x^2 + 1$$

je minimálny polynóm prvku $u = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Teda

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \cong \mathbb{Q}[x]/(x^4 - 10x^2 + 1).$$

Môžeme si ukázať aj inú možnosť, ako sa dá nájsť $m_u(x)$. Pre prvok $u = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ máme

$$\begin{aligned}u - \sqrt{2} &= \sqrt{3} \\ (u - \sqrt{2})^2 &= 3 \\ u^2 - 2\sqrt{2}u + 2 &= 3 \\ u^2 - 1 &= 2\sqrt{2}u \\ (u^2 - 1)^2 &= 8u^2 \\ u^4 - 2u^2 + 1 &= 8u^2 \\ u^4 - 10u^2 + 1 &= 0\end{aligned}$$

Zistili sme, že u je koreňom polynómu $x^4 - 10x^2 + 1$, pričom tento polynóm je normovaný a má racionálne koeficienty. Keďže sme už predtým videli, že $[u : F] = 4$, tak toto je presne minimálny polynóm $m_u(x)$.

Cvičenia

Úloha 5.4.1. Nech K je rozšírenie poľa F a $u \in K \setminus \{0\}$ je koreňom polynómu $f(x) = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0 \in F[x]$. Nájdite taký polynóm z $F[x]$, ktorého koreňom je u^{-1} .

Úloha 5.4.2. Nech F je konečné pole a L je jeho rozšírenie stupňa $d = [K : F]$. Ukážte, že potom pre počty prvkov platí $|K| = |F|^d$. Vedeli by ste s využitím tohto faktu urobiť iný dôkaz rovnosti $[K : F] = [K : L] \cdot [L : F]$ pre prípad, že F je konečné pole?

Úloha 5.4.3. Nech L je rozšírenie poľa F a $u \in L$. Dokážte, že ak $[F(u) : F] = 5$, tak $[F(u^2) : F] = 5$.

Úloha 5.4.4. Ak $[L : F]$ je prvočíslo, tak pre každé $u \in L$ platí $u \in F$ alebo $F(u) = L$.

Úloha 5.4.5. V poli $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ nájdite inverzný prvok ku $1 - 2\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$ (treba ho vyjadriť ako $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}$ pre vhodné $a, b, c \in \mathbb{Q}$.)

Úloha 5.4.6. Nájdite minimálne polynómy týchto čísel nad \mathbb{Q} :

- a) $\sqrt{2} + 1$; b) $2 - 3\sqrt{5}$; c) $\sqrt[3]{3} + \sqrt{3}$; d) $\sqrt{2} - \sqrt{3}$; e) $\sqrt[3]{2} + i$; f) $1 + \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4}$; g) $\frac{1}{2 - \sqrt[3]{2}} + \sqrt[3]{4}$;
h) $\frac{3 + \sqrt{7}}{1 + 2\sqrt{7}}$; i) $\sqrt[3]{2} + \sqrt{2}$

Úloha 5.4.7. Určite stupeň viacnásobného rozšírenia a nájdite bázu nad \mathbb{Q} :

- a) $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})$; b) $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$; c) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{25})$; d) $\mathbb{Q}(1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{8})$

Úloha 5.4.8*. Aká je kardinalita množiny $\mathbb{Q}[x]$? Aká je kardinalita množiny všetkých čísel, ktoré môžeme dostať ako korene polynómov s racionálnymi koeficientami? Viete na základe toho zdôvodniť, že existuje aspoň jedno reálne číslo, ktoré je transcendentné? (T.j. aspoň jedno číslo $a \in \mathbb{R}$, ktoré nie je koreňom žiadneho polynómu $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$.)

5.5 Rozkladové polia

Definícia 5.5.1. Nech F je pole, $f(x) \in F[x]$ je nekonštantný polynóm. Rozšírenie K poľa F nazývame *rozkladovým poľom polynómu $f(x)$ nad F* , ak existujú $c \in F$, $u_1, \dots, u_n \in K$ také, že $L = F(u_1, \dots, u_n)$ a f sa dá nad L rozložiť ako

$$f(x) = c(x - u_1)(x - u_2) \dots (x - u_n).$$

V príklade 5.3.8 sme vlastne zostrojili rozkladové pole polynómu $x^2 + x + 1$ nad \mathbb{Z}_2 .

Veta 5.5.2. Nech F je pole, $f(x) \in F[x]$ a st $f = n > 0$. Potom existuje rozšírenie K poľa F , ktoré je rozkladovým poľom polynómu $f(x)$.

Dôkaz. Indukciou vzhľadom na n . Ak $n = 1$, tak je rozkladovým poľom priamo F .

Nech teraz $n > 1$ a tvrdenie platí pre všetky polynómy stupňa menšieho ako n nad ľubovoľným poľom. Podľa vety 5.3.5 existuje rozšírenie poľa F , v ktorom má f aspoň jeden koreň u . (Stačí vo vete 5.3.5 za $p(x)$ zobrať ktorýkoľvek ireducibilný polynóm deliaci $f(x)$.) Uvažujme pole $F(u)$. Polynóm $f(x)$ možno nad $F(u)$ rozložiť ako $(x - u)g(x)$, pričom st $g < n$. Nech $F(u)(u_2, \dots, u_n)$ je rozkladové pole $g(x)$ nad $F(u)$. Ľahko vidíme, že $F(u)(u_2, \dots, u_n) = F(u, u_2, \dots, u_n)$ je rozkladové pole polynómu $f(x)$. (Polynóm $f(x)$ v ňom možno rozložiť na súčin koreňových činiteľov a toto pole je generované n koreňmi polynómu $f(x)$.) \square

Predchádzajúca veta hovorí, že pre daný polynóm stupňa n existuje pole v ktorom tento polynóm má n koreňov. Steinitzova veta 4.5.16, ktorú sme si uviedli bez dôkazu, je podstatne silnejší výsledok – tam máme jediné pole, ktoré spĺňa túto vlastnosť pre všetky polynómy z $F[x]$.

Ďalej ukážeme že rozkladové pole polynómu $f(x)$ nad poľom F je určené jednoznačne až na izomorfizmus. (V dôkaze sme svedkami situácie, s ktorou sme sa už viackrát stretli – pri dôkaze indukciou je niekedy výhodnejšie dokazovať o niečo silnejšie tvrdenie, pretože potom nám silnejšie predpoklady môžu zjednodušiť dôkaz indukčného kroku.)

Veta 5.5.3. *Nech $\varphi: F \rightarrow F'$ je izomorfizmus polí, $f(x) \in F[x]$ a $f'(x) \in F'[x]$ je polynóm, ktorý získame z $f(x)$ aplikovaním φ na všetky koeficienty polynómu $f(x)$. (V označení z poznámky 5.3.12 to znamená $f'(x) = \hat{\varphi}(f(x))$.) Ak K je rozkladové pole polynómu $f(x)$ a L je rozkladové pole polynómu $f'(x)$, tak existuje izomorfizmus $\sigma: K \rightarrow L$, ktorý navyše rozširuje φ , t.j. $\sigma|_F = \varphi$.*

Dôkaz. Dôkaz urobíme indukciou vzhľadom na stupeň n polynómu $f(x)$.

1° Ak stupeň $f(x)$ je 1, tak jeho rozkladovým poľom je priamo pole F . Teda v tomto prípade tvrdenie platí.

2° Predpokladajme, že tvrdenie platí pre ľubovoľnú dvojicu izomorfných polí a ľubovoľný polynóm stupňa menšieho ako n . Nech $K = F(u_1 \dots u_n)$ je rozkladové pole polynómu $f(x)$ nad poľom F a nech $L = F'(v_1 \dots v_n)$ je rozkladové pole $f'(x)$ nad F' . Potom tieto polynómy môžeme rozložiť ako $f(x) = c(x - u_1) \dots (x - u_n)$ a $f'(x) = c'(x - v_1) \dots (x - v_n)$.

Súčasne máme $K = F(u_1)(u_2 \dots u_n)$ (t.j. K je rozkladové pole polynómu $f(x)$ nad $F(u_1)$) a takisto $L = F'(v_1)(v_2 \dots v_n)$. Navyše môžeme predpokladať, že u_1 a v_1 sú koreňmi navzájom si zodpovedajúcich ireducibilných faktorov polynómov $f(x)$ a $f'(x)$. (To sa dá dosiahnuť prípadnou výmenou koreňov.) Potom sú podľa vety 5.3.13 možno izomorfizmus φ rozšíriť na izomorfizmus $\sigma': F(u_1) \rightarrow F'(v_1)$ taký, že $\sigma'|_F = \varphi$. Na základe indukčného predpokladu môžeme potom tento izomorfizmus rozšíriť na izomorfizmus $\sigma: K \rightarrow L$. \square

Dôsledok 5.5.4. *Ľubovoľné dve rozkladové polia polynómu $f(x)$ nad F sú izomorfné.*

Predchádzajúci výsledok nám umožňuje dokázať úplnú charakterizáciu konečných polí. Vieme už, že počet prvkov konečného poľa musí byť mocninou prvočísla. Dokážeme, že pre každé $q = p^n$ (p je prvočíslo) existuje q -prvkové pole a je určené jednoznačne až na izomorfizmus.

Veta 5.5.5. *Nech $q = p^n$, kde p je prvočíslo a $n > 0$ je prirodzené číslo. Potom existuje (až na izomorfizmus jediné) q -prvkové pole. Je to rozkladové pole polynómu $x^q - x$ nad \mathbb{Z}_p .*

Dôkaz. Keďže pole s uvedenými vlastnosťami má charakteristiku p , obsahuje ako svoje podpole \mathbb{Z}_p .

Najprv si všimnime, že ak q -prvkové pole existuje, musí to byť skutočne rozkladové pole polynómu $x^q - x$ nad \mathbb{Z}_p . Vyplýva to z toho, že pre každé $x \neq 0$ platí $x^{q-1} = 1$. (Dostaneme to z Lagrangeovej vety – pozri dôsledok 3.2.15; alebo tiež z úloh I-3.3.14 či I-3.3.15.) Teda skutočne každý prvok poľa F je koreňom polynómu $x^q - x$. Zistili sme teda, že $x^q - x$ má v tomto poli q navzájom rôznych koreňov a teda sa dá rozložiť na súčin lineárnych faktorov. (Konkrétne sa dá rozložiť ako $x^q - x = \prod_{u \in F} (x - u)$.)

Stačí nám teda overiť, že rozkladové pole polynómu $x^q - x$ má práve q prvkov. Všimnime si, že v poli charakteristiky p platí $(a + b)^p = a^p + b^p$ a dokonca aj

$$(a + b)^q = a^q + b^q$$

(pozri tvrdenie 5.2.10) To znamená, že korene polynómu $x^q - x$ sú uzavreté vzhľadom na sčítanie. Ľahko potom vidno, že sú uzavreté aj na rozdiel a násobenie.

Vieme dostať aj uzavretosť vzhľadom na inverzné prvky – ak nejaká nenulové a spĺňa $a^q = a$, a teda aj $a^{q-1} = 1$, tak aj pre inverzný prvok platí $(a^{-1})^{q-1} = 1$ a aj $(a^{-1})^q = a^{-1}$. Je teda koreňom toho polynómu $x^q - x$.

Teda samotné korene už tvoria pole – bude to rozkladové pole polynómu $x^q - x$, ktoré má práve q prvkov – q rôznych koreňov tohoto polynómu. (Pomocou tvrdenia 4.5.31 ľahko ukážeme, že polynóm $x^q - x$ nemá násobné korene, keďže jeho derivácia je -1 . Tento fakt môžeme zdôvodniť aj bez použitia formálnej derivácie – úloha 5.5.2.) \square

Príklad 5.5.6. V príklade 5.3.8 sme videli príklad 4-prvkového poľa. Podľa predošlej vety by to malo byť, až na izomorfizmus, práve rozkladové pole polynómu $x^4 - x$.

Skutočne sa môžeme presvedčiť, že v tomto poli dostaneme

$$x^4 - x = x^4 + x = x(x^3 + 1) = x(x + 1)(x^2 + x + 1) = x(x + 1)(x + u)(x + u + 1).$$

Teda tento polynóm sa dá rozložiť na koreňové činitele, pričom korene sú práve všetky prvky poľa: $0, 1, u, u + 1$.

Cvičenia

Úloha 5.5.1. Nech F je pole a $c \in F$. Označme $f(x) = x^n - 1$.

a) Ukážte, že ak c je koreň polynómu $f(x)$, tak

$$f(x) = (x - c)(x^{n-1} + cx^{n-2} + c^2x^{n-3} + \dots + c^{n-2}x + c^{n-1}).$$

b) Ukážte, že ak $f(x)$ má násobný koreň F , tak F má konečnú charakteristiku a $\text{char}(F) \mid n$.

Úloha 5.5.2. Ukážte s použitím úlohy 5.5.1 že polynóm

$$f(x) = x^{p^n} - x$$

v poli charakteristiky p nemá násobné korene.

Úloha 5.5.3. Nájdite izomorfizmus medzi poľami $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1)$ a $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2)$. (Poznámka: Z výsledkov v tejto kapitole vieme dostať, že obe sú 9-prvkové polia a teda nutne musia byť izomorfné. V tejto úlohe by sme chceli priamo nájsť konkrétny izomorfizmus.)

Úloha 5.5.4*. a) Ukážte, že $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2)$ je pole. Koľko má prvkov?

b) Nájdite rozklad polynómu $x^2 + 1$ v tomto poli na ireducibilné polynómy.

c) Nájdite rozklad polynómu $x^4 + 1$ v tomto poli na ireducibilné polynómy.

Literatúra

- [AM] M. F. Atiyah and I. G. MacDonald. *Introduction to Commutative Algebra*. Addison-Wesley, Reading, 1969.
- [Č] Juraj Činčura. Elementárna teória čísel. Poznámky k prednáške, <http://thales.doa.fmph.uniba.sk/sleziak/cvicenia/tc/>.
- [DF] David S. Dummit and Richard M. Foote. *Abstract Algebra*. John Wiley and Sons, 3rd edition, 2004.
- [G1] Jaroslav Guričan. Faktorizácia polynómov I. *Obzory matematiky, fyziky a informatiky*. <http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?clen=gurican>.
- [G2] Jaroslav Guričan. Faktorizácia polynómov II. *Obzory matematiky, fyziky a informatiky*. <http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?clen=gurican>.
- [K] Július Korbaš. *Lineárna algebra a geometria I*. UK, Bratislava, 2003.
- [KGGGS] Tibor Katriňák, Martin Gavalec, Eva Gedeonová, and Jaroslav Smítal. *Algebra a teoretická aritmetika 1*. UK, Bratislava, 2002.
- [OŠ] Daniel Olejár and Martin Škoviera. *Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr*. Univerzita Komenského, Bratislava, 2007. <http://www.dcs.fmph.uniba.sk/texty/dsmain.pdf>.
- [Rog] Kenneth Rogers. The axioms for Euclidean domains. *Amer. Math. Monthly*, 78(10):1127–1128, 1971.
- [Rot] Joseph J. Rotman. *An Introduction to the Theory of Groups*. Springer-Verlag, New York, 1995.
- [Š] Tibor Šalát. *Reálne čísla*. Alfa, Bratislava, 1982.
- [S1] Martin Sleziak. 1-MAT-260 Algebra 2. Poznámky k prednáške, <http://msleziak.com/vyuka/2011/alg2m/>.
- [S2] Martin Sleziak. Teória čísel. Poznámky k prednáške, <http://thales.doa.fmph.uniba.sk/sleziak/vyuka/>.
- [ŠHHK] T. Šalát, A. Haviar, T. Hecht, and T. Katriňák. *Algebra a teoretická aritmetika 2*. Alfa, Bratislava, 1986.

Register

- algebraický prvok, 123
- algoritmus
 - Euklidov, 89
- asociované prvky, 85
- charakteristika
 - poľa, 116
- cyklus, 26
 - prázdny, 26
- cykly
 - disjunktné, 27
- delí, 84
- deliteľ jednotky, 85
- derivácia
 - formálna, 106
- distributívnosť, 63
- epimorfizmus, 16
- euklidovský okruh, 86
- faktorová grupa
 - podľa kongruencie, 55
- faktorový vektorový priestor, 61
- faktorový okruh, 71
- funkcia
 - polynomičná, 81
- generátor, 21
- grupa
 - alternujúca, 31
 - cyklická, 21
 - faktorová, 46
 - symetrická, 26
- grupa transformácií, 32
- homomorfizmus
 - dosadzovací, 82
 - grúp, 12
 - kanonický, 47, 56
 - okruhov, 67
- homomorfný obraz, 16
- ideál, 69
 - hlavný, 70
 - vlastný, 69
- index grupy podľa podgrupy, 40
- inverzia, 29
- ireducibilný prvok, 92
- izomorfizmus, 15
- jadro homomorfizmu, 15
- koeficient, 77
 - vedúci, 77
- komutátor, 61
- komutant, 61
- kongruencia, 74
 - grupová, 54
- koreň
 - jednoduchý, 96
 - násobný, 96
 - násobnosť, 96
- maximálny ideál, 73
- minimálny polynóm, 124
- monoid, 5
- monomorfizmus, 16
- násobnosť, 96
- najväčší spoločný deliteľ
 - v okruhu, 88
- norma, 86
- obor integrity, 65
- obraz množiny, 14
- okruh
 - bez deliteľov nuly, 65
 - Gaussov, 93
 - komutatívny, 63
 - s jednotkou, 63
- okruh polynómov, 78
- okruh s jednoznačným rozkladom, 93
- permutácia, 25

cyklická, 26
 nepárna, 29
 párna, 29
 rozklad na súčin disjunktných cyklov, 27

permutácie
 disjunktné, 27

podgrupa, 7
 generovaná podmnožinou A , 10
 generovaná prvkom a , 10
 normálna, 44

podokruh, 65

pole, 65
 algebraicky uzavreté, 103

pologrupa, 5

pologrupa
 s jednotkou, 5

polynóm, 77
 ireducibilný, 104
 konštantný, 77
 monický, 104
 normovaný, 104

priamy súčin grúp, 6

rád
 grupy, 41

rád permutácie, 29

rád prvku, 20

rozšírenie poľa, 118
 algebraické, 123
 jednoduché, 121
 konečné, 119

rozklad grupy podľa podgrupy, 39

súčin podmnožín grupy, 37

stupeň algebraického prvku, 124

stupeň rozšírenia, 119

teleso, 65

translácia
 ľavá, 33
 pravá, 33

trieda grupy podľa podgrupy, 38

veta
 Cayleyho, 33
 Lagrangeova, 41
 o izomorfizme, 71
 o izomorfizme, 48
 druhá, 50
 tretia, 50

vnorenie, 112

vzor množiny, 14

zákon
 distributívny, 63

Zoznam symbolov

$H \leq G$	7
$[A]$	10
$[a]$	10
$f[A]$	14
$f^{-1}(B)$	14
$f^{-1}(b)$	14
x^n	18
S_n	26
$(a_1 a_2 \dots a_k)$	26
$()$	26
A_n	31
$S(M)$	32
AB	37
aH	38
Ha	38
$H \triangleleft G$	44
G/H	46
$[a, b]$	61
$[G, G]$	61
$C(0, 1)$	65
(a)	70
$R[x]$	78
$f(x) \bmod g(x)$	79
$a \bmod b$	81
$R\langle x \rangle$	81
$a \mid b$	84
$a \sim b$	85
$U(R)$	85
$\gcd(a, b)$	88
Df	106
$[K : F]$	119
$F(u_1, \dots, u_n)$	121
$m_u(x)$	124
$[u : F]$	124